বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব

ও চিকিৎসা-প্রদৰ্শিকা।

Biochemic Materia Medica AND Practice of Medicine IN BENGALI

হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহ-চিকিৎসা, পুরাতন রোগ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-দর্পণ, কালাজর ও উহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা. বাইওকেমিক রিপার্টরী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা এবং ঢাকা হোমিওপ্যাথিক কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এগু সার্জ্জন্সের মেটিরিয়া মেডিকা ও প্রাাক্টিস্ অব মেডিসিনের ভূতপুক্ষ লেকচারার

> ডাঃ নৃপেক্রচক্র রায় এম্, ডি, বি. এইচ্. এস্ প্রণীত

> > Revised & Enlarged By

Dr. Manindra Chandra Roy II. M. B.

Rabindra Chandra Roy B. A. (Biochemist)

৭ম সংস্করণ

1942

দৰ্বাস্বস্থ সংব্ৰক্ষিত]

[মৃশ্য 🔍 মাত্র

প্রকাশক—

শ্রীরবীজ্রচন্দ্র রায় বি, এ
হোমিও পাবলিশিং হাউস্
২নং ওয়ারষ্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকা

Printed By

Kanai Lal Sarkar

At the Hema Printing House, Dacca.

স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণোদ্দেশ্যে অপিত হইল।

প্রথম সংক্ষরণের বিজ্ঞাপন।

বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকার প্রথম সংস্কবণ প্রকাশিত হইল ৷ ইহা মহামতি জব্জ ইউলিয়ম কেরীর স্থবিখ্যাত "বাইওকেমিক সিষ্টেম অব মেডিসিন" নামক পুশুক অবলম্বনে লিখিত। সত্যের গতি অপ্রতিহত। অবিশ্বাসীর ফুৎকারে উহা নির্বাপিত হইবার নহে। তাই হোমিওপ্যাথির হুায় বাইওকেমিষ্ট্রীর প্রসারও দিন দিন জগদ্বাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। যাহার ভিত্তি পূর্ণ সত্যের উপর প্রোথিত, আজকালকার শিক্ষিত জগতে তাহার প্রচার না হইবে কেন? আজ ৪:৫ বৎসর যাবৎ আমবা অভিশয় সাবধানতা ও আগ্রহের সহিত এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া চমংকার ও আশাভিরিক্ত ফল পাইতেছি। তাই, যাহাতে রোগ-শোক ও হুভিক্ষ-প্রণীড়িত নিঃম্ব বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই নবপ্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-প্রণালা আদৃত ও পরীক্ষিত হইতে পারে, তন্মানসে এই পুস্তক সঙ্গলিত হইল। এতদ্বারা সে উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইবে বলিতে পারিন।। এৎ নব প্রবর্ত্তিত প্রণালীর চিকিৎসায়, চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই বিশেষ স্থবিধা আছে। প্রথমতঃ, বাইওকেমিষ্ট্রা মতে চিকিৎসায় কেবল মাত্র বারটা 'টিস্ক' ঔষধ দারা যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করিতে হয় ; দিতীয়তঃ, টিম্ম ঔষধের সমস্ত গুলিই আমাদের দেহের উপাদান বিশেষ, স্মৃতরাং নির্দোষ। ইহার সকলগুলিই বিষক্রিয়াবিহান। অতি-প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ জন্ম কোনও প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই। তৃতীয়তঃ,— এই চিকিৎসা স্বল্পব্যয় সাক্ষেপ। চতুর্থত:—দীর্ঘকাল প্রথগুলি নট হয় না। পঞ্মতঃ, যৎসামান্ত লেখা পড়া শিখিয়াও এই মতে চিকিৎসা করা ষাইতে পারে।

যে চিকিৎসায় এতগুলি স্থবিধা, ভাহা সর্বত্র বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হওয়া বাঞ্চনীয় নহে কি ? যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল এই ক্ষুদ্র পুস্তক দারা ভাহার কিয়দংশ সাধিত হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পুস্তকের কলেবর অভ্যন্ত বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কায় এসংস্করণে কেবল কয়েকটী প্রধান প্রধান রোগ ব্যতীত, অপর কোনও রোগের লক্ষণ ও কারণ-তস্থ বণিত হয় নাই। সাধারণের উৎসাহ পাইলে পরবন্ত্রী সংস্করণে সে অভাব দূর করিবার ইচ্ছা রহিল।

সর্বশেষে বিনীত নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থের স্থানে ২ মুদ্রাঙ্কন দোষ থাকিবার সম্ভাবনা ; পাঠক পাঠিকাগণ তাহা মাপ করিবেন।

হোমিওপ্যাথি প্রচার কার্য্যালয় নবাবপুর, ঢাকা। শ্রাবণ। ১৩১৮ সন।

ত্রীনৃপেশুচন্দ্র রায়।

সপ্তম সংক্ষরণের বিজ্ঞাপন।

অতি অরকাল মধ্যেই ষষ্ঠ সংস্করণের পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় তাড়াতাড়ি করিয়া এই ৭ম সংস্করণ বাহির করিতে হইল। কিরূপ জত-গতিতে এই নব-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-প্রণালী এতদেশে সমাদৃত হইতেছে ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ চিকিৎসায় চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই তুল্য ফল না পাইলে এই বিদেশা ও বিজ্ঞাতীয় চিকিৎসা-প্রণালী কথনও এ দেশে এইরূপ ক্রতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত না। যে উদ্দেশ্যে সর্ব্ব-প্রথম এই গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল তাহা কথনও বার্থ হয়় নাই, বরং সিদ্ধই হইয়াছে বলিতে হইবে। অধিকস্ক, আমি বিশেষরূপে অবগত আছি, কেবলমাত্র এই একখানি গ্রন্থের সাহায়োই চিকিৎসা করিয়া বহু বাঙ্গালী মৃবক এই ছদ্দিনে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন এবং কতিপয় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিশ্ববিচ্ছালয়ের উপাধিধারী এলো-প্যাথিক ডাক্তার ও কবিরাজ (B. A. & M. B.) এই চিকিৎসার চমৎকার স্কেল দর্শন করিয়। ইহা গ্রহণ করিতে ছিধা বোধ করেন নাই।

ভারত তাহার কৃষ্টি ও সভাতার দান যেমন অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমগ্র বিশ্বকে দান করিয়া আদিয়াছে, তেমনি অন্তের যাহা কিছু মূল্যবান্— যাহার উৎকর্ষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও সে গ্রহণ করিতে দিধা বোধ করে নাই। এই সত্যান্ত্রসন্ধিৎসা এবং গ্রহণনালতা ভারতীয় জাতীয় চরিত্রের সম্ভত্ম বৈশিষ্ট্য। বাইওকেমিষ্ট্রীর স্থায় অতি আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এ দেশে অতি ক্রত প্রসার ইহার অন্তত্ম নিদর্শন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজও তাহার অভ্রাস্ত ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌছিতে পারে নাই। কিন্তু এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান্ মুগে এই বিজ্ঞানে যে উৎকর্ষ দেখিতে পাইতেছি, সভ্যতার অতি আদিম শ্ববস্থায় ইহা মানবের কল্পনাভীত ছিল। ভবিশ্বতে যে ইহা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়া একদিন পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌছিতে পারিবে না, ইহা আজ একমাত্র অজ্ঞ ও হঃখবাদীরা (ignorants & pessimists) ভিন্ন আর কেহই বিশ্বাস করেন না।

আদ্ধ বাইওকেমিষ্ট্রীর এই অসাধারণ উৎকর্ষের জন্ম পূর্ববর্তী অন্তান্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আবিষ্ণর্ভাদের নিকট আমাদের ঋণ অকপটে স্বীকার করিতেই হইবে। বাইওকেমিষ্ট্রীর এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মনীষীদের নিগৃঢ় সাধনার ফল। হোমিওপ্যাথি এবং বাইওকেমিষ্ট্রির আবিষ্ণর্ভা মহামতি হানিম্যান্ ও মেডি কুসলার উভয়েই জার্মেণীর খ্যাতনামা এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। কিন্ত তাহারা যে মুহুর্ত্তে তাহাদের অবলম্বিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তন্মুহুর্ত্তেই তাহা ত্যাগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইহাদের ক্যায় জগদ্বিখ্যাত আরও কতিপয় এলোপ্যাথিক চিকিৎসকও তাহাদের অবলম্বিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি সরলভাবে তাহাদের অভিজ্ঞতালন্ধ যে সত্যাও মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির নিমিত্ত এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে "কতিপয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমত" নার্যক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম।

আমি আশাবাদী এবং আমি আমার স্বদেশবাসীর আন্তরিকভার বিশ্বাস করিয়া এই আশা পোষণ করি যে, যাহা আছে তাহা হইতে উন্নত-তর এবং উৎকৃষ্টতর চিকিৎসা-পদ্ধতি তাঁহারা চাহেন। কিন্তু এমনও কেহ কেহ আছেন, যাহার। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্ত, গোড়ামীর বনাভূত হইরা, রোগী—তথা স্বদেশবাসীর স্বার্থেরদিকে বিন্দুমাত্রও দৃক্পাত করেন না। তাঁহারা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ রোধ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না; প্রাণশক্তির উৎস স্বরূপ প্রভাতের স্থ্যালোক হইতে নিঃসঙ্কোচে

চকু ফিরাইয়া লইয়া যান। কিন্তু আমাদের বিশ্বাদ করিতে হইবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্ল; অধিকাংশ লোকই এই নৃতন বিজ্ঞানের উৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে।

শৃত্যে সৌধ নির্মাণ করা যায় না। তাই, বাইওকেমিট্রির ন্থায় এই অভি আধুনিক বিজ্ঞানও স্বকীয় গুণে ভারতবর্ষের ন্থায় স্বদূর প্রাচ্যে প্রদার লাভ করিয়াছে। ডাঃ স্পূলার বাইওকেমিট্র স্বরূপ যে বীজ্ব করিয়া গিয়াছিলেন ভাহা ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত ও পরিবন্ধিত হইয়া আজ শাখা-প্রশাখা ও পত্তে-পুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর অসপিত রোগক্রিষ্ট নরনারা ইহার স্থাতল ছায়ায় আশ্রম লাভ করিয়া শান্তিলাভ করিত্তেছে।

ক্রমশংই এই পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া, এবং পাঠক-পাঠিকাগণের অভাব দূরীকরণ মানসে এই সংস্করণের প্রায় সর্বত্রই বহু নৃতন বিষয় সংযোজিত করিয়া দিয়াছি। অভিজ্ঞতালক বহু বিষয় এবং চিকিৎসিত বহু রোগীর বিবরণও এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের কলেবর প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠা বৃদ্ধিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দরুপ কাগজ একরূপ ছ্প্রাপ্ত এবং উহার মূল্যও প্রায় চতৃত্ত প বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার পরম হিতৈষী ও অরুত্রিম বন্ধু "হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরীর" অক্ততম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামধন টোড়ি এবং শ্রীযুক্ত ব্রজ্ঞলাল টোড়ি এই পুস্তকের সম্পূর্ণ কাগজ এককালীন পূর্ব্বেই প্রদান করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইইাদের এই সাহায্য ব্যতীত এই সমর এইরূপ বৃহৎ গ্রন্থ কখনও প্রকাশ করিছে পারিতাম না। এক্স আমি তাঁহাদের নিকট চিরত্বতক্ত রহিলাম। কাগজের মূল্য এবং গ্রন্থের আকার বন্ধিত হওয়ার পৃস্তকের মূল্য সামান্ত বৃদ্ধিত করিয়া ও টাকা মাত্র ধার্য্য করা হইল। এই নৃতন সংক্ষরণের

পরিবর্দ্ধনে আমার প্রন্থর শ্রীমান্ মণীক্রচক্র রায় ও শ্রীমান্ রবীক্রচক্র রায় বি. এ আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এখন পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থানিকে পূর্বের স্তায় প্রীতির চক্ষে দেখিলে এবং ইহালারা রোগরিষ্ট-জনগণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে নিবেদন, অতি ক্রত এই পুস্তক মুদ্রিত হওয়ায় এবং স্বয়ং "প্রফ-শিট" দেখিতে না পারায়, স্থানে স্থানে মুদ্রন্ধন-দোষ থাকিতে পারে; পাঠক-পাঠিকাগণ মরালধর্ম অনুসরণকরতঃ গ্রন্থের দোষাংশ বর্জন করিয়া গুণাংশ গ্রহণ করিলে চিরক্রতক্ত থাকিব। ইতি—

দোল-পূণিমা. ১৩৪৮ সন **জীনৃতপক্রচন্দ্র রায়** হোমিও পাবলিশিং হাউস্, উয়ারী, ঢাকা।

অবতরণিকা

বাইওকেমিষ্টির উৎপত্তি।

"প্রকৃত বস্তু দারা অভাব পূরণ করা" অর্থাৎ "শরীরে যে যে পদার্থের অভাব বা ন্যুনতা বশতঃ রোগোৎপর হয়, ঠিক সেই সেই পদার্থ দারাই উক্ত অভাব বা ন্যুনতার পরিপূরণ করা" ইহাই বাইওকেমিক চিকিৎসার মূলস্ত্র। Bios (বাইয়স) ইহা একটা গ্রীক্ শব্দ। ইহার অর্থ life অর্থাৎ জীবন। Chemistr; (কেমিষ্ট্রা) শব্দের অর্থ রসায়ন-শাস্ত্র। অভএব বাইওকেমিষ্ট্রা শব্দের অর্থ—কৈবনিক রসায়ন শাস্ত্র।

প্রাণী-দেহ সাধারণতঃ অর্গানিক (organic) অর্থাৎ জাস্তব, এবং ইন্
অর্গানিক (inorganic) অর্থাৎ ধাতব এই হুই প্রকার পদার্থের সমবায়ে
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিশ্মিত হইয়া পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও পরিরক্ষিত
হইয়া থাকে। জীবিত শরীরে পূর্ব্বোক্ত জাস্তব ও ধাতব এই হুই প্রকার
পদার্থের মধ্যে পরম্পর অংশ বিশেষের আদান প্রদান হইয়াই এরূপ হুইয়া
থাকে।

জাঁবিত শরীরে কথনও জাস্তব পদার্থের অভাব ঘটে না। অভাব হইলে ধাতব পদার্থেরই হইয়া থাকে। যদি কখনও কোন ধাতব পদার্থের অভাব হয়, তবে তথন সেই পদার্থের সহিত রাসয়নিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ কোনও জাস্তব পদার্থ, কার্য্যকারীর অভাবে, দেহের পক্ষে উপদ্রবকারী হইয়া উঠে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে দেহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইতে চেষ্টা করে। জান্তব পদার্থ সকল এবস্প্রকারে দেহ হইতে বাহির হইবার কালে কতকগুলি

রোগনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ দৃষ্টে, যে ধাতব পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে তাহা ঔষধ স্বরূপ গ্রহণ করিলে শীঘ্রই তাহার পরিপূরণ হয়, অর্থাৎ রোগলক্ষণ দ্রীভূত হইয়া যায়।

১৮০২ খৃষ্টাকে একখানি জার্মাণ সংবাদ পত্রে কোনও বিজ্ঞ চিকিৎসক লেখেন "মন্থ্য দেহের অত্যাবশুকীয় উপকরণ সমূহই উত্তম ঔষধ।" তৎপর, ১৮৪৬ খৃঃ অঃ অপর জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক উক্ত পত্রিকায় লেখেন "মন্থ্যু দেহের যে যে যন্ত্র যে যে অত্যাবশুকীয় পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, তাহারা তত্তৎ স্থানেই কার্যাকারী।" ইহার পর ১৮৭৩ খৃঃ অঃ জার্মেণীর অন্তর্গত ওল্ডেনবার্গ নিবাসী ডাক্তার মহামতি মেডি সুসলার লিপ্জিক্ হোমিওপ্যাথিক গেজেট নংমক সংবাদপত্রে একটী প্রবন্ধে লেখেন—"এক বৎসর হইল আমি এই সকল টিম্ম ঔষধ দ্বারা রোগারোগ্য করা যায় কিনা ভাহা পরীক্ষা করিয়া বিশেষরূপে ক্বতকার্য্য হইয়াছি।"

এই প্রবন্ধ বাহির হইবার পরই জনৈক ডাক্তার উহার প্রতিবাদ করেন ও ডাঃ মহামতি স্পলারকে তাঁহার পরীক্ষিত নৃতন চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্ম অনুরোধ করেন। তাহাতে তিনি উক্ত পত্রিকায় 'Abridged System of Therapeutics" নামক এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন। এইচ্সি, জি, লুটিদ নামক আমেরিকার জনৈক স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রথমে উক্ত জার্মাণ প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া Homæopathic News নামক পত্রিকার প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ বাহির হইবার পরই চারিদিকে মহা হুলুমুল পড়িয়া যায়। ইহার পর ডাঃ হেরিং "দ্বাদশ টিম্ম রেমিডি" সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় তিনি ডাঃ স্পলারকে প্রচুর ধন্ধবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রচারিত মতের পরীক্ষা করিয়া সভ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্ম জনসাধারণকৈ অনুরোধ

করেন। প্রথম প্রকাশিত হইবার পর, অতি অর কাল মধ্যেই এই পৃষ্ঠিকার কতিপয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহার পর, শীঘ্রই গ্রেটব্রিটেন, জার্মেণী ও আমেরিকায় এই নৃতন মতের কতকগুলি পৃস্তক ও পৃষ্ঠিকা প্রকাশিত হওয়ায় নৃতন মত প্রচারের বিশেষ স্ববিধা ও জগতের মহান্ অভাব দ্রীভূত হইয়াছে। আজ সমগ্র জগৎ এই মহা সত্যের সত্যতা নিরীক্ষণ ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। দিন দিনই ইহার প্রসার জগদ্যাপী হইয়া উঠিতেছে। তাই আজ বাঙ্গালার স্থদ্র পল্লীতে পর্যান্ত ইহার নাম প্রতিধ্বনিত।

কোনও কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির মতে "বাইওকেমিট্রী" ও "হোমিওপ্যাথি" একই জিনিষ; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। উভয় চিকিৎসার মূলমন্ত্র বা মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথির মূল স্ত্র, "সমঃ সমং শময়তি" আর বাইওকেমিট্রীর মত—"যে বল্তর অভাব, সেই বল্ত দ্বারাই তদভাবের পূরণ করা।"

বাইওকেমিক মতে, রোগীর লক্ষণ দৃষ্টে, শরীরে কোন্ কোন্ লাবণিক পদার্থের অভাব হইয়ছে তাহা স্থির করিয়া ঐ সব লাবণিক পদার্থই ঔষধরূপে রোগীকে সেবন করিতে বিধি দেওয়া হইয়া থাকে। এই সব "লাবণিক পদার্থ মানব-দেহেরই উপাদান বিশেষ, স্থতরাং বাইওকেমিইগণ এই সকল লাবণিক পদার্থকে ঔষধ না বলিয়া টিগু-ভায়েট (tissue-diet) আখ্যা দিয়া থাকেন। ইহাই অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বাইওকেমিক মতে, মানব-দেহের কোন কোন উপাদানই ঔষধরূপে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে; শরীরের উপাদান নয়, এমন কোনও পদার্থই ব্যবস্থা করা হয় না। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি এবং কবিরাজী প্রভৃতি অপরাপর চিকিৎসাপদ্ধতিমতে, দেহের উপাদান নয়, এরূপ বছ পদার্থই (য়াহা উগ্র বিষ বিশেষ এরূপ পদার্থন্ত) প্রয়োক্ষিত হইয়া থাকে এবং

সময় সময় ঐ সব বিষাক্ত পদার্থের অপ-প্রয়োগে দেহের গুরুতর ক্ষতি এবং প্রাণহানি পর্যান্তও ঘটিয়া থাকে। এজন্ত স্থসলার ঐ সব চিকিৎসা-প্রণানার (যদিও উহা দ্বারা জগতের মহান্ উপকার সাধিত হইতেছে) দোষ প্রদর্শন পূর্বেক বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তাহার মতে, একমাত্র বাইওকেমিক চিকিৎসাই প্রকৃত যুক্তিযুক্ত ও বিচার-সম্মত চিকিৎসা বা rational treatment. স্থস্লারের পর, জার্মাণীর অপর মনীষী, ডাঃ লুইকুনে Nature cure বা জল ও মাটী দ্বারা চিকিৎসা-প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। ইহাও স্থস্লারের স্বভাব চিকিৎসারই অন্তর্গত বটে।

বাইওকেমিক মতে যে সব লাবণিক পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে উহার সকলই নিদোষ। রোগীর লক্ষণ দৃষ্টে যে সব "টিভু" ঔষধ ব্যবহার করা হয়, ভাহার অভিপ্রয়োগ বা অপ প্রয়োগেও শরীরের কোন হানি জন্মে না। শরারের যাবভায় টাশুই রক্ত হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়। অভাবের পূরণ করিয়া থাকে, প্রয়োজনের অভিরিক্ত পদার্থ গ্রহণ করিবার ভাহাদের। টিশুগুলির) ক্ষমভাই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান ষাইতে পারে যে, একগ্রাস সরবৎ তৈয়ার করিতে ধে পরিমাণ চিনির দরকার, তদভিরিক্ত চিনি ঐ গ্লাসে দিলে, জল সবগুলি চিনিই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না, জলের পরমাণুগুলি যে পরিমাণ চিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ, কেবল ভাহাই ভাহারা গ্রহণ করিবে, অতিরিক্ত চিনি গ্রাসের নিমে জমিয়া থাকিবে। এইরপ আমরা দেখিতে পাই, স্থ্য কিরণে সকল প্রকার বৰ্ণক-পদাৰ্থ (colouring matter) বিভ্যমান থাকিলেভ সকল বৃক্ষ বা লভাপাতাই উহার সকলগুলিই গ্রহণ করে না, নিজ নিজ প্রয়োজন মত বিশেষ বিশেষ পদার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ মৃত্তিকার রুসে জাবজগতের নিশ্মাণ ও সংরক্ষণের পক্ষে যে যে পদার্থের প্রয়োজন, এক কথায় সর্বাপ্রকার ভৌতিক পদার্থ ই, বিভ্রমান্ আছে। কিন্তু তাই

বলিয়া সকল বৃক্ষ বা লভাপাভাই ঐ মৃত্তিকা-রস হইতে যাবভীয় দ্রবাই গ্রহণ করে না, নিজ নিজ প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জ্ঞাই আমরা দেখিতে পাই—একই ভূমিতে উৎপন্ন নানা প্রকার বুক্ষের নানা প্রকার পাতা, উহা নানা বর্ণ এবং বিভিন্ন প্রকারের বুক্ষের ফলের বিভিন্ন প্রকার আস্বাদ। সকলেই যদি একই জিনিষ গ্রহণ করিভ ভবে সব জিনিষেরই একই স্বাদ এবং একই আকার ও প্রকৃতি হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া একটা ভিক্ত, একটা অমু ও একটা মধুর স্বাদ বিশিষ্ট হইল কেন ? আম কাঠ, নিম কাঠ শাল কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কাঠের উৎপত্তি হইল কি করিয়া? ভগবান্ সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রভ্যেক জিনিষকেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টিকালেই জীব-জগতের বীজের পরমাণুগুলির ভিতর বিশেষ একটা জীক্ষণী-শক্তি (power of selection) দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশেষ নির্বাচনী-শক্তির বলেই প্রত্যেক টিণ্ড ভাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় পদার্থ রক্ত হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং এইরূপ শক্তির বলেই অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দেহ হইতে নিজ্রান্তও করিয়া থাকে। (thrown out of the system) আমরা এই জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই, ইষ্টক-নির্দ্মিত ঘর মেরামত করিতে হইলে ইট চুণ, সুড়কি, সিমেণ্ট এবং লৌহ ও কাষ্ঠ

মোরা এই জালাভক ব্যাণারে দোবভে শাহ, ইপ্তক-ানারত হর
মেরামত করিতে হইলে ইট চূল, স্ড্কি, সিমেন্ট এবং লোহ ও কার্চ
ব্যতীত অপর কোনও পদার্থের প্রয়োজন হয় না। তজ্ঞপ খড়ের হর
মেরামত করিতেও বাঁশ, খড় এবং বেত বা রশি ব্যতীত অপর কোনও
বিসদৃশ (dis-similar) পদার্থের প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ রুগ্ন,
মাবব-দেহ রোগ মুক্ত (বা মেরামত) করিতে গেলেও যে যে উপাদানে
উহা গঠিত, ঠিক সেই সেই পদার্থই ব্যবহার করা উচিং। ইহাই
অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত, বিচার-সম্মত ও যুক্তি সঙ্গত চিকিৎসা-প্রণালা
(more scientific, logical and rational treatment.)

বাইওকেমিক ঔষধ সকলের পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত নাম।

> 1	ক্যান্ধেরিয়া ফ্লোরিকা—	(ক্যাব্ধ-ফ্লোর)।
२ ।	ক্যান্ধেরিয়া ফসফরিকা—	(ক্যাল্ক-ফস্)।
01	ক্যান্কেরিয়া সলফিউরিকা—	(ক্যান্ত সলফ)।
8	ফিরম ফসফরিকম—	(ফিরম-ফস)।
e 1	ক্যালীমিউরিয়েটিকম—	(ক্যালী-মিউর)।
७।	কাালী ফসফরিকম্—	(ক্যালী-ফস)।
91	ক্যালী-সলফিউরিকম্—	(काानी मनक)।
b 1	ম্যাগ্রেশিয়া ফসফরিকম্—	(ম্যাগ্ন-ফস)।
ا ج	নেট্রম-মিউরিয়েটিকম্—	(কেট্রম-মিউর)।
> 1	নেট্রম ফসফরিকম্—	(নেট্রম ফস)।
>> 1	নেট্রম সলফিউরিকম্—	(নেট্রম-সলফ)।
>२ ।	সিলিশিয়া	(সিলি)।

এই বারটী ধাতব লাবণিক পদার্থ ই মানবদেহ রক্ষার প্রধান উপকরণ।
পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটী লাবণিক পদার্থ ব্যতীত শরীরে আরও কতিপয় ধাতব
লবণ দৃষ্ট হয় বটে. কিন্তু ঔষধাথে ঐগুলির কোন্তু আবশুক হয় না।

পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে মানব দেহ থাতব ও জান্তব এই ছই প্রকার পদার্থের সমবায়ে গঠিত। এতন্মধাে জান্তব পদার্থের অংশ ১০ ভাগ; চর্বিন, শর্করা ও অগুলাল প্রভৃতিরূপে ইহারা দেহে বর্ত্তমান। অবশিষ্ট ঠি ভাগ ধাতব পদার্থে গঠিত। এই ঠি ভাগের ঠি ভাগই জল বক্রী ঠি অংশ পূর্বোক্ত ভাদশ বা ততােধিক ধাতব-লবণ। পূর্বে ইহাও

উল্লেখিত হইয়াছে যে এই ধাতব লবণ ব্যতীত জান্তব পদার্থ সকল দেহে কার্য্যকারী হইতে পারে ন।।

কি প্রকারে এই ধাক্ষব-লবণ সকল গৃহীত হইয়া থাকে ?

স্থাকিরণ, নিঃশ্বসিত-বায়ু এবং আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যের সহিত পুর্ব্বোক্ত ধাতব পদার্থ নিচয় শরীরাভাস্তরে গৃহীত হইয়া থাকে। ভ্কুত্ত ও পীত (যাহা পান করা হইয়াছে) দ্রব্যু সকল লালা, আমাশন্ব-রস (গ্যান্ত্রিক যুস্) ক্লোমনরস প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া পরিপাচিত হইবার পর, আচুষিত হইয়ার রক্তবহানাড়ী মণ্ডলীতে প্রবেশ করে। রক্তবহা নাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ইহার বর্ণ হয়বং শুল্র থাকে। তথন ইহাকে কাইল (chyle) বলে। এই কাইলমিশ্রিত রক্ত তৎপর রক্তসঞ্চলন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসের ভিতর নিঃশাস যোগে গৃহীত বায়ু হইতে অক্সিক্তেন প্রাপ্ত হয়য়া এই কাইল মিশ্রিত রক্ত তৎপর ধমনী ও কৈশিকা নাড়ীর সাহায্যে সর্ব্বাক্তে সঞ্চালিত হইয়া শরীরের প্রত্যেক বিধান বা টিস্ককে (রক্তের সহিত মিশ্রিত পূর্ব্বোক্ত লাবণিক পদার্থ নিচয়ের মধ্য হইতে) বাহার যে দ্রব্যের প্রয়োজন ভাহাই সরবরাহ করিয়া থাকে।

কেন রোগ হয় ?

প্রতিনিয়তই আমাদের শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। প্রতিদিন পানাহারাদি দ্বারা আমরা ঐ ক্ষরেয় পূরণ করিয়া থাকি। কিন্তু যদি কোনও
কারণে আমাদের পরিপাক-যন্ত্রের বিশৃঞ্জলা দ্বিয়া ভুক্তদ্রব্য আশোষণে
ব্যাঘাত দ্বীয়, তবে নিশ্চিতই আবশুকীয় লাবণিক পদার্থের অভাব নিবন্ধন
আমাদের নানা প্রকার রোগ জিন্মবার সম্ভাবনা। (প্রথমে একটি পদার্থের

অভাব হইলে যদি শীঘ্রই ঐ অভাব পূরণ করা না যায়, তবে সত্তরই আবার প্রথম অভাবটার পরিণাম স্বরূপ অক্তান্ত পদার্থের অভাব ঘটবার সন্তাবনা) :

যেমন ক্যাল্ক-ফদ, এই ধাতব পদার্থের সহিত দেহস্থ আগুলালিক পদার্থের বিশেষ বাসায়নিক সম্বন্ধ আছে। আগুলালিক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা পেশী, অস্থি প্রভৃতি বিধান (টিম্ন) নির্মাণ করে। কিন্তু যদি কোনও কারণে রক্তে এই ক্যাল্ক-ফদের অভাব হয়, তবে দেহস্থ আগুলালিক পদার্থ কার্যাকারীর অভাবে দেহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইতে চেষ্টা করিবে। যথা, শর্মারের কোনও পথে আগুলালিক পদার্থ নিজ্ঞান্ত হইতে দেখিলে ক্যাল্ক-

ফসের অভাব বুঝিতে হইবে। এইরূপে, লক্ষণ দৃষ্টে, যে বস্তুর অভাব ঘটিয়াছে তাহা জানিয়া তদভাবের পূরণ করিতে পারিলেই—

বাইওকেমিক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য

করা হইল। যে দ্রব্যের অভাব ঘটিয়া থাকে উহাই

সূকা মাতায়

সেবন করিতে দিলে ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে। ফুল্ম মাত্রায় ঔষধ দ্রব্য কেন ব্যবহার কবিতে হয় তাহার কারণ এই—খাত্র বা ঔষধ আশোষিত হইয়া রক্তে মিশ্রিত না হইতে পারিলে কার্যাকারী হইতে পারে না। পরিপাক-য়ল্ল হইতে রক্তসঞ্চলন মন্ত্রে মিলিত হইতে অতিফুল্ম কৈশিকানাড়ী (capillary) সমূহ একমাত্র পথ। এই ফুল্মপথে প্রবেশ করিতে পারে এজন্ম ঔষধ সমূহ ফুল্মাকারে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। য়ূল মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে উহার অতি অল্লাংশই আশোষিত হইয়া রক্তে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ রুয়া শরীরে পরিপাক-য়ল্ল স্বভাবতঃই অল্লাধিক রুয়া হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় রুয়া পরিপাক-য়ল্লকে কার্যা করিতে দিয়া আরও তুর্বল করা অপেক্ষা ফুল্ম মাত্রায় ঔষধ দিয়া উহাকে বিরাম লাভ

করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে কি ? বিশেষতঃ পুরাতন রোগাদিতে পরিপোষণা-ভাবে পাকস্থলীর অভ্যস্তরে নানা প্রকার অকার্য্যকরী পদার্থ সমূহ সঞ্চিত্ত থাকার আশোষণ কার্য্য উত্তমরূপে নির্কাহ হইতে পারে না। এই জন্মই হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক চিকিৎসায় পুরাতন রোগে সাধারণতঃ উচ্চ ক্রমের ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই কারণেই রোগীকে বতদূর লঘু পথ্য সন্তব ভাহাই ব্যবস্থা করা চিকিৎসকের অপর প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম।

শর্করা মানব দেহের একটা প্রধান উপকরণ। হগ্ধ-শর্করা ভৈষজ্যগুণ-বিহীন পদার্থ। মানবদেহে রাসায়ণিক পরীক্ষায় স্পিরিট বা তন্ত্র্ল্য কোনও পদার্থই পাওয়া যায় না। স্কুরাং স্পিরিট অপেক্ষা ত্রপ্তা স্কিরার সহিত মর্দন করিয়া ঔষধকে স্ক্রাকারে শক্তিক্বত করা সমধিক সমাচান।

রোগ বিশেষে ব্যবহৃত ঔষধের ক্রম বা শক্তি।

ডাঃ স্দলার প্রম্থ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ভরুণ পীড়ায় ৩× ও ৬× ক্রম, এবং পুরাতন পীড়ায় ১২×, ৩০× এবং আবশুক হ**ইলে** ২০০× ক্রম ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

ওষধের পুনঃপ্রয়োগ কাল।

সদি, কাসি, হ্বর ও অভিসারাদি তরুণ পীড়ায় সাধাণত হাত ঘণ্টাস্তর এবং প্রাতন পীড়াদিতে দিবসে মাত্র হাত বার ঔষধ দেওয়া কর্ত্বর । খাসকাস, ওলাউঠা বা শূল-বেদনাদিতে আবশ্রক মত ৫।১০।১৫ মিনিট অস্তর ঔষধ দেওয়া উচিত। উপকার দর্শিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে দীর্ঘকাল পর পর দেওয়া ষাইতে পারে। উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া খাইলে ঔষধের ক্রিয়া হ্রাভি সন্থর দর্শে। শূল বেদনা, তরুণ সদি প্রভৃতি রোগে উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া কর্ত্বর। প্র: প্র: ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হইলে ১৫ গ্রেণ পরিমিত ঔষধ ৮ আউন্স উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া পুন: প্র: এক এক চামচ করিয়া খাইতে দিবে।

মাত্র।

বাইওকেমিক ঔষধের মাত্রা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ৪ গ্রেণ। ছই বা ভভোধিক ঔষধ এককালে ব্যবহার করিবার আবশুক হইলে মাত্র। কিছু কম করিয়া দেওয়া উচিত। কোন কোন ডাক্তারের মতে

তুই বা ততোধিক ঔষধ এক কালে ব্যবস্থেয়

হইলে পৃথকরূপে পর্য্যায়ক্রমে, এবং কাহারও কাহারও মতে একত্র মিশ্রিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাহউক, ইহাতে বাবস্থেয় ঔষধের ক্রিয়ার বিশেষ কোন বিদ্ন ঘটে না। শেষোক্ত মতের পক্ষপাতিগণ ফদফেট সকল একত্র মিলাইয়া এবং অস্থান্ত ঔষধ সকল পর্য্যায়ক্রমে পৃথকরূপে দিতে উপদেশ দেন।

ওষধের বাহ্য-প্রয়োগ।

শাভাস্তরিক ঔষধ সেবন কালে কোন কোন ঔষধের বাহ্য প্রয়োগও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ইহা নানাপ্রকারে সংসাধিত হইতে পারে। উষ্ণজল, ভেদিলিন গ্লিসিরিণ বা পুল্টিশ সহযোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোন কোন চর্মারোগে ৩× ক্রমের বিচুর্ণন ১৫ গ্রেণ ২০০ সের উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, এবং ক্ষত, কাটা ঘা, বা প্রদাহাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে উক্ত পরিমাণে ঐ ঔষধ অর্দ্ধসের পরিমিত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়ালোশন বা ধাবন রূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ক্ষতাদিতে লোশন বাতিরেকে উক্তপরিমাণ ঔষধ ১ আউন্স পরিমিত ভেসিলিন বা গ্লিসিরিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মলমরূপেও ব্যবহার করা যায়। পুল্টেসের উপর ঔষধ দ্রব্য ছড়াইয়া অথবা পীড়িত স্থানে সামান্ত পরিমাণ জলের সহিত ঔষধ দ্রব্য করিয়া লাগাইয়া তত্পরি পুল্টিস দিবে।

পিচকারী প্রয়োগ।

কোন কোন সময় আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন কালে শুহুদ্বার বা জননেব্রিয় মধ্যে পিচকারীর সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পিচকারীতে ব্যবহার জন্ম উষ্ণ ও শীতল উভয় প্রকার জলই ব্যবহৃত হয়। পিচকারী দেওয়া কালে রোগীকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাইয়া পিচকারী দেওয়া কর্ত্তবাঃ বয়স ভেদে জলের পরিমাণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। শিশু দিগের পক্ষে ২ আউন্স, বালকদিগের পক্ষে ২ হইতে ৪ আউন্স, ৫—১০ বৎসর বয়স্ব বালকদিগের পক্ষে ৬—৮ আউন্স এবং যুবকদিগের পক্ষে ২ হইতে ২ পাইণ্ট পর্যান্ত জল ব্যবহার করা যায়। স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার রোগে ১০০ ডিগ্রী উত্তপ্ত গরম জ্লের সহিত প্রযোজ্য ঔষধ গুলিয়া জননেব্রিয়ের ভিতর পিচকারী দিতে হয়। ঋতু বা প্রস্বান্তিক আবের অবক্ষরতার ইহ; সচরাচর ব্যবহৃত হয়। প্রস্বান্তিক রক্তপ্রাবে ১০০ ডিগ্রী উত্তপ্ত গরম জলের বাবহৃত হয়।

সূচী-পত্ৰ।

প্রথম অধ্যায়।

	ঔষধের নাম।	পৃষ্ঠা।	v.	র ইফ্রের নাম	পৃষ্ঠা ।
١ د	ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিক			ক্যালী সলফিউ	व्रकम् … ५२
۱ ۶	ক্যালকেরিয়। ফসফরিব	5ζ···∤ γ	61	ম্যাথেশিয়া ফস্ফ	বিকা ৯১
	ক্যালকেরিক। সলফিউ				
8	ফিরম ফসফরিকম ক্যালী মিউরিয়েটিকম ক্যালী ফসফরিকম	•••৩৯	>01	নেট্রম ফদফরি	क्य …>>१
«	ক্যালী মিউরিয়েটিক্ম	8	221	নেট্ৰম সলফিডা	विकम … ১२৯
७।	ক্যালী ফসফরিক্য	69	>> 1	সিলিশিয়া	;85
দ্বিতীয় অধ্যায়।					

ইংরেজী বর্ণমাল। অনুসারে	রোগের বাঙ্গালা নাম।	পূ	। हि
রোগের নাম।			
Abscess (এব্সেদ্)	শ্চোটক	•••	>@@
Addisions Disease (এডিসন্স	ডিভিজ্ঞ)	•••	398
Amenorrhoea (এমেনোরিয়া)	নষ্টরক্ত, প্রথম রজোদর্শনে	বিলম্ব	>७€
Anæmia (এনিমিয়া)	রক্তহীনতা	••.	290
Aneurism (এনিউরিজ্ম)	ধমগ্রব্দ	•••	39¢
Angina Pectoris (এঞ্জাইনাপে	ক্টোরিস) হাৎশূল	•••	>१७
Aphonia (এফোনিয়া)	স্বরনাশ, স্বরলোপ	•••	4
Aphthæ (এফপি)	উপক্ষত, মুথক্ষত	•••	592
Apoplexy (এপোপ্লেক্সি)	সংস্থাস।	• • •	>6-95

		9	। हि।
Appendicitis (এপেত্রিসাইটিস)	উপান্ধ-প্রদাহ	•••	> > 9
Appetite (এপিটাইট)	ক্ষুধা	•••	266
Arthritis (আর্থ্রিটস)	সন্ধিবাত, সন্ধি প্ৰদাহ	•••	४५२
Ascites (এসাইটিস)	শেখ	•••	>50
Asthma (এজমা)	খাস-কাশ, হাপানি	•••	>>
Atrophy এট্রফি) এক	াঙ্গ বা সর্কাঙ্গের শীর্ণভা	•••	866
Back Ache (न्याक এक)	কটি বেদনা	•••	36¢
Bites of Insects (বাইটস্ অব ইন্	দেক্ট দ) কাটাদির হুল	বেধ	>>9
Bones Diseases of (বোনস ডিজি	জে স অব) অস্তির রে	াগ	न हर
Brain Diseases (ত্রেইন ডিজিজেস) মস্তিক্ষের বোগ	•••	٥٥
Brainfag (থ্ৰেইন ফ্যাগ)	মস্তিকের অবসরতা	• • •	२०৫
Brights Disease (ব্রাইটস্ ডিজিজ)	্রাইটাখারোগ		२०७
Bronchitis (ব্ৰশ্বাইটিস)	বায়ুন্নী-ভুজ প্ৰদাহ	• • •	२०१
Burns and Scalds েবার্ণস এণ্ড স্ক্য	াল্ডদ) অগ্নিদাহ		२১১
Cancer (ক্যান্সার) কক	টিরোগ ; দ্ধিত অর্ক্	• • •	२ ऽ २
Carbuncle (কার্কাঃম্বন)	পৃষ্ঠাঘাত	•••	२७১
Cataract (ক্যাটার্যাক্ট)	ছানি, বিদগ্ধদৃষ্টি	•••	२७२
Catarrh (ক্যাটার)	প্রতিখ্যায় সদি	•••	3C 5
Chicken Pox (চিকেন পক্স)	জনবসন্ত, পানি বসন্ত	•••	२ ०৯
Chlorosis (ক্লোরোসিস)	মৃৎপাণ্ডু, হরিৎপাণ্ড্	•••	₹8•
Cholera (কলেরা)	ওলা উঠা	•••	२ 8 5
Chorea (কোরিয়া } হাস্ত্রোদ্ধীণ	স্ত পদ বা মূথের ধক কম্প	•••	২৭৯

		পृष्ठा ।
Cold in the head	মন্তকের প্রতিখ্রায় বা সদি	২৫ ৩
(কোল্ড ইন দি হেড) 🕽		
Colic ' किनक)	উদর বেদনা, শূল বেদনা	₹€8
Concussion of the Brain		24.0
(কক্ষঃসন অব দি ত্রেইন	মন্তিক্ষের বিক ম্প ন	२७९
Constipation (কন্ষ্টপেশন)	কোষ্ঠ বন্ধ	২ ৬৪
Convulsions (কনভঃলসনদ্)	ভড়কা	24.0
Coryza (কোরাইজা)	নাদিকারদদ্দি	২৬৯
Consumption (কঞ্চপাশন)	ক্ষয়কাস, যন্দ্ৰাকাস	290
Cough (কঃফ)	কাসি	२१৫
Croup / जून)	ঘুংড়িকাশি	२१৮
Delirium (ডিলিরিয়াম)	প্রলাপ	२४०
Dentition (ডেণ্টিশন)	দক্তোদগম	२৮১
Diabetes Mellitus (ভারেবিট	স মে লিটঃস) বহুমূত্র	२৮२
Diarrhoea (ডায়েরিয়া)	অভিসার, উদরাময়	२৮५
Diphtheria (ডিপথিরিয়া)	ঝিল্লীক প্রদাহ	२৮৯
Dizziness (ডিজিনেস)	শিরোঘুর্ণন	২৯৪
Dropsy (ডুপসি)	শোথ	২৯৪
Dysentery (ডিসেন্ট্রি)	আমরক্ত, রক্তাভিদার	२२१
Dysmenorrhosa (ডিসমেনোরি	রয়া) বাধক বেদনা, কষ্টরক্ষঃ	900
Dyspepsia (ডিসপেপদিয়া)	অগ্নিমান্দ্য	৩০৪
Ear, Diseases of (ইয়ার ডিভি	ক্জেদ অব) কর্ণরোগ	೨ . 8
Eczema (একজিমা)	পামা	৩০৮

			शृष्ठा।
Endo Carditis (এণ্ডোকার্ডইটিস)	হৃদস্তর-বেষ্ট প্রদাহ	• • •	৩০৮
Enuresis (এমুরিসিস)	অবারিত মূত্র	•••	90 6
Epilepsy (এপিলেন্সি)	মৃগী	•••	৩০৯
Epistaxis (এপিস্ট্যাক্সিস) নার্হি	দকা হইতে রক্তপাত	•••	७५२
Erysepelas (ইরিসিপেল:স)	বিশর্প, নারাঙ্গা	•••	৩১২
Eye, Diseases (আই, ডিজিজেস)	চক্ষুরোগ	• • •	9 کری
Felon (ফেলন)	আঙ্গু লহাড়া	•••	दर्
Fever, simple (ফিবার, সিম্পল)	সামান্ত জ্বর	•••	৫ ১৯
,, Intermittent (ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার) সবিরাম জ্বর		৩২৩
,, Typhoid (টাইফয়েড ফিবার)	সরিপাত জ্বর	•••	৩২৬
,, Puerperal (পিউমারপারেল ফিবার)	স্তিকা জর	•••	৩২ ৭
,, Yellow (ইয়্যালো ফিবার)	পীতজ্ঞর	•••	৩২৮
Fistula ano (ফিষ্টুলা য্যানো, ভগন্দর) মলদারে নালীক্ষত	•••	৩২৮
Gall-stone (গল ছোন)	পিভশিলা	•••	৩২৯
Gastric Derangements } আমাশ (গান্তিক ডিরেঞ্জমেণ্টস)	ায়ের বা পাকস্থলীর ে	রাগ	೨೨೦
Glandular Affections (গ্লাণ্ডিউলার	এফেক্সন্স) গ্রন্থির	রোগ	৩৩৪
Goitre (গয়টার)	গ্ৰগণ্ড, ঘ্যাগ	•••	৩৩৬
Gonorrhœa (গনোরিয়া)	প্রমেহ	•••	৩৩৭
Gout (গাউট)	গ্রন্থিবাত	•••	08 5
Hæmoptysis) ফুদ (হিমপ্টিসিস)	াফ়স হইতে বক্তস্রাব	•••	08 5
Headache (হেডেক)	শির:পীড়া, মাথাধরা	•••	08 5

			शृष्ट्री।
Heart Affections (হার্ট্য্যাফেব	দশন্স) হৃৎপিণ্ডের রো গ	•••	৩8७
Hemorrhage (হিমরেজ)	রক্তপ্রাব	•••	986
Hemorrhoids (হেমরয়েড্স)	রক্তপ্রাবী অর্শ		و88
Hiccough (হিক:ফ)	হিকা	•••	O()
Hipjoint Disease (হিপজয়েণ্টা	ডি জি জ) উরু সন্ধির রোগ	•••	৩৫৩
Hoarseness (কোস নেস)	স্বরভঙ্গ	•••	৩৫৩
Hydrocele (হাইড্রোসিল)	কুরও	•••	৩ ৫8
Hysteria (হিষ্টিরিয়া)	গুন্মবায়ু, মৃচ্ছাবায়ু	•••	৩৫৬
Insomnia (ইনসম্নিয়া)	নিদ্রাহীনভা	•••	06 5
Jaundice (জ্বণ্ডিস)	কামলা	•••	৩৬•
Kidneys, Affections of (faw	নিস,য়্যাফেক্সন্স অব্) বৃক্ক	করোগ	1 060
Labour and Pregnancy	গর্ভ ও প্রসব বেদন।	• • •	৩৬২
(লেবার এণ্ড প্রেগ্ন। नि)			
Leucorrhoca (লিউকোরিয়া)	শেত-প্রদর	•••	<i>966</i>
Liver, Affections of (निভার,	য়্যাফেকসন্স অব্; যক্ত	দ্রাগ	৩৬৮
Lumbago (লম্বেগা)	ক টিবাভ	•••	990
Mamary abscess (এবসেস ড্রন্থ	ব্য)		>66
Measles (মিজেল্স)	হাম, লুন্তি, ফেরা		
Meningitis (মিনিঞ্জাইটিস)	মন্তিক-ঝিল্লী-প্ৰদাহ	•••	৩৭৩
Menorrhagia (মেনরেজিয়া)	রক্তপ্রদর, রজসাধিকা	•••	৩18
Mental conditions }	মানসিক ভাব বা অবস্থা	•••	৩৭৮
(মেণ্টাল কণ্ডিসন্স)			
Metritis (মিট্রাইটিস)	জ্বায়ু-প্রদাহ	•••	OF 2

			পৃষা।
Miscarriage (মিদ্ক্যারেজ)	গৰ্ভস্ৰাৰ	• • •	9 F3
Morning sickness } (মণিং সিকনেস)	গভিণীদিগের প্রাত:-		
(মণিং দিকনেদ)	কালীন বিবমিষা	•••	OF 3
Mouth, Diseases of ?	মুখের রোগ	•••	৩৮১
(মাউথ, ডিজিজেস অব্)	2011 0111		
Mucous Membrances ?	শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বোগ	•••	৬৮৩
(মিউকঃস মেম্বেন্স)			
Mumps (मण्याःम)	কৰ্ণমূল-প্ৰদাহ	•••	৩৮৪
Neuralgia (নিউর্যালজিয়া)	সায় শূৰ	•••	940
Ophthalmia (অপথ্যালমিয়া)	চক্ষু উঠা	•••	৩৮৭
Orchitis (অর্কাইটিস)	অগুপ্ৰদাহ	•••	৩৮৮
Pain (পেইন)	বেদনা	• • •	৩৮৮
Paralysis (প্যারাণিসিস)	পক্ষাঘাত	•••	ಿ
Pthisis Pulmonalis	যক্ষাকাস		৩৯২
(থাইসিস পঃলমোনেলিস 🏸			
Pleurisy(প্লুরিসি)	ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ		৩৯২
Pneumonia (নিউমোনিয়া)	ফুসফুস প্রদাহ		೨৯೨
Rheumatism (বিউমেটিঙ্গম)	বাত, আমবাত		৩৯৭
Rachitis (রেকাইটিস)	অস্থির কোমলভা		8 • >
Scarlatina (স্বালে টিনা)	আরক্ত জ্ব		8 ७ २
Sciatica (সায়েটিকা)	কটিবাভ		وه ع 9
Self Abuse (সেলফ এবিউস)	হস্ত মৈথুন		8 • 8

			পৃষ্ঠা।
Skin, Affections of the (স্থিন, য্যাফেকা	দন্স অব দি) চৰ্ম্ম	রোগ	8 o ¢
Sleep (h)	নিদ্রা	•••	8 • 9
Small Pox (শ্বল পক্স)	বসস্ত	•••	8.4
Sore Throat (সোর থ্যেট)	গল-ক্ষত	•••	8>>
Spasms (ম্প্যাজম্স)	দাক্ষেপ, খেচুনি	•••	852
Spermatorrhoea (স্পার্শ্বেটোরিয়া)	শুক্রমেহ	•••	850
Suntroke (সন ষ্ট্ৰোক)	শদ্দি গশ্মি	•••	878
Syphilis (দিফিলিস)	উপদংশ, গশ্মি	•••	878
Testicles, Diseases of (টেষ্টিকেল্স, ডি	জিজেস অব) অ	ণ্ডকো	বের
	পীড়	31	8>9
Tongue And Taste (টঃঙ্গ এণ্ড টেষ্ট)	জিহ্বা ও মাসা	म न	874
Tonsilitis (টিন্সিলাইটিস)	তালুম্ল প্রদাহ	•••	6 ¢ 8
Tooth Ache (টুথেক)	न ख-ण्ल	•••	8 २ o
Tumor And Cancer (টিউমার এণ্ড ক্যা	ন্সার) অর্বন	•••	822
Ulcers And Ulcerations)			
অ:লসারস্ এও অ:লসারেসন্স	শ্বন্দ ত		8 २७
Urinary Disorders			
Cilitary Disorders	মৃত্রযন্ত্রের রোগ		838
(ইউরিনারি ডিস্মর্জার্স)			-
Uterus Diseases of			
(ইউটির:স ডিজিজেস্ অব)	জরায়ুর রোগ		8₹₡
Vaccination (ভাক্সিনেশন)	টীকা দেওয়া		034
	শিরোঘূর্ণন	•••	82 &
Vertigo (ভাটিগো) Vomitting (ভশিটিং)	-	•••	829
	ব্যন	•••	824
Writers Cramp (রাইটাস ক্র্যাম্প)	XONEX XIE		<i>₹</i> 58 •€8
Whooping cough (ভূপিংক:প)	ভূপশক্ক কাসি		
Worms (अव्यादम्म)	ক্বমি	•••	895

পরিশিষ্ট

এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল সম্বন্ধে কতিপয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমত

· (বাবু রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল কৃত 'জল চিকিৎসা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

- (1) I declare as my conscientious conviction. founded on long experience, that if there was not a single physician, surgeon, man-midwife, chemist. apothecary, druggist, nor drug on the face of the earth, there would be less sickness and less mortality, than now prevail'-James, Johnson M. D., F. R. S., Editor of Medico-Chirurgical Review. অর্থাৎ—"বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমার বিবেক-প্রণোদিত এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ষে, যদি পৃথিবীতে একটাও চিকিৎসক, সার্জন (অন্ত বিভা বিশারদ), ধাত্রী, রসায়ণ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিভ, ঔষধ প্রস্তুভকারী এবং ঔষধ বিক্রেভা না থাকিভ বা আদপেই ঔষধের সৃষ্টি না হইড, ভাহা হইলে পৃথিবীতে বর্ত্তমান কালাপেকা রোগও অনেক কম হইত এবং মৃত্যু সংখ্যাও এত বেশী হইত না।'— জেমন জনসন এম, ডি; এফ আর এন্ (মেডিকো চিরারজিক্যাল্ রিভিউ নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক)।
- (2) "I can not answer to my conscience to withhold the acknowledgment to my firm belief, that the medical profession (with its prevailing mode of practice) is productive of vastly more evil than good, and were it

abcolutely abolished, mankind would be infinitely gainer"—Francis Goggswell M. D. of Oston B. বঙ্গানুবাদ—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বর্তুমান কালের প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতি জনসাধারণের উপকারাপেক্ষা প্রভূত পরিমাণে অপকারই সাধন করিতেছে। অধিকন্ত, এইরূপ চিকিৎসা-পদ্ধতি একেবারে না থাকিলেই মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ হইত। অংমার এই নিশ্চিত ধারণা জনসমাজে ব্যক্ত না করিলে আমি আমার বিবেকের নিকট নিশ্চরই অপরাধী হইতাম।" ফ্রানসিদ্ পগ্ স্ওয়েল এম্, ডি অব অস্টন্ বি।

- (3) 'Our actual information or knowledge of disease does not increase in proportion to our experimental practice. Every dose of medicine given is a blind experiment on the vitality of the patient.' Dr. Bosteck, Author of "The History of Medicine." অর্থাৎ "আমাদের এই পরীক্ষা-মূলক চিকিৎসা-প্রণালীর পসার রৃদ্ধির অন্তপাতে রোগ সম্বন্ধে আমাদের বাস্তব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি একেবারেই হয় না। প্রত্যেক ঔষধের মাত্রা,—যাহা আমরা রোগী বিশেষকে দিয়া থাকি—তাহা সেই রোগার জাবনী-শক্তির উপর সম্পূর্ণ অন্ধভাবের পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে।' ডাঃ বোস্টক্, 'দি হিষ্টুরি অব্ মেডিসিন' অর্থাৎ "ঔষধের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের প্রণেতা।
- (4) "Let us no longer wonder at the lamentable want of success which marks our practice, when there is scarcely a sound physiological principle among us. I hesitate not to declare, no matter how sorely I shall wound our vanity, that so gross is our ignorance of the real nature of the physiological disorder called disease, that it would purhaps be better to resign the complaint

into the hands of Nature, than to act, as we are frequently compiled to do, without knowing the why and wherefore of our conduct, at the obvious risk of hastening the end of the patient."-M Magendie, an eminent French Physiologist and Pathologist.—খাতনাৰ ফরাসী শরীর-বিজ্ঞান ভত্তবিৎ ও নিদান ভত্তবিৎ পণ্ডিত এম, ম্যাগেণ্ডাই বলেন—'যে কেতু শ্রার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে 'আমাদের অভ্রান্ত জ্ঞান নাই বলিলেই চল্লে-সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা-ব্যবসায় ব্যাপারে আমাদের ঘোর অক্তবার্য্যতা কিছুই আশ্চর্যোর বিষয় নহে। আমি ইহা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিভেছি যে, শারীরিক বিকৃতি ও তাহার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অজতা এত বেণা (যদি ও এই স্বাকারোক্তি আমাদের র্থাগর্কের থর্কতা স্চক) যে, রোগীকে আমাদের নিজ হস্তে না রাখিয়া স্বভাবের হস্তে গ্রস্ত করিলেই অনেকাংশে ভাল হয়। আমরা আমাদের কায়োর ভবিষ্যৎ ভালমনদ কিছুমাত্র বিচার-বিবেচনা না করিয়া যে সমস্ত কার্যা করিতে বাধ হই, ভাগার অব্যবহিত ফল, খুবই সম্ভবতঃ, অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যেই রে:গীর প্রাণবায়ু বহির্গত করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

(5) Assuredly the uncertain and most unsatisfactory art, that we call medical science is no science at all, but a jumble of inconsistent opinions, of conclusions hastily and often incorrectly drawn, of facts misunderstood or perverted, of comparisons without analogy, of hypotheses without reason and theories not only useless but dangerous."—Dr. Frank, European author and practitioner.—ইউরোপের খ্যাতনাম চিকিৎসক ও গ্রন্থকার ডাক্তার ফ্র্যান্থ বিশেন,—"চিকিৎসা নামে যে এক অতীব অনিশ্চিত ও অতীব অসম্ভোষ-জনক বিজ্ঞান আছে, ভাহাকে কোনও প্রকারেই 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত

করা চলে না। যে হেড়ু ইহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই কডকগুলি অসামঞ্জ পূর্ণ মতের সমষ্টি, কডকগুলি অপরিণত ও ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত, কডকগুলি ঘটনা যাহার সভাতা উপলব্ধি হয় নাই, বা যাহার বিক্তার্থ করা হইয়াছে এবং যাহাকে সাদৃশুশুল উপমা, প্রমাণবিহীন কল্পনা এবং অসার বিপদ সন্তুল মতবাদ ব্যতীত আর কোন নামে অভিহিত করা চলে না।"

(6) "It cannot be denied that the present system of medicine is a burning shame to its professors, if indeed a series of vague and uncertain incongruities deserves to be called by that name. How rarely do our medicine do good! How often do they make our patients really worse! I fearlessly assert that, in most cases the sufferer would be safer without a physician than with one." Dr. Ramage, Fellow of the Royal College, London—লগুনের রয়েল কলেজের ফেলো ভাক্তার র্যামেজ বলেন:---অধুনাভন প্রচলিভ চিকিৎসা-প্রণালীকে চিকিৎসা-প্রণালী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ, এইরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি কেবল মাত্র কতকগুলি অনিশ্চিত, অসম্ভব ও অনিদিষ্ট মভামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর হাঁহার। এইরূপ চিকিৎসা-প্রণালীর মতামুবর্ত্তী চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা এক মহা শক্জাজনক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যে সকল ঔষধ ব্যবহার করি, ভদ্দার। কদাচিৎ রোগীর উপকার হয়। বরং অধিকাংশ স্থলেই এই সমস্ত ঔষধ রোগীর অবস্থা অপেক্ষাস্কৃত খারাপ করিয়া ভোলে। আমি সম্পূর্ণ নিভীকচিত্তে এ কথা বলিতে পারি ষে, চিকিৎসকের সাহায্য ব্যভিরেকে বিনা চিকিৎসায়ই রোগীর অবস্থা অনেক নিরাপদ থাকে।"

⁽⁷⁾ Dissections daily convince us of our ignorance of disease, and cause us to blush at our prescriptions.

What mischief have we not done, under the belief of false facts and false thories! We have assisted in multiplying diseases. We have done worse—we have increased their fatality."—Benjamin Rush M. D., Formerly Professor First Medical College, Philadelphia. ফিলাডেলফিয়ার ফাষ্ট্র মেডিকেল কলেকের পূর্বতন প্রফোনার বেঞ্জামিন রাশ্ এম, ডি বলেন:—"রোগের কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা কতদ্র অজ্ঞ, তাহা শব-বাবচ্ছেদ ক্রিয়া হইতে আমরা প্রত্যহ উপলব্ধি করিতে পারিছেছি। সেই অজ্ঞতার কথা ভাবিলে লক্ষায় আমাদের মন্তক অবনত হয়। কতকগুলি ভ্রান্ত ও অমূলক ভিত্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া আমরা কগতের কতই না অনিষ্ট্র সাধন করিতেছি! রোগের সংখ্যারুদ্ধি ব্যাপারে আমরা সহায়তাই করিয়া থাকি। আর শুধু তাহাই নহে,—বে সমূদ্য রোগ প্রাণ হানি করিয়া থাকে আমরা তাহারও সংখ্যা রুদ্ধি করিতেছি।"

^{(8) &}quot;The medical practice of our day is at the best a most uncertain and unsatisfactory system; it has neither philosophy nor common sense to commend it to confidenc."—Prof. Evans, Fellow of the Royal College, London.—লগুন বয়েল কলেকের ফেলো, প্রফেসার ইভান্স বলেন:—
"বর্ত্তমান কালে আমাদের মধ্যে যে চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা অতীব অনিশ্চিত ও অসন্তোষজনক বৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।
বিজ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান বাহাই কেন বলুন না, ইহার মধ্যে এমন কিছুই নাই বাহা লোকের মনে এই বিশাস জন্মাইতে পারে।"

^{(9) &}quot;I have no faith whatever in medicine."—Dr. Baillie of London. লগুনের ডাক্তার বেলি বলেন,—'ঔষধের উপর ভাষার কিছুমাত্র আস্থা নাই।"

- (10) "The vital effects of medicine are very little understood. It is a term used to cover our ignorance. Prof. E. H. David M. D., New York Medical College. নিউ ইয়ৰ্ক মেডিকেল কলেজের প্রফেলার ডাঃ ই, এইচ, ডেভিড বলেন —"ঔষধেব জীবনী-শক্তি দিবার ক্ষমতা আছে কিনা, তাহা আমরা বৃঝি না বলিলেই হয়। ঔষধ বলিয়া একটা নাম যে আমরা ব্যবহার করি তাহা কেবল আমাদেব অক্সতাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্ম।"
- (11) In their zeal to do good, physicians have done much harm. They have hurried many to the grave, who would have recovered, if left to Nature. All our curative agents are poisons and as a consequence, every dose diminishes the patient's vitality."—Prof. Alonzo Clark M. D. —প্রফেসার এলোঞ্জো ক্লাক এম. ডি বলেন,—'রোগারোগ্য করিতে গিয়া চিকিৎসকগণ অধিকতর অপকার সাধনই করিয়া থাকেন। অনেক সময় এমন সব রোগা থাকে, যাহাদিগকে স্বভাবের উপর ফেলিয়া রাখিলে বোধ হয় বাঁচিতে পারিত কিন্তু চিকিৎসকেব হস্তে পড়িয়া অকালে কালগ্রাদে পতিত হয়। রোগারোগ্যের উদ্দেশ্যে 'ঔষধ' বলিয়া আমরা যে সব জিনিষ ব্যবহার করি, সেগুলি সকলই 'বিষ' এবং তাহার প্রত্যেক মাত্রাই রোগীর জীবনী-শক্তি হাস করাইয়া দেয়।"
- (12)"It is also taught in all their books and schools, that disease is an entity, a thing foreign to the living organism and an enemy to the life-principle. The truth is exactly the contrary. Disease is the life-principle itself at war with an enemy. It is the defender and protector of the living organism. It is a process of

purification. It is an effort to remove foreign and offensive materials from the system and to repair the damages the vital machinery has sustained. It is a remedial effort. Disease is therefore, not a foc to be subdued or cured, or killed but a friendly office to be directed and regulated and every attempt to cure disease with drug poisons is nothing more nor less than a war on the human constitution. The treatment of disease with drugs, ever was, now is and always must be uncertain and dangerous experimentation. It never was and never can be reduced to reliable practical rules.'-(The Principle of Disease as curative crises—by Dr. Trall M. D., the well known Physiologist. —প্রসিদ্ধ শ্রীরতম্ববিৎ ডাঃ ট্রল এম, ডি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,---- "সমুদ্য ডাক্তারী পুস্তকে ও চিকিৎসা-বিস্থালরে শিক্ষ। দেওয়া হয় যে, 'রোগ' অর্থে এমন একটা জিনিষ, যাহা জাব-দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং যাহ। প্রাণী দেহের শত্রু বিশেষ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথা মোটেই সভা নহে। রোগ অর্থে,--আমাদের শরীরের অভান্তরন্থ এমন একটী আভান্তরিক বৃত্তি যাহার কার্য্য অপর একটা শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। রোগই আমাদের এই জীব-দেহের রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। শারীরিক বৃতিগুলিকে বিশুদ্ধ করাই হইল রোগের কার্যা। রোগের কার্যাই হইল আমাদের দেহ হইতে দৃষিত অনাবশ্রক পদার্থকে বহির্গত করিয়া দেওয়া এবং আমাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য মেরামত করা। রোগের অর্থ ই হইল দেহের ক্ষতি খেসারতের প্রতিকার। স্থতরাং, ব্যাধি বলিলে আমাদের এরূপ বুঝা উচিৎ নয় যে, উহা আমাদের একটা পরম শক্র যাহাকে হত্যা বা দমন করিতে হইবে। পক্ষাস্তরে, রোগ আমাদের শরীরের বন্ধু বিশেষ, যাহার কার্য্যকলাপ সংযত ও ঠিকভাবে

পরিচালিত করিতে হইবে মাত্র। এজন্ত বিষাক্ত ঔষধ দারা রোগের প্রতিকার করিবার চেষ্টা মহন্য দেহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিষাক্ত ঔষধ দারা রোগোপশম করিবার উল্পোগ ভূত, ভবিষাৎ ও বর্ত্ত মানকালে একই প্রকার অনিশ্চিত বিপদ সঙ্কুল পরীক্ষার কার্য্য মাত্র। এরপ চিকিৎসা-প্রণালী বিশ্বাস বোগ্য ও কার্য্যকরী নিয়মের দ্বারা কথনও বিধিবদ্ধ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবার নহে।"

(১৩) অপর একজন বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন বে, বর্ত্ত মানে প্রচলিত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থগুলি যদি জলে ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে মানবজাতির প্রভূত মঙ্গলই সাধিত হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতে হয় তো জলচর জন্তুগুলির ক্ষতি হইতে পারে।

অনাবশ্যক বোধে আমরা অপরাপর ডাক্তারগণের উক্তি উদ্ধৃত. করিতে বিরত রহিলাম।

ডাঃ নৃপেশ্রচন্দ্র রায় এম ডি, বি-এইচ্-এস্ রুড পুস্তকাবলী

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহ-চিকিৎসা— (বহুলরপে পরিবিদ্ধিত ৩য় সংস্করণ); এই সংস্করণের পরিশিন্তে "ভিষজ্য-রত্মাবলী" নামে ৬০টা সর্বাল ব্যবহার্য্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রধান প্রধান ও পরিচালক লক্ষণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইছাতে ঔষধ নির্বাচনে পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে বিশেষ স্থবিধা হইবে। এই গ্রন্থে মাবতীয় রোগের কারণ, লক্ষণ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও পথ্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিষদভাবে বণিত হইয়াছে। এতদ্বাতীত বহু রোগের টোট্কানট্কা, মৃষ্টিযোগ এবং বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্যের কৌশলও এই গ্রন্থে বণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে **প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের মন্তব্য** নিম্নে উদ্ধৃত হইশ—

বঙ্গবাসী:—গ্রন্থকারের নাম চিকিৎসা-জগতে স্থপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থানি হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত। ইহাতে নানা রোগের কারণ, লক্ষণ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও পথ্যাদি এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে বির্তু করিবার প্রয়াস আছে। গ্রন্থকার ইহাতে ক্তিত্ব দেখাইয়াছেন। এতদ্বাতীত, বহু টোট্কা-নাট্কা, মৃষ্টিযোগ এবং বিনাওষধে রোগ আরোগ্যের কৌশলও এই গ্রন্থে লিখিত আছে। পৃস্তকের ভাষা সরল। এ গ্রন্থ চিকিৎসক ও গৃহস্থ উভয়েরই উপকারক। হিতবাদী: —পৃস্তকের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। এ পৃস্তক দারা গৃহস্থগণ বিশেষ উপকার পাইবেন; পৃস্তকের ভাষা সরল।

The Herald:—We have seen a copy of the above book by Dr. Nripendra Chandra Roy, Lecturer of Materia Medica & Practice of Medecine at the Dacca Homœopathic College of Physicians & Surgeons. The book contains an exhaustive dealing of the cause, symptoms and treatment of female diseases & diseases of children. The book will no doubt be of good service to all householders. The price of the book is moderate. The get up is good & language lucid.

- ২। পুরাতন রোগ (হানিম্যানের ক্রণিক ডিজিজের বঙ্গান্তবাদ) (২য় সংস্করণ) যন্ত্রস্থ। মূল্য ॥০।

 - ৪। কালাজর ও উহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা (২র সংকরণ); মূল্য ॥ ।
 - ৫। বাইওকেমিক রিপার্টরা (২য় সংস্করণ); ম্ল্য ১॥०।
 - ৬। বাইওকেমিক সরল গৃহ চিকিৎসা (২য় সংস্করণ); মূল্য ৮০ আনা।

৭। বাইওকেমিক ভৈষজ্যভন্ধ ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা (৭ম সংশ্বরণ) প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা ; উৎকৃষ্ট বাধাই ; মূল্য ৩ টাকা মাত্র। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে The East Bengal Times বলেন—

That this book has already undergone half a dozen more editions is the proof positive of its popularity. Biochemic treatment has more votaries today than it had some years back and as such the need of a book like this which covers the entire range of Materia Medica as well as Practice of medicine can hardly be over estimated. The unique feature lies in the copious illustrations cited from vast and varied experience of the author as a Practitioner with a wide reputation throughout the province. The lucid and simple style of writing has made the book all the more interesting and accessible to all classes of people who would surely welcome the publication as a veritable Home Doctor.

৮। উপদেশ-সংগ্রহ (২য় সংস্করণ); ম্লা। ০ চারি আনা।

১। সাধক-সহচর (यञ्जञ्) মূল্য॥ । আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—
হোমিও পাবলিশিং হাউস্
২নং ওয়ার খ্রীট, পোঃ উয়ারী
(ঢাকা)

বাইওকেমিক ভেমজাতত্ত্ব চিকিৎসা প্রদলিকা।

क्रानिक्तिया द्वातिका।

(Calcarea Fluorica)

ইছা একপ্রকার খনিজ ধাড়ু বিশেষ। ইছাতে শতকরা ৫৮-২ ভাগ চূণ আছে। ইছা স্ফাটকেরস্তায় উজ্জ্বল এবং নানা বর্ণের ও আকারের পরিদৃষ্ট হইরা থাকে। ইহা জলে জবীভূত হয় না। হোমিওপ্যায়িক বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে খল করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ইহার অপর নাম ফ্রোরাইড্ অব লাইম। সংক্ষিপ্ত নাম ক্যাক্-ফ্রোর।
ইহা দেহত্ব অওলাল বা এবুমেনের সহিত মিলিত হইরা কার্য্যকরী হইরা
থাকে। অওলালের সহিত মিলিত হইরা এই পদার্থ দন্তের ও অন্থির
বহিরাবরণ (enamel of teeth and bone), মাংস পেশীর স্থিতিস্থাপক
স্ত্র (elastic fibre) এবং সর্বপ্রকার সংযোজক টিম্ন (connective
tissues) সকল নির্দ্ধাণ করে। যদি কোন কারণ বশতঃ দেহত্ব এই
পদার্থ স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তবে পূর্কোক্ত বিধান
অবাং টিম্ন মকল প্রসারিত ও শিথিল (dilated and relaxed) হইরা
পড়ে। যদি শিরা বা ধ্যনীর প্রাচীরের (walls of vessels) অথবা

রসবাহী-প্রণাণীর (lymphatic system) এই প্রকার অবস্থা উৎপর হয়, তবে ঐ সকল স্থানে কঠিন পদার্থ সমূহ (আচ্বিত হইতে না পারায়) সঞ্চিত হইতে থাকে ও ঐ সকলম্বানে কঠিন স্থীততা উৎপন্ন করে।

জরায়ৢর আলম্বন পেশীতে এই পদার্থের অভাব হইলে, পেশীর শিথিলতা প্রযুক্ত জরায়ু নীচের দিকে নামিয়া পড়ে, ধমনী ও শিরার আবরণ পেশীতে ইহার অভাব ঘটিলে উহাদের ফীততা জন্মে, উদরের ছিতিছাপক (elastic) পেশীতে ইহার স্বল্লতা ঘটিলে উদরের সুহত্ততা (hanging belly) জন্ম জরায়ুর পেশীতে ইহার অভাব ঘটিলে জরায়ু হইতে প্রবল রক্তশ্রাব হয় এবং প্রস্বান্তিক প্রাবের অভাব ঘটে। স্বকের বহিরাবরণে ইহার অভাব ঘটিলে উহা হইতে কিরেটিন (Keratin) নামক পদার্থ নিঃস্তত হইয়া স্বকে সঞ্চিত হয়, যাহার ফলে হস্ত ও পদতলের বিদারণ জন্মে। (Keratin নামক পদার্থ স্বকের বহিরাবরণ, চুল এবং নথে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে)। সরলান্তের পেশীতে ইহার অভাব ঘটিলে অর্শ ও কোষ্ট্রবন্ধতা উৎপন্ন হয়। অন্তি এবং দক্তের বহিরাবরণের পীড়া সমূহ, যাবতীয় গ্রন্থির ফাইততা ও প্রস্তরবং কঠিনতা, অন্ত, প্রীহা ও যক্ততের বিবন্ধন ও প্রস্তরের স্থায় কঠিনতা, জিহ্বা এবং হস্ত-পদের বিদারণ (ফাটা) এই পদার্থের অভাব হেতুই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আময়িক প্রয়োগ (Therapeutic use)

অন্থির যে কোন রোগে, অন্থির বহিরাবরণ (enamel) আক্রান্ত হইলে, দস্ত রোগে দস্তের বহিরাবরণ বা enamel আক্রান্ত হইলে (অর্থাৎ দন্ত ক্ষয় প্রোপ্ত হইলে) এবং ত্বকের বা শরীরের যে কোন স্থানের সংযোজক বিধান-তম্ভ বা Connective tissueর পীড়ায় এবং মাংস পেশীর স্থিতি স্থাপক ক্রের শ্লণতা প্রযুক্ত যে সকল পীড়া হয় অথবা শিরা (vein) বা ধ্যনীর (artery) পেশীর যে কোন রোগে ইছা অবশ্র ব্যবহার্য। এই জন্তই এই ঔষধ শিরা বা ধ্যনীয় পেশী শ্লণ হইয়া পড়িলে (relaxed condition of the elastic fibres, including dilatation of blood vessels) সংপিত্তর বিবর্দ্ধনে (dilated heart) শিরা বা ধ্যনীর উপর অর্কুদ বা টিউমার জন্মিলে, অর্শে এবং শিরার ফীততার, (varicose veins) সর্ব প্রকার গ্রন্থির প্রস্তরের ন্তায় কঠিন স্ফীততার (indurated glands of stony hardness)।

অন্থির বা দন্তের অসম্যক পরিপোষণে (malnutriton of bones and teeth), বৃহৎ উদর (হাত পা কাঠি কাঠি কিন্তু গণেশের ন্থায় লাখোদর—pendulous abdomen); জরায়ু নামিয়া পড়া বা জরায়ুর যে কোন প্রকারের অবস্থানের বিচ্যুতিতে (displacements of uterus) এবং জরায়ুর কাঠিন্তে; প্রসব কালে জরায়ু মুনেশ কাঠিন্তে (hard and indurated Os); অন্তকোষের কঠিন ক্ষাত্তায়; যক্ষৎ ও প্রীহার বিবৃদ্ধি ও কঠিন ক্ষাত্তায়, শরীরের যে কোন প্র্যাণ্ড বা গ্রন্থির কঠিন ক্ষাত্তায় এবং হার্ড শ্রান্থারে ইহার সক্ষাতার সহিত ব্যবস্থত হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণ

শ্বীবেব যে কোনও স্থানের প্রস্তরবৎ কঠিনতা ইহার অভাবস্থাক সর্ব-প্রধান বিশেষ শক্ষণ। রোগ যাহাই কেন হউকনা, রোগাক্রাস্ত স্থান প্রস্তরের ন্থায় শক্ত হইয়া উঠিলে ইহা অতিশয় সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রক্তে এই পদার্থের অভাব হইলে, স্থান ও যন্ত্রভেদে নিম্নিথিত লক্ষণ

সমূহ উৎপন্ন হইতে পারে। স্থতরাং ঐ সকল লক্ষণ দৃষ্টে ইহা ব্যবহার করিলে উত্তম ফল দর্শে।

প্রধান প্রধান লকণ

আনা ।—অতিশয় নিরুৎসাহিতা। আর্থিক বিনাশ সম্বন্ধে বুথা ভর,
কোন বিষয়েই ছির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। মনে করে
মে ছনিয়ায় অর্থের স্থায় আর কিছুই নাই; এই অর্থ বিনাশের ভয়েই সে
সর্বাগ চিস্তাগ্রন্ত।

মস্তক ।—সভজাত শিশুদিগের শিরো-গুল্ম (টিউমার); রক্তগুল্ম;
মস্তকের অন্থির মুইতা জনিত কঠিনতা ও ধরম্পর্শতা; অন্থির ক্ষত; মস্তকের
অন্থির কঠিন বিরুদ্ধি, মাথার হাত দিলে শক্ত অর্ধুদের ন্যার হাতে লাগে।
অপরাহে মুর্ফ্রাকর বিবমিষা সহকারে শিরংপীড়া (মাথাধরা); সন্ধ্যার
সমর উহার হাস প্রাপ্তি। মস্তকের অন্থিতে অসমপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ক্ষত।
মস্তকে একপ্রকার কড় কড় ধর থর শন্দ শুনা ও তজ্জ্ঞ্জ নিদ্রার ব্যবাত।
অপরাহে মুর্ফ্রাকর বিবমিষা (বিম বমিভাব) সহ শিরংপীড়া। মস্তকের
অন্থিতে টিউমার। গ্রন্থকার ক্যাক্তফ্রোর ৬×ক্রম ব্যবহার করিরা জনৈক
ডাক্র বের ২২ বৎসর বয়র পুত্রের বছদিনের পুরাতন মস্তকের প্রকাঞ্জ

ভকু ।—ছালি। চকুর অতিরিক্ত চালনা জনিত অকিগোলকে বেদনা এবং অসপত্ত দৃষ্টি। চকুর বিশ্রামে উহার উপশম। চকুর সমুখে ঝিলিমিলি ও ফুলিক দর্শন। কর্ণিরায় (চকুর ক্রফবর্ণ মণ্ডল) দাগ; চকুর পাতার টিউমার বা অঞ্জনী। ক্রিয়ায় ক্ষতে ক্ষতের প্রান্ত শক্ত পাকিলে ইহা অভিশয় ফলপ্রদ। অকিগোলকে বেদনা, আন্তে চাপদিলে বা চকু বুজিলে উহার উপশম। আংশিক দৃষ্টিহীনতা। অভি ব্যবহার জন্য ঝাপশ দৃষ্টি।

কেন্দ্র যে কোনও রোগে অন্থি এবং অন্থি-বেষ্ট্র (periosteum) আক্রান্ত হইলে ইছা বিশেষ উপযোগী। কর্নপটহে চূর্নময় (calcareous) পদার্থ সঞ্চয়। যাষ্ট্রেড অন্থির রোগে অন্থিবেষ্ট্র
(পেরিঅন্থিয়ম) আক্রান্ত হইলে ইছা স্থলর উপযোগী।

নাজিকা।—নাগাবরোধক মন্তকের প্রতিশ্রায় (সর্দি) সহকারে গাঢ়, পীতবর্ণ, থানা থানা, হরিভাভ স্রাব নিঃসরণ। থানা থানা হুর্গরি স্রাব ; ওজিনা (নাগারন্ধ হইতে হুর্দম্য হুর্গর্ধময় স্রাব নিঃসরণ)। (ক্যালী ফস, সিলি)। নাসিকার রোগে অস্থি আক্রান্ত হুইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ (ক্যান্ধ-ফস)। হাঁচিবার বিফল প্রয়াম। নাসাভ্যন্তরে অস্থিময় বিবর্দ্ধন (osseous growth)। নাসিকার অস্থিপচিয়া হুর্গর্ধ বাহির হুইলে এই ঔষধ ব্যবহারে উহা নিবারিত হয়। নাসাল পশ্চাৎ রক্ষের ও গলকোষের (ক্যারিংস) শুনীতভা।

সুখানাগুলন—বেদনা অথবা দস্তবেদনা সংযুক্ত গণ্ডের (গালের)
কঠিন দ্বীততা। মাড়ি অথবা গণ্ডান্থির অন্থিমন্ন বিবর্দ্ধন। দাসিকা বা
ওঠের বিদারণ (ফির ফল)। ঠাণ্ডালাগার দরুণ ওঠে বেদনাশুন্য কত।
হন্দ্র অথাৎ চৌয়ালের অন্থির (Jaw-bone) নালীক্ষত, উহা হইডে
রুষ্ণবর্ণ রক্তাক্ত গুর্গন্ধি স্রাব ক্ষরণ।

মুখ্ মান্ত ওঠ; মাড়ির প্রস্তরের স্থায় কঠিনতা সংযুক্ত দুণীততা। মাড়ির স্ফোটক (gum boil); মুখের অতিশর শুদ্ধতা। কৌলিক উপদংশ; মুখ ও গলায় কত। মুখের কোণে বেদনাশৃত্য কত। দুস্কত।—দস্তমূল-গহরের দস্তের শিখিলতা, তজ্জ্জ্জ বেদনা বা বেদনার অভাব। ধরম্পর্ল, পাতলা এবং ভক্ষপ্রবণ দস্ত। শীঘ্র শীঘ্র দস্ত ক্ষয় (ক্যাক্ত-ফ্সের শহিত পর্যায়ক্রমে)। দক্ষেক্যমে বিলম্ব। থাত্তদ্রের

সংস্পর্শে দন্তবেদনা। দন্তের শিথিলতা সহ দন্ত বেদনা। দন্তের বহি-রাবরণের থরস্পর্শতা। দন্তের পরিপোযণের অভাব।

ক্তিন্তা।—বেদনাযুক্ত বা বেদনাশৃষ্ঠ, কঠিন, বিদারিতবং জিহ্বা, বিশেষতঃ প্রদাহের পর (শিলি)। জিহ্বার পুরাতন কঠিনতা, বিশেষতঃ প্রদাহের পর।

প্রকাশনার ।—কণ্ঠের শিথিলতা। আলজিহ্বার বির্দ্ধি, তজ্জন্ত শুক্ষ থক থক কাসি (ন্যাট-ফদ্)। ডিফথিরিয়াব (নিল্লীক প্রদাহ) প্রদাহ বায়ুবাহী-লল পর্যান্ত সম্প্রদারিত হইয়া থাকিলে ইয়া বিশেষ উপযোগী (ক্যাল্কফস সহকারে পর্যায়ক্রমে)। গল গণ্ড (goitre)। গলার রক্তবহা নাড়ীর শিথিলতা। টন্সিলের বৃহত্ততা ও কঠিনতা (ব্যারাইটা কার্ফের পর) গলার অতিশয় শুক্তা; প্রাতে কাসিতে কাসিতে শ্লেমা উত্তোলন; গলায় জ্বালা, উষ্ণ পানীয় গ্রহণে উহার উপশ্য।

আমাশহা (পাকস্থানী)।—অপরিপাচিত ভুক দ্ব্য বমন।
এই লক্ষণে ফির-ফন্সই প্রধান ঔষধ। উহা দ্বাবা বিশেষ ফল না পাইলে
ক্যান্ত-ক্ষোর প্রয়োগ করিয়া দেখিবে। থক্ থক্ করিয়া কাসিয়া শ্লেমা
ভূলিয়া ফেলিবার পর হিকা। পেটফাপা। যক্তে কর্তনবং বেদনা।
নড়িলে চড়িলে উহার উপশ্ম।

তদের এবং মলা।—রক্তরাবী অর্ণ। কণুয়নকর বহিব লিযুক্ত
অরাবী অর্শ, বিশেষতঃ উহার সহিত বেদনা এবং কোষ্ঠ কাঠিল থাকিলে,
মলের বর্ণ এবং রক্তের লক্ষণের সহিত অপর কোন ঔ্বধের সাদৃশু থাকিলে
সেই ঔ্বধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। অর্শ সহকারে মন্তকে রক্তের প্রধাবন
(কির-ফসেরও প্রেয়েজন)। মলদারের পেশীর শক্তিহীনতা বশতঃ মল
নিঃসারণে অক্ষমতা, এজলা প্রভূত মলসঞ্চয় সংযুক্ত মলরোধ। প্রসবের প্র

প্রায়ই এইরূপ হইরা থাকে। <u>মলদারের বিদারণ।</u> দক্ষিণ কুক্ষিদেশে বেদনা। ঐ পার্শ্বে বৃদ্ধি। নিয়োদরে প্রভূত বায়ু সঞ্চয়। গেঁটেবাতের রোগীদিগের অতিসার। কুদ্রুমি জনিত মলদারকণ্ডুয়ন। অন্তর্শনি অথবা প্রাবহীন অর্শ ও তজ্জ্য কটিবেদনা ও কোষ্ঠকাঠিয়।

সূত্র।—প্রভৃত মৃত্র প্রাব, বিশেষতঃ মৃত্রযন্ত্রের পেশীর শিথিলতা লক্ষণ বিভাষান থাকিলে। পুনঃ পুনঃ মৃত্রবেগ। স্বর, আরক্ত ও উগ্র-গন্ধযুক্ত মৃত্র।

পুথ-জনে নিভ্রের।—অণ্ডের শোথ। অণ্ডের কাঠিন্ত। উপদংশে লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। অণ্ডের শীর্ণতা সহ অবিরাম শুক্র ও প্রষ্টেটিক রস করণ। হাইড্রোসিল (কুরগু); কঠিন উপদংশ। অণ্ডের ঝুলায় মানতা।

ক্রী-ক্রন্সন্তির ।—জরায়ুর সকল প্রকার অবস্থানের পরিবর্তনে (স্থান বিচ্যুতি, displacements) এই ওষধের প্রয়োজন (ক্যাল ফর্স ক্যালী-ফর্স)। জরায়ু নামিয়া পড়া। জরায়ুর সম্মুথাবর্ত্তন, (এণ্টিভার্সন) এবং উহার উর্দ্ধাংশের পশ্চাৎ দিকে ও নিম্নে অবনতি এবং নিমাংশের উপরের দিকে ও সম্মুথদিকে উন্নতি বিশিষ্ট অবস্থান বিচ্যুতি (রিট্রোভার্সন) কটীতে এবং কুচকি প্রদেশে আকর্ষণী বেদনা। উরুপর্যান্ত বেদনার সম্প্রসারণ। বেদনা সংযুক্ত প্রভৃত রজ্ঞাবা। শিথিল, নরম, অথবা, প্রস্তরের ক্যায় কঠিন জরায়ু। প্রভৃত রজ্ঞাবে এই ওষধ দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফলদর্শে। রোহিণীরোগ (অতিরক্তঃ) ও তৎসহ উদরস্থ সমস্ত পদার্থ ভগপথে নামিয়া পড়িবার আশক্ষা; জরায়ুর ফাইব্রয়েড টিউমার। উপদংশ। স্তনে ছোট ছোট কঠিন অর্ব্রুদ; যোনির শিরার স্ফ্রীভতা উপদংশ। উপদংশক্ষ কঠিন প্রাস্তবিশিষ্ট ক্ষত।

পার্ক ।—অপ্রচুর প্রশ্বান্তিক বেদনা। জরায়্র সঙ্কোচনাভাব বশতঃ রক্তন্তাব। স্থন-গ্রন্থির কাঠিন্ত এবং স্ফীততা (ক্যালী-মিউর)। গর্ভাবস্থায় নিয়মিতরূপে ইহা ব্যবহার করিলে অভি সহজে প্রশ্ব হইরা থাকে (বিশেষ পরীক্ষিত)।

প্রাস্থান ব্যক্তি নাল কিবার বিবর্জন বঁশতঃ শুক্ত, থক থক কান। কালিতে কালিতে ক্র দানা দানা, হুম্ছেল্ন পীতবর্ণ নির্চাবন পরিত্যক্ত হয় (সিলি)। খালকালে (হাঁপানি) কফ তুলিয়া ফেলিতে অতিশন্ন কট হুইলে এবং থণ্ড থণ্ড পীত বর্ণ শ্রেমানিন্তীবিত হুইলে ইহা বিশেষ উপকারী (ক্যালীফস)। রোগীর অতিশন্ন অবসন্নতা ও ক্লাস্তি। স্বর্ধন্তের শুক্তা ও স্বরভঙ্গ। উচ্চস্বরে অধ্যন্ত্রন বা বক্তৃতাদির পর স্বরভঙ্গ। কুপ রোগের প্রধান ঔষধ। শুক্ত থক্ কাশ, মনে হন্ন স্বর্ধন্তের ভিতর কোন বাহ্য বস্তর অবস্থান জন্ম এই কাল উদ্রিক্ত হুইতেছে। খাল রোধের ন্তান্ন অনুভব। শরিতাবস্থান্ন আলজিহ্বার উপদাহ বশতঃ শুক্ত খক্ থকে কাল।

ব্যক্ত সাধ্বনে হাল্ল-শিরা-ফীতি বা এরপ হইবার সন্তাবনা;
শিরা দেখিরা মনে হয় যেন উহা বিদীর্ণ হইবে (এই ঔষধের লোশন বা
বাহ্য প্রেরোগও ব্যবহার্য)। ধমনীর অর্কুদে, আইওডাইড অব্পটার
ব্যবহাত হইয়া না থাকিলে, এই ঔষধ ফিরম-ফলের সহিত পর্যায় ক্রমে
ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফল দর্শে।

হুৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন (ক্যালী-মিউর), হুৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈষ্মা। হুৎপিণ্ডের

গলা, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পৃষ্ঠের নিম্বেশে (কটিবেশে)বেদনা ও ক্লান্তি অমুভব। ত্রিকান্থিতে (মেক্দণ্ডের নিমে শুহার্বারের উপরে যে ত্রিকোণ অন্থি আছে, sacrum) জালাকর বেদনা সহকারে কোঠ বন্ধ। অন্থির উপর কঠিন জাব বা বৃদ্ধি (tumor);
কীততা। শব্ধির বাতজনিত ক্ষীততা। (ম্যাগ-ফ্স্)। পুরাতন কটিবাত। প্রথম সঞ্চলনে বৃদ্ধি, ক্রমাগত সঞ্চলনে হ্রাস। গল-গ্রন্থির প্রস্তরবং কঠিনতা। ঘ্যাগ।গলার হইপার্শ্বের ক্ষুদ্র গ্রান্থগুলির কঠিন ক্ষীততা। গ্রেনার্ড-ডিজিজ।

ভিক্তি প্র ক্রিক্স কর্মান্ত নির্দ্ধির বিষয় প্রতিষ্ঠার (encysted tumors); আঙ্গুলহাড়া (felon) অঙ্গুলি সন্ধির বাভজনিত ফীততা। একভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কাজ করার দক্ষণ কটিবাত। জামুসন্ধির প্রদাহ। পুরাতন শিবামুগু (সাইনোভাইটিস) সন্ধির কড়কড়ি (cracking); কণুইসন্ধির স্ফীততা; অস্থিতে পুজসঞ্জয়।

প্রের।—সপ্তাহ বা তদধিক কালব্যাপী পিপাস। সংযুক্ত জর।
শুক্ত পাংশুটে (brown) বর্ণের জিহ্বা।

নিদ্রো।—জাজ্জন্যমান দৃষ্ট স্বপ্ন (vivid dreams) ; নৃতন দৃশ্য ও নৃতন স্থান স্বপ্নে দর্শন।

ত্রাস্থ্র নগুলা — গারাদিন বিশেষতঃ প্রাতঃকালে অতিশয় কুর্মালতা অন্তত্তব।

ক্রাটনে উক্তহান সাবান ছারা উত্তযক্রপে ধ্যেত করিয়া এই ঔষধ কিঞ্চিৎ
ভ্যাসিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। গুহাছার বিদারণে
এবং দুষিত নালীক্ষতে ঘন পাঁতাভ পুষ নিঃস্ত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থের
(সিলি, ক্যাছ-সলক)। কার্ক্রল, আঙ্গুল হাড়া। পুনঃ পুনঃ
প্রত্যাবর্ত্তনশীল ইরিলিপেলাস। যে কোনও স্থানের কঠিন ফীততা বা

টিউমার। মংস্তের আঁইশের ভার কঠিন ও ওম আইশ বিশিষ্ট চর্মবোগ। হস্ত বা পদতলের বিদারণ, বা উহার কঠিনতা প্রাপ্তি। অর্শ সহকারে মলম্বারের একজিমা।

মস্তব্য।—অন্থি এবং অন্থিবেষ্টের পুযোৎপত্তিতে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। কত এবং আঙ্গুলহাড়ার, স্তনের এবং সর্বপ্রেকার গ্রন্থির স্ফাততায় তন্তুময় পদার্থ পুযে পরিণত না হইয়া স্ফাত কঠিনাকার ধারণ করিলে এই ঔষধ অবশুই প্রয়োগ করিবে (স্থসলার)। ছাদ্রোগ জনিত শোও। কৌষিক (সিষ্টিক) টিউমার। পেশী-তন্তু, বন্ধনী (লিগামেন্ট)ও কগুরার উপরিস্থ প্রস্তরবং কঠিন স্ফীততায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অন্তিপ্রিয়া নষ্ট হইলে ইহার ন্থায় ঔষধ আর নাই।

উষ্ণতার উপশম (বিশেষতঃ স্ফীততা কঠিনাকার ধারণ করিলে)। কোন স্থানের সঙ্কোচন আবশ্যক হইলে কথন কথন শীতল বাহ্য প্রয়োগও উপকারী।

ক্রেন্ডনা—এই ঔষধের ৩×৬×ও ১২×ক্রম বিশেষ উপকারী। অন্থিরোগে এই ঔষধের উচ্চক্রম (১২×) অতীব ফলপ্রদ। মলনার বিদারণে, অস্থিময় বিবর্দ্ধনে (bony growths), অর্শে, শিরার স্ফীততায় এবং আঙ্গুল হাড়ায় ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে। এই সবস্থলে ৬×বা ১২×চূর্ণ ২০ গ্রেণ ৪ আউন্স পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া লিণ্ট বা তূলা ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ করিবে। অর্থবা এক আউন্স ভেসিলিনে ১ ড্রাম চূর্ণ উত্তমন্ধপে মিশাইয়া দিনে ৪।৫ বার স্থানিক প্রয়োগ করিবে। কঠিন স্ফীততা বিশিষ্ট টিউমারে এবং শুহালার বিদারণ প্রভৃতিতে এইভাবে বাহ্য প্রয়োগ করিয়া আমরা চমৎকার ফল পাইয়াছি। প্রীহা ও যক্তের কঠিনাকার বিবৃদ্ধিতেও আভ্যম্বরিক ঔষধ ব্যবহারের সঙ্গের শঙ্কে ইহার বাহ্য প্রয়োগ জতীব উপকারী।

স্ফ্রস্ক :—মনের ও স্বর্যন্তের রোগে ক্যাল্কেরিয়া-কার্কের সহিত, নিদ্রা লক্ষণে ফ্লোরিক এসিডের সহিত, গ্রন্থি ও পেশীতস্তর প্রস্তরবৎ काठिन नक्ष्य कांद्र बाहेरबाड, कानी-बाहेरबाड, मान मिडेब ड কোনায়মের সহিত ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফসফরাস, মার্ক, রুটা, অরম ও সিলিশিয়া প্রভৃতি ঔষধের অনেকানেক লক্ষণের সহিত এই ঔষধের লক্ষণের সাদৃশ্র আছে। কটি বাতে রসটক্স বিফল হইলে অনেক সময় এই ঔষধ প্রয়োগে ফলপাওয়া যায়। পুষত্রাবে সিলিশিয়া বিফলান্তে, সন্ধির বাতে ও ফীততায় ত্রাই ও ক্যাল্কের পর; সাইনোভাইটিশ অর্থাৎ শিবামুণ্ড রোগে ষ্টিক্টা ও ফিরম-ফসের পর ; বেদনাপরিশুত্ত ক্ষতে নেট্রাম-মিউরের পর, সাধারণতঃ ইছা ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। শিশুদিগের মস্তকাস্থির স্ফাততায় সিলিশিয়ার সহিত ; অস্থির পুষোৎ পব্তিতে ক্যাল্ক-ফদ, এসাফিটিডা ও সিলির সহিত; ঘোড়ায় পায়ের ক্ষুরের সমীপবর্ত্তী সন্ধির প্রেদাহ ও স্ফীততায় এসিড-ফস ও সিলির সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। রক্তহীনতায় ক্যান্ধ-ক্ষের পর ইহা দারা স্থ্যক পাওয়া যায়। Arterio Sclerosis অর্থাৎ ধমনীর স্থুলত্বে ব্যারাইটা ক্যান্ধ আয়োড, প্রথম ও ব্যারাইটা মিউরের সহিত ইহার তুলনা হইয়া थादक।

তুল শাস্তা স্থাবন—(>) কঠিন ক্টাভতায়-ক্যান্ধ ফ্লোর, ব্যারাইটা আমোড, ক্যান্ধ-আয়োড, হেক্লা লাভা, এপ্টিরিয়াস, কোনায়ম, ফাইটো লাকা, কার্মো এনিমেলিস, মার্ক-প্রোটো আয়োড, সিলি। (২) নাণিকার হুর্গন্ধি আবে—ক্যাড্মিয়াম, ক্যান্ধ-ফন, এসিড-নাইট, কালী বাইক্রম, অরম, হিপার, এণ্টিম-সলফ, অর, অরম-মিউর-নেট্রোনেটাম আস-আয়োড, নেট্রাম কার্মে, সিফিলিনাম।

ক্যালকেরিকা ফসফরিকা:

Calcarea Phosphorica

ক্যালসিয়াম ফদফেট বা ফদ্ফেট অব লাইম।

চুণের জলের মধ্যে ডাইলিউট ফশফরিক এসিড মিশ্রিত করিলে এক প্রকার সাগা তলানি পড়ে। চুয়ান জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ও পরে শুদ্ধ করিয়া ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেরিং সর্বপ্রথম এই প্রক্রিয়ায় ফদ্ফেট অব লাইশ প্রস্তুত করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করেন।

এই পদার্থ জল বা এলকোহলে অদ্রবনীয়। ডাইলিউট নাইট্রিক এসিড ও অস্থান্ত এসিডে দ্রবীভূত হয়। হোমিওপ্যাথিক ফাম্মাকোপিয়ার বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে মর্দ্ধন (খল) করিয়া ইহা উম্পার্থে ব্যবস্থত হয়।

মানবদেহ নির্মাণ ও সংরক্ষণের পক্ষে ইহা একটা অত্যাবশুকীয় পদার্থ রক্ত, লালা, আমাশরিক রস (gastric juice) অন্থি, সংযোজক তস্ত্র (connective tissue), দস্ত ও হন্ধ প্রভৃতির বিধানোপাদানে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পদার্থের জন্মই অস্থির দৃঢ়তা জন্ম। দেহত্ব অগুলালের সহিত এই পদার্থের বিশেব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

ক্যান্থেরিয়া ফ্লোরের স্থার অগুলালের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই পদার্থ দেহে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। অগুলালের সহিত এই পদার্থের সংমিশ্রণে অস্থি ও দস্ত নির্মিত হইয়া থাকে। অস্থিতে শতকরা ৫৭ ভাগ ফলফেট অব্ লাইম আছে। এই পদার্থ ব্যতীত অস্থি ও দস্ত নির্মিতই হইতে পারে না। শরীরে যথন এই পদার্থের স্মন্তা ঘটে, তথন কার্য্যকারীর অভাবে দেহস্থ অগুলাল (এমুমেন) নানা দার দিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। এমুমেন বৃক্ষক পথে (কিড্নি) নিজ্ঞান্ত ইইলে—স্বাহির ডিজ্জি, কুসফুল-পথে নিজ্ঞান্ত হইলে—কাসি, এবং নাসা-পথে

ৰাহির হইলে—প্রতিশ্যায় বা সর্দ্ধি নাম ধারণ করে। ত্বক-পথে এবু মেন বাহির হইলে—নানাপ্রকার চর্মরোগ উৎপর হইয়া থাকে। লক্ষণভেদে উহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়া থাকে। শরীরের কোন প্রস্থিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইলে তাহাকে গণ্ডমালা বা ক্ষুফিউলা (Scrofula) বলে। পাকস্থলী হইতে নিঃস্তুত রুসে (gastric juice) কস্ফেট অব লাইমের স্বপ্নতা ঘটিলে অপাক (indigestion) জন্মিয়া থাকে।

আময়িক প্রয়োগ

ভগ্নান্থির সংযোগ স্থলে অস্থির অসম্যক বা অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন বশতঃ খরস্পর্শতায় (in unnatural and callous growths at the ends of fractured bones) ইহা অতীব ফলপ্রদ। অন্থির কোমলতা, বক্রতা ও সর্বপ্রকার বিক্লভির ইহা এক মাত্র অব্যর্থ মহৌষধ ' রিকেটস্। শিশুদের দস্তোদামকালীন সর্বপ্রকার উপদ্রবে যথা—অতিসার, জ্বর, কনভঃলসন প্রভৃতিতে, বিশেষতঃ ফ্রুফিউগাগ্রস্থ শিশুদিগের পক্ষে ইহা মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। সর্বপ্রকার ক্ষয়কর রোগে, বিশেষভঃ তৎসহ ঘুষঘুষে জর থাকিলে ইহা অন্তর্মজী ঔষধরূপে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে পরিপাকের সহায়তা করিয়া শরীরের ক্ষর ও শীর্ণতা বিদ্রিত ও রক্তের লোহিত্কণা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এজন্ত, কি শিশু, কি বয়স্ক, কি বৃদ্ধ যাহাদেরই রোগে শারীরিক শীর্ণতা ও চুর্বলতা ভুক্তদ্রব্য সমীকরণের অসম্ভাব বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে (arising from non-assimilation of food) বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তাহাদের রোগেই ইহা দিধা না করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সব স্থলে ইছা টিনিকের" ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। মুত্রের সহিত অধিক পরিমাণ ফসফেট নির্গত হইলে এবং যে সকল যুবক ক্রত বদ্ধিত হয় ও যাহাদের রক্তহীনতা আছে এবং যে সকল স্ত্রীলোক বছ সন্তান প্রদাব করিয়া তুর্বলীভূত হইয়া পড়িয়াছেন অথবা সন্তানকৈ অধিক দিন হুন্য দান জন্য বাঁহাদের স্বাশ্ব্যভঙ্গ হুইয়া পড়িয়াছে, অতিরিক্ত রজ্জার বা প্রদর্ভ্রাব জন্য বাহাদের বলক্ষয় ও শরীরের শীর্ণতা জন্মিয়াছে ত'হাদের পক্ষে ইহা সঞ্জীবনী স্থার ন্যায় ফলপ্রদ। ব্রহাইটিস ও পুরাতন খাস-কাস প্রভৃতি রোগে অতিরিক্ত শ্লেমা নিষ্ঠাবন হেতু হুর্বলতা যক্ষা জনিত উদরাময় ও নৈশ-ঘর্মা এবং ক্ষোটকাদি হুইতে অতিরিক্ত পুয প্রাব, ইহা ব্যবহারে হ্রান প্রাপ্ত হুইয়া থাকে।

বার্দ্ধকাহেতু সাধুমণ্ডলের ক্ষয় নিবারণের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ (কালীফস ও এতং সহকারে ব্যবহার্য:। দীর্ঘকাল রোগভোগের পরবতী শারীরিক ছর্ব্দলতা বিদ্রিত করিতে, স্বপ্রদোষ ও হস্তুমৈথুনের কুফল নিবারণ করিতে এবং স্ত্রীলোকদিগের ছর্দ্দমনীয় কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করিতে ইহার অন্তত ক্ষমতা। যুবতীদিগের কোরিয়া এবং ক্লেরোসিস রোগেও ইহা চমৎকার ফলপ্রদ। ক্ষয়কাল ও তৎসহ শরীরের শীর্ণতা, নৈশ্বর্ম ও রক্তকাল প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ নিয়ক্রমে (৬×) ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বিবাহিত যুবকদিগের স্বপ্রদোষে এবং হস্তুমৈথুনকারীদিগের প্রক্ষেও ইহা অতীব ফলপ্রদ। মন্তকান্থির সংযোগন্থলে ও উপান্থি দারা অন্থির সংযোগন্থলে বেদনা, তৎসহ শীত শীত অমুভব, আর্দ্রতার বৃদ্ধি, ম্বর্ম প্রাবের প্রবণতা এবং গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

অন্থির সংযোগস্থলে বেদনা, বেদনাক্রান্ত স্থানের অবশতা ও সিড্সিড়ানি এবং তৎসহ শীত শীত অমুভব, সহজেই ঘর্মপ্রাব ও গ্রন্থির ফীততার প্রবণতা, আর্দ্রতায় রোগ লক্ষণের রৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা, শরীরের শীতলতা (কিছুতেই শন্তীর উষ্ণ হয় না), এ গুলিও এই ঔষধের বিশেষ পরিচালক লক্ষণ। ত্বকে এই পদার্থের অভাব ঘটলে ক্ষুদ্র ক্রলপূর্ণ উদ্ভেদ বা গুটিকা প্রকাশ পাশ্ন; ক্যাত্মফদ সক্ষম মাত্রায় ব্যবহার করিলে এগুলি বিদুরিত হইরা থাকে।

রক্তহীনতা হইতে বেদনা ও আক্ষেপ (Spasm) উৎপন্ন হইলেও ইহা অতিশয় ফলপ্রদ।

কথন কথন দেহে এই পদার্থের (ক্যান্ক-ফন) স্বল্পতা নিবন্ধন আমবাত (Rheumatism) জনা। সোডিয়ম ফসফেট (Natrum Phos) নামক লাবণিক পদার্থের অভাবই এই রোগের মৃথ্য কারণ। উপযুক্ত পরিমাণে স্থাটফদ রক্তে বর্দ্ধমান থাকিলে বাতরোগ জনিতেই পারে না। যথন রক্তে ফসফেট অব লাইমের (Calcarea phos) অভাব হর, তথন প্রাক্তিক নিয়মে সোডিয়ন ফসফেট হইতে অংশ বিশেষ আদিয়া সল্প্লাম ফলফেট অব লাইমের সহিত সংমিলিত হয় এবং এই প্রকারেই অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে। সোডিয়ম ফসফেট হইতে অংশ বিশেষ চ্যুত হইয়া ফসফেট অব লাইমের সহিত মিলিত হওয়ার সোডিয়ম ফসফেটের পরিমাণ কম হইয়া পড়ে। এজন্ত বাতবোগে ক্যান্ক-ফস অবশ্র প্রত্তা পরিমাণ কম হইয়া পড়ে। এজন্ত বাতবোগে ক্যান্ক-ফস অবশ্র প্রত্তা বিদ্যানিয়া-ফস নামক লাবণিক পদার্থের সহিত্ ও ফসফেট অব লাইমের ক্রিয়ার অনেকটা দৌসাদৃশ্র আছে। এজন্ত ম্যাগফস প্ররোগোপযোগী রোগে উহা ছারা বিশেষ কোন উপকার না দর্শিলে অনেক সময় ফসফেট অব লাইম ছারা উত্তম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

নান-শিশুর অত্যন্ত ক্রোব ও থিটথিটে স্বভাব। মানসিক চাঞ্চল্য;
স্থৃতি ক্ষীণতা; চিস্তাসংগ্রহে অসমর্থতা। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মন ধাবিত
হয়। হস্ত-মৈথনকারী অথবা যাহারা পূর্বে হস্তমৈশ্বন করিত, তাহ'দের

ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি (ক্যালী ফস); নিরুৎসাহিতা ও বিষণ্ণতা; একাকী থাকিতে ইচ্ছা এবং শোক, ক্রোধ ও প্রেমভঙ্গ জনিত নিরাশার পর এই ঔষধ জাল থাটে। শিশুর ক্ষণরাগিতা ও ছর্মালচিত্ত; সহজে কোন বিষয় ব্ঝিতে অসমর্থ; হাবার স্থায় ব্যবহার।

মস্তব্য —শির:পীড়া সহকারে মস্তকে শীতলনানুভব। মস্তকে উত্তাপের স্বল্পতা, স্পর্শেও মন্তক ঠাণ্ডা অমুভূত হয়। মন্তকের উপর বরফ পাকায় ন্যায় শীতলতা অনুভব ; মস্তকশিথরে এবং কর্ণের পশ্চাতে বেদনা; মন্তকে ক্ষিয়া ধরার ন্যায় আট আট অনুভব। প্রাপ্ত বৌবন। দিগের (যথন প্রথম ঋতু প্রকাশ পায়) শিরংপীড়া সহকারে অন্থিরতা ও স্নায়বীয়তা, মানদিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি ও মস্তকের অস্থিসমূহের সংযোগস্থলে (suture) শির:পীড়ার প্রাবল্য, পাতলা ও কোমল করোটা (মাথার খুলি) বিলম্বে ত্রহ্মরক্ষের সংযোজন বা উহার পুনরায় শীতলতা সহকারে মন্তকে তুড়ভুড়ি বা সিড়্ সিড়্ অমুভব। মন্তক-শিখরে ক্ষত, শিরোঘূর্ণন (ফিরফস) মস্তিক্ষের শোথ (হাইড্রোকেফেলঃস), কেশপতন টাকপড়া। মাথা সোজা করিয়া রাখিতে অসমর্থতা। মস্তকের বৃহত্তা। অনেক দিন পর্যান্ত শিশুর মন্তকান্থির অসংযোজন (কাঁকথাকা) এবং মন্তকান্থির কোমলতা, হাতদিলে তুলভূলে বোধ হয়। সন্ধ্যাকালে মন্তক কণ্ডুরন। মন্তকে টাক পড়া। পেটফাঁপা সহ মাথাধরা। মানসিক শ্রমে ও শীতলভাম বৃদ্ধি। মন্তক শিখরে বরফের জল প্তনের স্থায় সিড্ বিড়ু অনুভব। ঋতুপরিবর্তনকালে মন্তিষ্ক লক্ষণের উপচয় (বৃদ্ধি) সদ্ধা-काल मछक्ष्व क्ख्यन, वृक्षिरिशत निर्तापूर्वन, नितः भीषा, हाँ ि पिल উহার কিঞ্চিৎ উপশম। বিতীর বার দাত উঠিবার কালে শিরংপীড়া। মন্তকের অভির সংযোগ স্থলে বেদনা, মন্তকে কুদ্র কুদ্র স্থানে বেদনা।

চকুর পাতার আক্ষেপ (ম্যাগফস)। তির্যাকদৃষ্টি। চকুর পাতার উষ্ণতাম্ভব। রেটনার পক্ষাথাত বশতঃ দৃষ্টিশক্তির ক্ষাণতা বা বিলুপ্ততা (ক্যালী-ফস)। চকুর স্নায়ুশ্লে ম্যাগ-ফসে উপকার না ছইলে ইহা ব্যবহার্যা। চকুর প্রদাহ অথবা অপরিচ্ছের দৃষ্টি, বিশেষতঃ ক্রফিউলাগ্রন্ত রোগীর; আলোকাসহাতা। কর্ণিরার ক্ষত। গ্যাসের আলো চক্ষে সহ্য হয় না। প্রদাহের পর চকুর অস্বচ্ছতা। এমোরোসিস বা দর্শন স্নায়ুর পক্ষাঘাতজ্বক্ত অন্ধতা; চকুরছানি। রেকাইটিস বা ক্রফিউলা ধাতুর শিশুদের কৌলিক এমিও পিয়া বা দৃষ্টির অপরি চ্ছন্নতা।

কর্পনি প্রীবাগ্রন্থির ক্ষীততা সহকারে মুখমগুলে অবিরাম মৃছ বেদনা। কর্পবেদনা সহকারে ক্যাল্-ফ্সের প্রস্কৃতিসিদ্ধ অগুলালের স্থায় ক্ষতকর পৃষ প্রাব। ক্রফিউলাগ্রন্থ রোগ্রার কর্ণমূল গ্রন্থির অতিশর ক্ষীততা লক্ষণে ইহা সমধিক উপ্যোগী। কর্ণের ক্ষীততা; জালা ও কণ্ডুরন। কর্ণে অবক্ষতামূল্য। যদি শরীরের শীর্ণতাসংযুক্ত কোন প্রকাব ক্ষয়কর রোগের স্থিত বোগীব কর্ণ হইতে পাতলা ও তুর্গন্ধি প্রাব নি:স্ত হইতে পাকে, তবে ইহার কার উৎকৃষ্ট ও ফলপ্রদ ঔষধ জার নাই। যক্ষাগ্রন্থদিগের পক্ষেক্যান্ধ-হাইপো-ফ্স অধিকতর উপযোগী। প্রতিশক্তির বিলোপ সহ কর্ণেনানা প্রকার শক্ষ প্রত হয়। কর্ণের চতুদ্দিকের অন্থিতে বেদনা। কর্ণিরোগ্র সহিত গলার রোগ সংশ্লিষ্ট। কর্ণে অবিরাম বেদনা।

নাসিকা—বৃহৎ সবৃদ্ধ নাসার্ব্য । নাসাভ্যন্তরের প্রদাহ ও অতিশর ফীততা (সিলি)। নাসাত্রের বরফের ক্সায় শীতপতা। মন্তকের প্রতিশ্যায় সহকারে অওলালের স্থায় প্রাব নিঃসরণ। পশ্চাৎ নাসাবিবর হইতে (posterior nares) গাঢ় ছন্ছেন্য আগুলালিক প্রাব নিঃসরণ, এজন্য পুনঃ পুনঃ কাসিয়া উহা তুলিয়া ফেলিবার আবশুকতা। বিষুক্ত বায়তে বৃদ্ধি। ক্ষীণরক্ত ব্যক্তিদিগের সহজে সন্দিলাগে (ফির ফস)। পুতিনশু (ক্যান্সগ্রের সহ); অপরাহে নাসিকা হইতে রক্তপ্রাব। নাসিকা হইতে হুর্গন্ধ নিঃসরণ।

সুখা শুলা—মুখমগুলের পাজুবর্ণ সহ শীতলঘর্ষ। মূঘর্ণ মুখমগুলের বাত, রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি। ত্রণ বা ফুর্ছাড়। তুড় ডুড়ি অমুভব সহকারে বেদনা। শীতলতা; অবশতামুভব। চট চটে ও শীতল ঘক। বুক (Lupus নাসিকা ও মুখমগুলের প্রসারণশীল রক্তবর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট একপ্রকার রোগ)। মুখমগুলের উত্তপ্রতা। যুবক ও প্রাপ্ত যৌবনাদিগের বয়োত্রণ: ফুর্রর; মুখমগুলের ছিল্লকর ও নিম্পেষণবং বেদনা (ম্যাগ-ফ্স)। ক্ষ্টকর দজোদামকালীন শিশুর মুখমগুলের পাগুরতা। কর্ণমূল গ্রন্থির স্থীততা। মুখমগুলের বসারতের স্থায় (greasy) আকৃতি। উদ্ভূহু অস্থির (upper-jaw) বেদনা; রাত্রিকালে উহার বৃদ্ধি।

সুখ্য স্থা ।—প্রাতে মুখে বিরক্তিকর স্বাদ (স্থাট-ফস)।
তিক্রাম্বাদ সহ শিরঃপীড়া, উপরের ওর্চের স্ফীততা ও বেদনা। টিন্সিলের
বেদনা জন্ম হাঁ করিতে অনিচ্ছা বা অসামর্থ্য।

দেশত উঠিতে বিলম্ব (ক্যান্তফোর)। ক্যান্ত-ফল দাঁতের
একটা প্রধান উপাদান। ইহার অভাব বা স্বল্পতা ঘটিলেই দাঁত উঠিতে
অভিশয় কন্ত ও বিলম্ব হয়। এরপাবস্থার সময় সময় আক্ষেপ এবং অক্সান্ত
উপসর্গও জন্মিতে পারে। এজন্ত বালকদিগের দন্তোদাম কালীন পীড়ায়
ইহা প্রধান ঔষধ (ম্যাগ ফল); দাঁতের উঠিবা মাত্রই ক্ষম প্রাপ্তি। রক্ত
করণের ন্তায় বেদনা ও রাত্রিতে উহার রুদ্ধি (নিলি) মাড়ীর ফীততাযুক্ত
বেদনা। দাতের সকল প্রকার রোগেই ইহা প্রধান ঔষধ। মাড়ির ফীততা,

শাড়ির পাণ্ডুরভা থাকিলে ইছা বিশেষরূপে উপযোগী (স্থলার)। দণ্ডোড়েদ কালীন আক্ষেপে ম্যাগ ফস সহ ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফলদর্শে।

জিহবার অগ্রভাগে কোন্ধা ও কুফু ড়ি এবং বিদারণ। প্রাতে তিক্তাসাদ সহ শিরঃপীড়া।

পাল-ক্রা ।—গণার বাহাগ্রন্থির ক্ষীততা ও বেদনা। গণগণ্ডের ইহা প্রধান ঔষধ (লাট মিউর)। আগজিহ্বার পুরাতন বিবৃদ্ধি। ডা: চ্যাপম্যান বলেন শ্বাস রোধের আশক্ষার প্রারন্ভাবস্থার ব্যবহার করিয়া তিনি ইহালারা উত্তম ফল পাইয়াছেন। গ্রন্থির বেদনা, এজন্ত চোক গিলিতে কন্ট । মুথ ও জিহ্বার শুক্তা সহকারে পিপাসা। চোক গিলিতে গলায় র্থোচামারার মত ও ক্ষতবং বেদনা, স্থারী স্বরভঙ্ক। কথা বলিবার সমর অনবরত গলা থেকারি ও গলা পরিষ্কার করিবার আবশুক্তা; গলায় টাচিয়া যাওয়ার স্থায় বেদনা। ধর্ম্যাজক ও বক্তাধিগেব স্বরভঙ্কের ইহা একটী প্রধান ঔষধ (ফ্রিরুক্সের সহিত পর্যায়ক্রমে)। পুরাতন প্রতিশ্রায়ে ও গল-নলীতে জালাকর ও ক্ষতবং বেদনা। টনসিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি, গল-ক্ষত। গলায় থ্যস্পর্শতা, এজন্ত চোক গিলিতে অস্ত্রবিধা; গলায় জালা। প্রথম কোন কিছু গিলিবার সময় বা শুন্ত নিগীয়ণে গলায় জালা। প্রথম কোন কিছু গিলিবার সময় বা শুন্ত নিগীয়ণে গলায় জালা। ও শুক্ষভামুভব। গলা ও নাসিকা হইতে ছন্তেন্ত আঠা জাঠা শ্রেমা নিংসরণ।

(গিলিবার সময় নিমাভিমুখে জালার প্রসারণ লক্ষণে ক্যান্থ; শৃষ্ণ ঢোক গিলিবার সময় বেদনায়, সিমিসি)। গলক্ষত সহ সন্ধ্যাকালে গলায় তৃড়-ভুড়ি ও কাস; শ্যায় শ্য়ন করিলে এই কাসের বৃদ্ধি। অধিক ক্রন্দন অথবা দৌড়াইবার পর গলার অভ্যন্তরে থেরপে সংলাচন মার্ক্ত হয় গলার ভিতরে তজ্ঞপ সংক্ষাচন অমুভব। প্রাতে নিজা হইতে জাগরণ মাত্র গলায় ক্ষতবং বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে উহার বৃদ্ধি। প্রাতরাহারের পর উহার তিরোধান। সদি লাগিলেই রোগীর গলার অভ্যন্তরে শুদ্ধতা ও ক্ষতবং বেদনা অমুভব। গলায় এবং বক্ষঃস্থলে স্টিবিদ্ধবং বেদনা। টক্সিলের পাঞ্চুরতা, শিথিলভা ও ক্ষীভভা তৎসহ মধ্যকর্ণের প্রদাহ। থাল্য অথবা উষ্ণ পানীয় গলাধঃকরণ স্থাপেক্ষা লালা গিলিভে অধিক কষ্ট্র (মার্কসল।।

ত্রাত্রাশ্রা—আহারের পর আমাশরে জালা ও বেদনা। ভক্তদ্রব্য আমাশয়ে (ষ্টমাক) পৌছিবার পর পিওবং রহিয়াছে এ প্রকার অমুভব। আমাশয়ে গুরুত্ব ও জালা। যৎসামান্ত আহারেই বেদনার বৃদ্ধি (ফিরফস)। ম্পূর্ণে আমাশ্রে ক্ষতবং পানাহারে বেদনার বৃদ্ধি, উষ্ণতায় উপশ্ম (ম্যাগ্-ফ্স)। অস্থানবিক ক্ষুধা, কিন্তু থাইলে অসুথ করে। আমাশয় প্রদেশে নিমগ্রতা অন্তত্তব। অগ্নিমান্দ্য, কিছু খাইলে বা ঢেকুর উঠিলে বেদনার সাময়িক উপশ্ম। শিশুদিকের দ্বির জার অন্নর্মন (লাট ফ্স) ও जर्ममा राज्यभारतत् हेळा। जामाभारत् वाशु मक्षत्र। এই छेयथ जुळक्या পরিপাকে বিশেষ সাহায্য করে। এজনা টাইফয়েড ফিভারের পরে পরিপাক শক্তির তুর্বলতা জন্মিলে ব্যবজত হয়। শীতল পানায়ের পর বমন। পবিপাকে বিশুজ্ঞা সহকারে শিরংপীড়া। বাতোলার। পাকস্থলীর উপদ্রব সংযুক্ত অগ্নিমান্য। আহারান্তে ক্যাল্ল-ফ্রন্স ১×এক গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে পেটে বায়ু জনিতে পারে না। অগ্নিমান্দ্য (আহারান্তে বাতোলাারে সাময়িক কিছু উপশম বোধ করিলে) এই উষ্ধ প্রযুজ্য। লোনা ও ধুমশুক্ষ মাংস ভক্ষণের স্পৃহা। শিশুর

শরীরের শীর্ণতা; মেনেন্ট্রিক গ্রন্থির বির্দ্ধি। প্রতিবার আহারের চেষ্টায়ই উদর বেদনা উপস্থিত হয়। উপবাস করিলে মেরুদথে বেদনা।

উদর এবং মল—শিশুদিগের দন্তোদ্রেদকালীন অতিসার; উদর বেদনা সহকারে শেওলা শেওলা অপরিপাচিত সবুজ বর্ণ মল্মাব (ন্যাট-ফ্স)। শিশু-বিস্চিকা। যে সকল দ্রব্য গাওয়া উচিত নয়, শিশু ভাহাই খাইতে চায়। উন্প্র, ওর্গন্ধ ও সশকে নির্গত হয় এরপ মল (ক্যালীফল), এই মল স্ক্র কণার আকারে চ্বিদিকে ছিটকাইয়া পতে (sputtering)। গ্রীম্মকালীন অতিদার, কাঁচা ফল ভক্ষণের পর অতিশার; উদরের নিমগ্রতা। মুখমগুলের পাগুরতা ও শিশুর থিটথিটে স্বভাব। নাভিন্ন নিকটে বেদনা। হুগ্নপানকালে শিশুর ক্রন্দন। শীর্ণতা। শিশু উদর পরিতোধ করিয়াখায়, বিশ্ব উত্তরোত্তর আর ও শীর্ণ ছইরা পড়ে। পুনঃ পুনঃ নিক্ষণ মলবেগ কিন্তু মণ্ড্যাপ করিতে গেলে কিছুই বাহির হয় না। (ক্যালীফস, ম্যাগ ফ্স)। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের শিরপীড়া সহকারে অভিসার। বৃদ্ধ এবং শিশুদিগের কোষ্টকাঠিও শং কঠিন মল। কণ্ডুয়নকর বাহ্যবলি শংযুক্ত অর্শ (ক্যাক-ফ্রোর, ফির-ফস)। অর্শ হইতে অওলালের স্থায় আব নিংসরণ , বিশেষতঃ বক্তহীন ব্যক্তিদিগের)। শুহারার বিদারণ (ক্যাল্ক ফুোর)। মলদারে বেদনাবিহীন নালী ঘা, ছুর্গন্ধি মল (ক্যালীফন); সরলাত্তে শুলবেদনা ও মলত্যাগাত্তে বেদনা। রাত্রিতে ও ঋতুপরিবন্তনকালে লক্ষণের বৃদ্ধি (সিলি)। পিত्रभोनात (ष्ट्रीन) উৎপত্তি निवातर्ग हेश दिर्गिय উপযোগी। ভগন্দর ও খাসমন্ত্রের রোপের পর্য্যায়ক্রমে উপন্থিতি। যে সকল

লোকের প্রতি ঋতুপরিবর্ত্তন কালে প্রতি সন্ধিন্থানে বেদনা জন্মে
তাহাদের ইহা পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কোঠ কাঠিত, রক্ত সংযুক্ত কঠিন
মল, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের। রক্ত হান ব্যক্তিগণের হাণিয়া। মলের
সহিত তুর্গন্ধি পুষ নিঃসরণ। মলত্যাগের পর কট্যন্থির নিয়াংশে
প্রবল্ধ বেদনা উপস্থিত হয় ও রাত্রে শ্যায় না যাওয়া পর্য্যস্ত
বিভ্যমান থাকে। ক্ষর রোগ সংশ্লিষ্ট অতিসার। মধ্যান্ত-গ্রন্থির
শুটিকা রোগ বশতঃ শরীর ক্ষর (টেবিস মেসেন্টেরিকা)।

মুত্র—প্রগাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট মূত্র। অবিরত মুত্রপ্রবৃত্তি, তৎসহ
মুত্রাশরের গ্রীবাদেশে ও মুত্রনালীদিয়া তীত্র কর্তনবং বা তীর্রবিদ্ধবং
বেদনা (ফির-ফন)। মূত্র বৃদ্ধি। মূত্রে মণ্ডলাল থাকিলে এই ঔষধ
অতিশর উপকারী (কালী-ফন) এবুমেনের সহিত ক্যাক্ষদেরে
রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে, এজন্ম ব্রাইটন ডিজিজে ইহা অভিশর
উপকারী (কালীফন)। মূত্রে ফফেটিক অন্তঃক্ষেপ থাকিলে অন্তর্কারী
ঔষধ স্বন্ধ ব্যবস্থান শ্যাম মুত্রত্যাগ। স্বাস্থান ছক্লেজা।
চর্ক্রিলতাসহ বৃদ্ধ ও শিশুদের অবারিত মূত্র প্রাব্)। কুরগু। মূত্র শীলা বা
পাথরী রোগে ইহা ব্যবহারে মৃত্র শিলার পুনক্রংপত্তি নিবারিত হয়।

পূৎ জেননৈ ক্রিন্তা – অণ্ডের স্টাওতা। হন্তমৈধনের কুফল।
আরব্দি (ক্যান্ধ-ফোর)। অণ্ডের অভিশয় কণ্ডুয়ন, লোলিভভা
ঘণ্টাক্ততা ও স্পর্শাদেষ।পরাতন প্রমেহ এবং মীট। অভ্রের শোধ।
মূত্রনালী হইতে যে কোন প্রকারের আওলালিক জাবেই (ডিম্বের খেতাংশের তায়) ইহা স্প্রযোজ্য। বিবিদ্ধিত মৈথুনপ্রবৃত্তি। যম্রপাক্ষ লিলোচ্ছাল। প্রমেহ জনিত আমবাত্ত। প্রমেহ জনিত বাতের প্রতি
আর্তি-ঝতু পরিবর্তনে বৃদ্ধি (মেডো)। সূর্ধ। অণ্ডের শ্বীত্তা।

खाकान्य नाट्यन्य- - जतायुत्र निर्माण्यिए निर्मयन वर्षेत অপর কোনও প্রকার স্থানবিচ্যুতি বশতঃ জরায়ু-প্রদেশে হর্ক্সলভাত্ব-ভব (ক্যান্ক-ক্লোর, ক্যালী ফস)। জরায়ুতে অবিরাম মৃছ বেদনা (একিং পেইন)। স্ত্রীঅঙ্গে দপ্দপানি এবং তৎসহ বিবর্দ্ধিত সঙ্গমেচছা, বিশেষতঃ ঋতুর পুর্বে। সকল প্রকার খেত-প্রদরেই, ধাতু দোষ সংশোধনের নিমিত্ত ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। খেত প্রাদরে এখু মেনের স্থায় অথবা সরের ন্যায় আব নিঃসরণ। নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা। বিদাধী আব, ঋতু অথবা কামোত্তেজনার পর বৃদ্ধি। রক্তহীন যুবতীদিগের নিয়মিত সময়ের বহু পুর্বের বা বহু পরে ঋতু আব। হুই সপ্তাহ পর পর উজ্জ্বল লোহিত ঋতু আব। ঋতুকালে.কটিবেদনা। ঋতুকালে প্রস্ব বেদনার ভাষ বেদনা (ম্যাগফস) (এতরিবারণে ফির ফস)। ঋতুকালে মুথমগুলের আরক্ততা এবং হও পদের শীতণতা (ফির-ফন) শুক্তদানকালে ধাতুস্রাব ; ঋতুস্রাবের পূর্বেও পরে প্রেলববেদনার ন্যায় বেদনা; সময় সময় মল ও মুত্রভ্যাগের পরও এইরপ বেদনা উপস্থিত হয়। যোনিতে জালা। স্তনের কঠিনতা। বোনিত দপ দপ অমুভব, প্রবল চুলকানি ও তজ্জন্য ক্রতিম মৈথুনের প্রবৃত্তি রঞ্লোপ। জরায়ুর বেদনা সহ প্রবল কটি বেদনা।

গৈতি।—গর্ভাবস্থার হস্তপদে অবিরাম মৃত্ বেদনা; তন্যত্থের বৈশুণা। গর্ভাবস্থার ও প্রস্বাস্তে শরীরের অতিশয় শীর্ণতা। জলের ন্যায়, নীলাভ অথবা শ্বণাক্ত স্বর চগ্যস্রাব (ন্যাটমিউর), তাই শিশু মাই টানিতে চায়না। শিশু পুনঃ পুনঃ ছির ন্যায় জমাট অয় ছফ্ বমন করে। তন-ক্ষত (ফির-ফস)। প্রস্বাস্তিক এবং দীর্ঘকাল তান্য দানের পরবর্তী হর্ষলভা দূর করিষা জীবনীশক্তি প্রতিষ্ঠার্থ ইহা ব্যবস্থাত হইয়া থাকে (ক্যালী ফস)। তানে জালাকর ও ক্ষতব্ব বেদনা। শীর্ণা ও হর্ষল রমণীদিগের জরায় নির্গমন। দীর্ঘকাল

স্তন্যদানের পরবর্ত্তী স্বরের ক্ষীণতা, কাসি, চর্বলতা ও স্বন্ধান্থিররের মধ্যভাগে বেদনা , গর্ভাবস্থায় স্বাঙ্গীন চুর্বলতা।

শ্বাস-অন্ত ।-কাদ দহকারে এলুমেনের স্থায় শ্লেমা নিষ্ঠীবন। খরভঙ্গ সহ দিবারাত্র শুক্কাস। পুরাতন কাস। যক্ষার প্রারন্তাবস্থায়। কাসরোগের হর্কালভার এবং শীর্ণভার অন্তর্কতী ঔবধরূপে ব্যবহৃত হয়। ছপিংকাস। ফুসফুসে আমবাতিক বেদনা। অনৈচ্ছিক **इ.क्स्या** হাঁইতোলা। ক্ষম রোগে গুলার শুক্তা ও ক্ষতবং বেদনা। তৎসহ হন্তপদের শীতলতা। নৈশ বর্ম, বিশেষতঃ গলায় ও শিরোদেশে (সিলি, ন্তাট-মিউ)। থকু থকু করিয়া কাসিগ্গলা পরিষ্ঠার করিতে হয়। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের এবং শিশুদিগের দন্তোদামকাণীন কাদি। ভগন্দর সহ খাস্যস্তের রোগ। স্পর্শে বক্ষে ক্ষতবং বেদনা, আয়াসিত খাস প্রশাস এবং বক্ষে আকর্ষণবৎ বেদনা সহ বুকান্থি (ষ্টার্ণম) ও কণ্ঠান্থির (ক্লেভিকেল) নিম্নে বেদনা। রক্তহীন রোগীদিগের আশক্ষিত यक्ता। इर्जन निकुप्तितत्र प्रस्तिष्ठात्वानीन छ्निःकान। निकुप्तितत्र খাস-রোধক কাস, শধনে উহার উপশম ও উপবেশন বৃদ্ধি। গুরুপানের পর শিশুদিশের খাসবোধের আক্রমণ, ক্রন্সনের পর উহার আরও বুদ্ধি, সুধমগুল নীলবর্ণ হইয়া উঠে। তৎপর বক্ষের শিথিশতা. ক্রত, হ্রন্থ আয়াসিত খাস। বিলয়িত দক্ষেদ্যামের ফল প্ররূপ (retarded dentition) মটিদ অর্থাৎ স্বরষল্পে মুখের আক্ষেপ।

ব্রক্তি সাধ্বন্ধ হার ।—ছৎপিণ্ডের প্রায় সকল প্রকার রোগেই অন্তর্ম্বর্জী ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। উৎকণ্ঠা সহ হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপ, তৎপর হর্মলতা ; রক্তে খেতকণিকার আধিকা। রক্তসঞ্চলনের অসম্পূর্ণতা। শরীরের কোন কোন অংশে রক্ত সঞ্চালিত হয় না। ঐ সব স্থানের অবশতা। খাস গ্রহণকালে হৃৎপ্রদেশে তীব্র বেদনা। স্থাপঞ্জের অপ্তাকার ছিদ্রের (foramen ovale) অনবরুদ্ধতা।

প্রষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যেক্স ।--- পৃষ্ঠ এবং হাত পারের প্রায় রোগের ক্যান্ত-ফ্স অতি স্থন্দর ফ্স দর্শার। "হাডের ঔষধ'' ইতার এই নাম এই গানেই স্থ প্রয়োজা। কেন্না, এই সকল স্থান প্রধানতঃই মেরুদভের বক্ততা। হাতপায়ের অবশতা। সন্ধি-অন্থিনির্মিত। স্থানের বেদনা ও কামড়ানি। হাত পায়ে শীতণ জল ঢালিয়া দেওয়ার স্তায় শীতলতামূভব। হাড়ে বিশেষতঃ জল্মার সন্মুখস্থ হাড়ে বেদনা। রাত্রতে এবং শীতল আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। সন্ধি স্থানের এবং গ্রীবাপৃষ্ঠের আমবাতিক বেদনা, রাত্রিতে অথবা বিশ্রামকালে এই বেদনার অতিশয় বুদ্ধি। কটি-বাত (ফির-ফ্স)। সামাপ্ত ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই গ্রীবার আমবাজিক বেদনা ও শুরুতা। ভারী কিছু উত্তোধন কায়বার काल अथवा नाटक एक । क विद्या चार्फ, भगाय, क टिंड এवः वृक्क-প্রদেশে আকেপিক বেদনা। মেরুদণ্ডের বক্রতা, বিশেষতঃ যুবতী क्रमात्रोपिरमद योजनात्र्यकारम। न्याहेना-वाहेकिछ।। कछि নিতম্প্রাদেশে ঝাঁজিলাগা। স্বন্ধ এবং স্বনাস্থিত্যে এবং বাছম্বরে স্কর্বৎ বেদনা। ৰাছ উভোগনে অসংমর্থা। কছুই পর্যান্ত তীরবিদ্ধাবং বেদনা। নথমূলে ক্ষতবৎ বেদনা। প্রকোঠে (অগ্রবাছ, fore arm), মণিবন্ধে (wrist), হন্তাঙ্গুণীতে, বিশেষতঃ বুদ্ধাঙ্গুণীতে আঞ্চিপ্তবং বেদনা। গ্রন্থিত জনিত অঙ্গুলী সন্ধিতে চ্ণময় পদার্থ সঞ্ম (nodosity) শীত্রতা অথবা অবশতাযুক্ত সন্ধির বাত। গুতুপরির্ত্তনকালে বাতের বৃদ্ধি, বসস্তকালে উপশম, শরৎকালে প্রত্যাবৃত্তি। রোগাক্রান্ত স্থানের অৰশতা অথবা পিপীলিক। বিচরণের স্থায় তুড় তুড়ি। রোগাক্রাস্ত

আকে বাঁজিলাগার স্থায় অবশতা। ছর্ম্মলতা সহ স্থাকে কামড়ানি (aching)। আমবাতিক বেদনার স্থান-বিকল্পীলতা (সঞ্চরমানতা) উরুর কামড়ানি। ইটুতে বেদনা, বিচরপকালে বৃদ্ধি। নিয়াঙ্গের অবশতা। পদবন্ধ বরফের স্থায় শীতল। স্কল্পাস্থিতে বেদনা। জল্বান্ধ থালধরা, গোড়ালিতে স্থিকি বিচ্ছাতির স্থান্ধ (dislocation) অমুভব। সন্ধিসানের বসাময় দ্রবোর প্রদাহ। শিরামুও (সাইনোভাটিস)। কটিদেশে ক্যেটক। উপদংশমূলক ভূঅন্থিবেই প্রদাহ অথবা কত। অপ্রির ক্রেটানাতা বশতঃ শিশুনিগের ইটা শিখিতে বিলম্প। শিশুনের পদেব বন্ধতা। শিশুর বক্র গ্রীবা। অস্থির ভগ্নতা। রিকেটস্। উপদংশদোষ বশতঃ অস্থিবেইর প্রদাহ। অস্থির বা সন্ধির গন্ধীরমূল ক্ষত। রাত্রিতে আহির স্থায়ুশূল (সিলি)। হাত পাম্বের বেদনা বশতঃ অস্থিরতা, নড়িলে চড়িলে উপশম। প্রাতে নিদ্রা হইতে ক্যান্রত হওরা মাক্র কটিদেশে বেদনা অন্থভব।

প্রাক্ত্র প্রকাশে প্রতাবর্তনশীল সাম্পূল। এই বেদনা আবেশে আবেশে উপস্থিত হয়। উদর বেদনা, আক্ষেপ ইত্যাদি (ম্যাগফ্স বিফল হইলে)। শিশুদিগের দস্তোদগমকালীন আক্ষেপ। আমবাত সহকারে পকাঘাত। রোগীর অভিশয় অবসয়তা ও ক্লান্তি অমুভব। কর্মে অথবা উচ্চে উঠিতে অপ্রবৃত্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনার অভিশয় বৃদ্ধি, তৎসহকারে অবশতা, শীতলতা ও তৃত্ব তৃত্তি। বিহাতের ভারে, কবন কবন বা অগবিন্দু পাতের ভার বেদনা সকল স্থানে ছড়াইয়া পত্তে। হস্তপদাদির কম্পুন। তর্মণ রোগের পরবর্তি হর্মলতা। এপিলেজি। হিরক্ষর বেদনা, ঝতুপরিবর্ত্তম ভারে উহার বৃদ্ধি। বেদনাক্রাক্ষ স্থানের অবশতা ও তৃত্ব তৃতি।

তড়িতাখাতের স্থায় বেদনা। তরুণ রোগের পর অত্যন্ত ক্লান্তি। দৌর্মণা জন্ত প্রাতে শ্যা হইতে উঠিতে অনিচ্ছা। স্বপ্রেকার আক্ষেপেই (spasm) ম্যাগ-ফস বিফল হইলে ইহা অবশ্র প্রযুক্তা। আমবাত জনিত অবশ্তা বা পক্ষাঘাত।

ক্রক।—দকে অওগালের ভার প্রাবদীল উদ্ভেদ। কণুয়নকর নুজন বা প্রাতন কুস্কৃড়ি। বৃদ্ধিপের গাত্রকভূষন। যোনিকভূষন; কোন প্রকার চর্মরোগ ব্যতীত গাজের অভিশয় কণ্ডুয়ন। পীতাভ খেত মন্তক বিশিষ্ট পামা। সমগ্র মুখমণ্ডল প্রণে পরিপূর্ণ। শুক্ষ ক্ক। দ্বানের পর দকের কণ্ডুয়ন, আরক্তা ও জ্বালা। পৃষ্ঠবংশীর হুর্মলতা বশতঃ হত্তের ধর্মাক্তা। বৃক; আগুলালিক প্রাবসহ অথবা তদ্যতীতই কণ্ডুয়ন (স্রাটমিউর)। মেছেতা (১৯ ক্রমেব বিচুর্ণ ১০ গ্রেণ, পরিশ্রুত জল ১ জ্বাম বাহ্য প্ররোগ) রক্তবর্ধ মুখদ্বিকা (একনি রোজেসিয়া)। সর্মাকে তামবর্ণ পীড়কা। দক্র। ডক্রণ বা প্রাতন হাপিজ। লুপঃস, গাত্রকঙা।

নিজ্ঞা ।—কৃমি বশতঃ অন্থির নিজা (ক্রাটকস)। প্রাতে নিজ্ঞানুতা; সকালে জাগরিত হওয়া ষায় না। স্থুম্পষ্ট অপা। শিশুদিগের নিজ্ঞাবস্থায় চিৎকার, হাঁইতোলা ও হস্তপদ প্রসারণ করা। বৃদ্ধদের নিজ্ঞানুলতা সহ বিষাদময় চিস্তা।

ক্রেক্র)—প্রারম্ভাবস্থার শীত ও কম্পু (ফির ক্স)। প্রভূত ধর্ম।
ধর্ম্পারোগে প্রচুম নৈশবর্ম। শরীরে এবং মুখমগুলে আঠা আঠা বর্ম।
টাইফ্রেড ফিডার ও অপরাপর অরের পর ক্ষরের ক্তিপুরণার্থে ব্যবস্ত হয়। সিড সিড় ক্রিয়া শীত ও কম্পু উপন্তিত হয়। মুখমগুলে শীতল ঘর্ম ও অক্সেম অতিশয় শীতলতা। সুফিউলাগ্রস্ত বিশুদ্ধির পুরাতন স্বিরাম জর। সর্বাজের ব্যক্ষের জার শীতলতা, বিশেষতঃ পদম্বের। হ্রাস্স-ছাদ্ধা—শীতণতা, নড়া চড়া এবং ঝারুপরিবর্ত্তন কালে লক্ষণের বৃদ্ধি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। আর্দ্রতায় এবং ঠাণ্ডা লাগিলেই বোগীর লক্ষণের উপচয় (বৃদ্ধি) জন্মে। অধিকাংশ লক্ষণই শয়নে বা বিশ্রামে উপশ্যিত হইয়া থাকে।

আমারিক প্রক্রোগ।—রক্তর্গনতা ও ক্লোরোসিস্ রোগে রক্তে নৃতন পোহিত কণা নিশ্বাপের জন্ত এবং শুদ্ধ শীর্ণ গোলত-চর্ম বালকলিগের রোগে এই ঔবধ বাবহার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া পিয়াছে। অন্থির কোমণতা, ভঙ্গপ্রবণতা ও ভাঙ্গা হাড় সহজে জোড়া না লাগিলে এই ঔবধে অতি স্থন্দর ফগদর্শে। স্থুফিউলা, রিকেটস; অজীর্ণতা জন্ত শরীরের শীর্ণতা, অন্থির ক্ষত, অঙ্গ প্রত্যাকের বিশবে বৃদ্ধি বা অসম্পূর্ণ বিকাশ, বছপাদ (নাসা বা জরায়ুর শলিপাস), ক্লোম যম্মের রোগ, শীর্ণতা হরিৎপাও ও মুক্তাইীনতা এবং অন্তির সকল প্রকার বোগেই ইহা অবস্থা প্রধ্যোগ করিবে। রাত্রিতে ও শীত্রল ঋতুতে এই ঔবধের লক্ষণের বৃদ্ধি জন্মে। উষ্ণস্থানে ও উষ্ণ ঋতুতে উপশম। রক্তে শেতকণার আধিকা থাকিলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। যে সকল শিশুর কথা কহিতে ও ইটো শিশ্বিতে বিলম্বে হয় ও যাহারা উপযুক্ত সময়ে বাডেনা, তাহাদের সক্ষে এই ঔবধ অভ্যাবশ্রক। যুবক্দিগের স্বপ্লাবস্থার বা অজ্ঞাতনারে শুক্তপাত (স্প্রদাষ)।

ক্রেন্স—৩x, ৬x,১২ x ৩০ x ও ২০০ x জ্রমের বিচুর্ণ ধা
ট্যাবলেট ব্যবহার্য। সাধারণতঃ এই ঔষধের ৩ x ও ৬ x ব্যবহারেই
উত্তম কল পাওয়া যায়। ৩০ x ও ২০০ ব্যবহার করিয়াও চিকিৎসা
ক্রেন্তে উত্তম কল পাওয়া গিয়াছে। স্থালার সাধারণতঃ ৬ x ব্যবহার
ক্রিয়া গিয়াছেন (অধিক মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহাত হয় না উহাতে বরং

ক্যালকেরিয়া ক্লেতির

অপকাবট হয়। অধিক দিন সমানে এই ঔষধ বাবহার কশাব মৃত্তশিলা উৎপন্ন হটয়া থাকে। বয়স্ক বা বৃদ্ধদিগের পক্ষে এই ঔষধ নিম্নকাম বাবহার নিষিদ্ধ।

সম্ভাৱ-এই ওইংধের ক্রিয়ার সহিত ত্যাত্ত-কার্মের অনেতটা সাদৃশ্র আছে। ক্যান্ত-কার্বের রোগী হাই পুষ্ট, কিন্তু ক্যান্তফসের রোগী শীর্ণ খাস-যন্ত্রের তরুণ রোগেই প্রায়ঃশ ইহা ব্যবস্ত হট্যা থাকে। ক্বফকেশ, ক্বফ (বা খ্যামবর্ণ) বর্ণ এবং ক্বফ নয়ন বিশিষ্ট লোকের পক্ষেই का। इ-क्ष्म ध्वर नी नवर्ग नवन ७ किं। त्रः (त्रत हुन (lignt haired) विभिष्ठे वानक वानिकारमञ्ज भरक का। इकार्क नमिक उभरवाशी। ফদফরাস ও ক্যাল্ক-কার্ব্ব এই ছুট ঔষধের মধ্যবতীস্থান ইহার প্রয়োগস্থল। অনেক স্ময় ফদফরাদের পর ইহা (কাল্ড-ফদ) অনুপুরক ঔষধরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। শুহুদায়ের নাণীতে ক্ষতে (fistula in ano) বার্বেরিস এবং ক্যাল্ক ফস উভয় ঔষধই অনেক সময় সফলতার সহিত ব্যবহাত হইয়া থাকে। বক্ষঃস্থলের শক্ষণ সমূহের মধ্যে উভয়ের লক্ষণেরই অনেক সাদৃশ্র আছে (বিশেষতঃ অস্ত্রচিকিৎসার পর যে সকল শক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে)। বিভালয়ের বালিকাদিগের শিরঃপীডায় এই ঔষধের পর ম্যাগ ফদ প্রয়োগ করিলে চমৎকার ফলদর্শে। দহযুগের নালী ক্ষতে বা দহের ক্ষতে (কেরিজ)ফ্রোরিক এসিড মাাগ-ফদ ও দিলির সহিত ; সম্যাদরোগে ফিরম-ফদ কালী-মিউর, কালী-ফদ ও দিলির সহিত; বছমূত্র রোগে কালী-ফদ ও দেট্রামফদের শাহত ; কুমির উপদর্গে নেট্রাম ফদের সহিত ব্যাল্ধ-ফদের তুলনা হয়। রক্তহানতা ও মন্তিফোদক রোগে চায়নার পর বাংস্ত হয়। ইহা কাৰ্বোত্ৰনিমেলিদ ও ক্লটার পর অন্তপুরক ঔষধ শ্বরূপ কাঞ্চ

করে। নিউরেছিনিরা অর্থাৎ মারবিক দৌর্ব্রল্য রোগে এই ঔষ্ধের नकर्ष अथवा हेरा विक्रम हरेरम क्रास्त्रिया-श्रेरिभाक्त वावर्श्या; ভঙ্গণ দৌর্জন্যকর রোগের পরবর্তী অভিঘর্ম্মে সোরিণমের সহিত ইহার তুলনা করণ। তরুণ সঞ্চিবাতে নেট্রাম মিউর ও কালীফস্ ব্যবহারের পর যদি রোগের অবশেষ থাকিরা যায়, তবে ইহা ব্যবহার্য। লুপাস (lupus) অর্থাৎ বৃক রোগে ইহার সহিত কালী-মিউরের তুলনা कद्भण। वृष्पिरात्र त्यारा वानिष्ठित मध्य ; त्रक्शेन्छ। ए কোরোসিস (মৃৎপাঞ্) রোগে নেট্রাম মিউরের সহিত; বিশেষতঃ উহার সহিত কোঠকাঠিন্ত বিশ্বমান থাকিলে ইহার সহিত পর্যায়ক্রমে নেট্রাম মিউর ব্যবহার্যা। মুধদ্ধিক। অর্থাৎ বয়োত্রণে ছেলেদের রোগে পিক্রিক এসিড ও যুবতী মেরেদের রোগে ক্যান্ত-ফদ সমধিক **উপযোগী।** ডিদ্পেপদিরা অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য রোগে আহারান্তে সাময়িক উপশ্ব বোধ করিলে ক্যাল্ক ক্স ব্যবহার্যা, কিন্তু এই অবস্থায় এনাকার্ডিঃমই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার্য। এইরূপ স্থলে চেলিডোনিয়ামও ব্যবহৃত হইতে পাৰে। মান্সিক অবসাদ, ছৰ্বলতা ও মূত্ৰে ফ্সফেট व्यथः क्षिप वाकित्व (हत्वानियात्रत्र अहिक कुननीय। निकत्वत রক্ত্মীনভাম কুদ্রাকৃতি কুশ ও রিকেট্স গ্রন্থদের পক্ষে বিশেষ»: তাহাদের মন্তক হইতে তৈলাক্তের ন্থায় ঘর্ম নি:স্ত হইলে সিলি कनश्रम। এই সব ऋल कित्रम, कूश्रम, बारानिक श्रेष्ठ्र छेरा । শক্ষণাত্রসারে ব্যবস্থিত হইতে পারে। হাইড্রোকেফেলয়েড অর্থাৎ মন্তিকোদক রোগে এই ঔষধের পর অনুপূরক ঔষধ অন্ধ্রণ কিছম व्यव असित caiरण देशक अत कांगे दावश्यां। ज्यान्ति वार्याकरून সিন্দাইটমের সহিত তুলনীর। কর রোগে (consumption)

ক্যান্ধ-ফদের পর লক্ষণের সাদৃশ্য অনুসারে সিলি, সলফ, অথবা টিউবার কিউলিন:ম ব্যবহৃত হইতে পারে; এই রোগে ফদ, মার্ক, আয়োড, আদ আইয়োডের পরই সাধারণতঃ ইহা (ক্যান্ধফদ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা। Calcarea Sulphurica.

ইহার ইংরেজী নাম সলফেট অব লাইম বা ক্যাস্সির্ম সলফেট।
সাধারণত: ইহাকে জিপসঃম (Gypsum) বা প্লাষ্টার অব পেরিস বলিয়া
থাকে। জান্তব শরীরের বিধান তন্ত্রর (tissue) অভ্যন্তরে পৃথ বা
তৎসদৃশ কোন প্রকার অকার্যাকরী পদার্থ সঞ্চিত হুইলে তৎক্ষণাৎ তাহা
দূরীকরণ এবং বিগলিত বিধানতন্ত্রর নিঃসারণই জীবদেহে সলফেট অব
লাইমের প্রধান ক্রিয়া। শরীরন্থ বিক্বত রস এবং পৃথকে শরীর হইতে
বাহির করিয়া দেওয়াই এই পদার্থের বিশেষ কাজ। শরীরে ইহার
পরিমাণের ন্যুনতা ঘটিলে পৃষ্ত্রাব বৃদ্ধিত হইতে থাকে। এজন্ত
পৃষ্ণোৎপদ্ধির উপর ইহার এত প্রভাব।

আছিরক প্রয়োগ।

সকল প্রকার প্রতিশ্রাধেরই ভৃতীরাবস্থার, মুসমুসের যাবতীর রোপে, ফাড়ার, কার্মছলে এবং ক্ষত ঘার ইহাব অবশ্র প্রয়োজন। সিলিনিয়ার বেমন পুযোৎপাদনের ক্ষমতা, ইহার তেমনই পুয় নিবাবণের ক্ষমতা। এজন্ত ক্ষোউলাদি পাকাইবার বা ফাটাইবার প্রয়োজন হইলে সিলিনিয়া ও যা শুকাইবার প্রয়োজন হইলে কাাম সলফ দিতে হয়। সকল প্রকার

পৃষ্ঞাবেই ইহা ব্যবহার্য নহে। গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণ ও সামান্ত রক্তমিশ্রিক পৃষ্ঞাব লক্ষণ বিদ্যমান ধাকিলেই ইহাপ্রধােজ্য। দ্রৈত্মিক বিল্লীর পৃষ্ঞাবে মান্তক বিল্লীর পৃষাক্ত রসকরণে (purulent exudation in serous sacs), অল্লের টিউবারকিউলার অর্থাৎ শুটিকা দোষ সমূত্ত কত বা ক্ষোটকে এবং কলিকার ক্ষতে ইহা অভিশন্ন ফলপ্রদ। প্রদাহের প্রোরম্ভাবহার ইহা ব্যবহার্য নতে। সঞ্চিত পৃষ্ বাহির হইতে থাকিলে অথবা বাহির হইরা যাওয়ার পর অল্ল অল্ল আল্লে নির্গত হইতে থাকিলেই ইহা প্রমুদ্ধ্য (It is curative in suppuration at the stage in which matter is discharging or contnuing to ooze after the infiltrated place have discharged their contents of pus)। যে যে হলে কতে শীঘ্র শুকার না, বছদিন পর্যান্ত আব নির্গত হইতে থাকে এবং ক্মা ছিল্ল বিশিষ্ট মুখ দিয়া এই আব নিঃক্ত হইতে থাকে (presence of pus with a vent) সেই সকল স্থলেই ইহা অব্যর্থ কলপ্রদ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ

হানানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনশীণতা। হঠাং শ্বৃতি অথবা সংজ্ঞা লোপ। অন্থির চিত্তা (absent minded); ক্রোধপ্রবণতা, উৎক্ঠা, থোলা বাতাদে উপশম; অসম্ভইতা; ভরশীলতা।

আস্তব্দ — শিশুদের মন্তবের ত্বক উঠিয়া যাওয়া ও উহা হইতে পীতবর্ণ পূব নিংসরণ অথবা ক্ষতের উপর পীতাভ মামড়ি। ক্রষ্টা-লে ক্রিয়ায় (শিশুদিগের মন্তবের এক প্রকার পামা রোগ) রোগলক্ষণের হ্রাস পড়িলে (কাালী-মিউরের পর), বিবমিধা সহ মাথাধরা। ঠাঙা লাগার পর মাথাধরা, কিন্তু ঠাঙা বাতাদে উপশম সমগ্র মন্তবে, বিশেষতঃ কপালে বেদনা। বিকমিষা সহ শিরে তুর্ণন। অভিশন্ন কৃথি বা খুদকী। কেশ পতন। মন্তকের ক্ষয় কোগ (cranio tabes)।

ভক্ত — চক্ষু প্রদাহে, প্রদাহের তৃতীয়াবস্থার যথন প্যপ্রাব হইতে থাকে। কণিয়ার গভীব মল শেলটক বা ক্ষত। চক্ষুর গভীর-মূল ক্ষত (দিলি)। চক্ষু ত্তীকে লাচ পীত্রণ প্রপ্রাব। অক্ষি ব্রণ; বেটিনার প্রদাহের তৃতীয়াবস্থার কণিয়া অথবা কল্পাংটাইভার প্রদাহে গাচ পীতর্ব প্রাব লক্ষণে ইছা প্রবৃদ্ধা! (দিলিশিয়ার পর)। অর্দ্ধান্তী। অক্ষিপ্টের ম্পন্দন। চক্ষুব কোণের প্রদাহ। চক্ষু উঠা; চক্ষে শলা প্রবেশের পর ইছা বিশেষ উপযোগী।

ক্রা—মধ্য কর্ণ হইতে গাঢ় পাতবর্ণ, কথন কথন বা রক্তাক্ত পুষ নিঃসরণ (সিলি:শিয়ার পর)। পুর্ব্বোক্ত প্রাব সহকারে বধিরতা। কর্ণের পশ্চাতে বেদনাযুক্ত স্ফীততা ও পূয জান্মবার আশঙ্কা। কর্ণের চতুর্দিকে ফুস্কৃড়ি।

নাসিকা।—নাসিকার প্রতিশ্রারের তৃতীয়াবস্থার অথবা রোগলক্ষণ হ্রাস পড়িলে। নাসিকা হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ পূথের ক্রায়, কথন
কথন বা রক্তাক্ত প্রাব নিঃসরণ। মন্তকের পুরাতন প্রতিশ্রায়ে পূথবং
প্রাব লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী (ক্যালী-সলফ, সিলি)। নাসিকা
হইতে রক্তপাত। এক নাসা হইতে প্রাব নিঃসরণ। নাসাবদ্ধের
প্রান্তে কত। নাসাভ্যন্তরের শুক্ষতা ও অবরুদ্ধতা। নাসিকার্য
চমটি পড়া (crust)।

সুখ্য ত তল ।— মুখমগুলের পূয্সাবী ত্রণ (সিলির সহিত পর্যায় ক্রমে)। যুবকদিগের বয়োত্রণে (acne) পূয ক্রমিলে। দাঁড়ির গোড়ায় কোমল বেদনাক্রক রক্তাক্ত পূর্বাবী উদ্ভেদ। মুখমগুলের

বে কোন প্রকার স্ফীততার পুষোৎপত্তির প্রতিষেধার্থে ইহা ব্যবস্থত হওয়া উচিত। (ক্যাণী-মিউর)। গণ্ডের স্ফীততা ও উহাতে পুষোৎপত্তির আশক্ষা। মুখমগুণোর দক্র বা তদাকারের চর্মবোগ।

সুশ্রমশ্র।—সুথের রোগে পুযবৎ প্রাব লক্ষণে ইহা ব্যংহত হয়।
দশুসূলে ক্ষোটক। ওঠের ভিতরের দিকে কত। ওঠে কাঁচা ঘা।

দেশুন নাড়ির এবং গালের ফীততা সহকারে দম্বনুলের ক্ষত।
দম্বনুল হইতে রক্ত পাত (৩×); দম্ব ক্ষত; পুষোৎপদ্ধির প্রতিষেধক।
কামবাতিক দম্বনুল। মাড়ের অভাস্তর প্রদেশের ফীততা সহ দম্বনুল;
দম্বনুলে ফোটক (৩×ক্রম অভিশর ফলপ্রদ)। আমেরিকার দম্ব
চিকিৎসকগণ দম্বনুলের (মাড়ির) বেদনা ও দম্বনুল হইতে রক্তশ্রাব
নিবারণের ক্ষন্ত সম্বনা তাঁহাদের প্রেটে ক্যান্ত-সলফ ৩× বহন করিয়া
থাকেন এবং উহা প্রয়োগ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন।

ক্তিহ্বা।— জিহ্বার প্রদাহে পৃযোৎপত্তি হইতে থাকিলে (সিলি)।
জিহ্বার গোলিততা। জিহ্বার শুফ কাদার ন্যায় লেপ; অন্ন অথবা
সাবানের ন্যায় স্বাদ। জিহ্বামূলে পীতবর্ণের লেপ।

পালা মান্ত্রা ।—গলার যাবতীর রোগে এনাহের তৃতীয়াবস্থার,
অথবা পৃষবৎ প্রাব নি:সরণ কালে। গল-ক্ষত, কুইঞ্জি ও টন্সসিলাইটিস
রোগে পৃষ্প্রাব হইতে থাকিলে অথবা পৃষ্ জন্মিবার পুর্বে উহার
প্রতিবেধার্থে। খাসরোধের আশকা (হিপার)।

আহাশাহা।—টাট্কা শাকশজী, ফল ও চা পানের আকাজ্ঞা;
প্রবল ক্ষ্মা ও পিপাসা। ভোজনকালে উপরতালুতে কতবৎ বেদনা।
আমাশরে আলাকর বেদনা। হর্বলতা দুরীকরণার্থ বলকারক (টনিক)
ঔষধ সেবনের ইচ্ছা। বিবনিষা সহ শিরোঘূর্ণন।

তিবের এবং মল—মন্ত হতৈ পুষ অথবা পূষ্বং আঠা আঠা
শদার্থ আব। আমরক্ত রোগে পূষের ন্যার ও শেওলা ও শেওলা মল
আব। যক্তের ক্ষেটিক ও উলা চলকৈ প্রবাহ আব নিঃসবল। যক্তং
আদেশে ক্ষতবং বেদনা। এই উষ্বের প্রক্লাতাস্ক্র আব সংযুক্ত
অতিসার। আন্তর ক্ষত। কর বেশগের প্রবিদ্ধিতাবস্থার
আন্তর হতি পূষ্বং আব নিঃসবল বা কোন্তরোধ। ভগন্দব বেশগাসত
মলহাকের নিকটে বেদনাশন্ত ক্ষেটিক। মলবারকভ্রুষন; মলহারের
সমীপবতী স্থানের আর্দ্রতা; সরলান্ত্র নির্গমন; রাত্রে ঘুর ঘুরে জর সহ
কোন্তর্বহুতা। টাইক্ষস রোগে অন্তের ক্ষত। তালিস বাত্র হওয়া।
ঘুষ ঘুষে জর ও খাসকট সহ কোন্তব্বহুতা। অন্তর হইতে পূষ্বের ক্রার
আঠা আঠা তরল প্রার্থিবার।

সূত্র।—স্তাশয়ের পুরাতন প্রদাহে পৃষময় বা রক্তাক্ত মৃত্র লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী (কির-ফদ, ক্যালী-মিউর)। নিফ্রাইটিস। বাদির পৃষ প্রাব হ্রাস করিতে হইা বিশেষ উপযোগী।

পুথ জনে নিদ্রো।—প্রেটি গ্রন্থির প্যস্রাধী ব্রণ। বাঘী, উপদংশ বা প্রমেহ রোগে পুযাক্ত হুর্গন্ধি (সিলি) রসাণি নিঃস্রব (স্রাব) 'থাকিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শুক্রমেহ। প্রস্তেট গ্রন্থির স্ফোটক।

প্রীজনতনতির হা—গাঢ় পীতবর্ণ বা রক্তাক্ত প্রাবশীল প্রদর্ম (গিলি); প্রমেহের প্রাবে উপরোক্ত লক্ষণ থাকিলে। বিলম্বে প্রত্যাগত, অধিক দিন স্থায়ী ঋতু। ঋত্রগর যোনির কণ্ডুরন। সমীপবর্তী যথাদি হইতে ব্রি-গছবরে পুষসক্ষয়; ভগাধরের (বেবিয়া) স্থীততা।

প্রভা-স্তন-প্রদাহে, পুযোৎপত্তি হইনে দিলিদিয়ার পর।

প্রাক্র ব্যালির নেষাবন্ধার পুষমর রক্তাক নিষ্ঠাবন; উহার অতিশর ওর্গন্ধ থাকিলে। পুষ, পাত্রের তলদেশে পড়িবার পর্বই ছড়াইয়া যায় (দিলি)। কাস রোগে, বিলেপক জর সহকারে পুযাক্ত নিষ্ঠাবন। বুকের অভ্যন্তরদিয়া আড়াআড়ি বেদনা। বুকের ভিতর জালা ও একলভা। কুপ; নিউমোনিয়া ও ব্রহ্ণাইটিস (শেষাবন্ধা) রোগে সাধারণতঃ কালী-মিউরের পর ব্যবস্ত হয়। ছদিমা স্বরভঙ্গ। শ্বাস-কাস সহ অয় অয় জর।

ব্রক্ত সংগ্রহন হাত্র।—হরেষ্ট-প্রদাহের পুষসঞ্চিতাবস্থায়। রাত্রিকালীন হংপিডের দপদ্ধানি।

পুষ্ঠ এবং অঙ্গুলাত্য ।—স্বিতে পুষোৎপত্তি সিলি ;

যকল প্রকার কত বা ঘারে পুষোৎপত্তি হইলে (হুর্ন্মা রোগে কালীক্ষা): উরু স্বিরে রোগ (সিলি)। অন্থিকত (সিনি, ক্যান্ধ ক্ষা)!

ক্ষাবোগে পানের তলার আলা। পদতলে জালাকর কণ্ড্রন,

কার্ম্বর রোগে পুষ ক্ষাইবার জন্ত (কালীমিউ, সিলি)। পুষ্ঠের

কার্ম্বরে (পুর্যান) ইতা বিশেষ ক্ষাপ্রে খালধরা। হিপ্জয়েন্ট

ঘিজ্জে পুষ্যার হাসকরিবার জন্ত।

আয়ু আগুল-অজের স্পন্দন; অতিশয় ছুর্বলতা ও অবসরতা বোধ। বুদ্ধিগের সায়ুশূল। কম্পন সংযুক্ত দৌর্দলো রোগীর টনিক উধধ সেবনের আকাজ্জা।

নিদ্রা—দিবাভাগে নিদ্রালৃতা ও রাত্রিকালে জাগরণ। চিন্তা জন্ম মনিদ্রা। যেন ভয় হইতে তাহার কনভ:লশন জন্মিয়াছে রোগীর একপ স্থা দেখা। ত্রের। টাইফরেড ও টাইফস ফিবারে এবং অভিসার ও রক্তাতিসারে অন্তর্গ হইতে প্যাক্ত বা রক্তাক্ত সাব বা তরল রসানি নির্গত হইলে ইহা ফলপ্রদ। কোন রোগের সহবর্তী ঘুষ ঘুসে জর (hectic fever) শীত সহ আপরাহ্নিক জর। পুযোৎপত্তি জন্ম ঘূষ মুষে জর ও পদতলে জালা।

চর্মা ।— চর্মরোগে ক্ষতে পীতবর্ণের মামছি। প্যস্রাধী কুরুছি;
দাঁছির নিমে দানামর ছুমুড়িও উহা হইতে পুয়ও রক্তশ্রাব। ক্ষেটক
নিবারণার্থ এবং পুন্সাব ছাসকরণার্থ। শিরোদক বা মন্তকের একজিমা। বসন্ত রোগে শুটিকায় পুযজন্মিলে; পোড়াঘায় পুয় জন্মিলে।
আভ্যন্তবিক ঔষধ সেখন সহ স্থানিক প্রয়োগও উপকারী। কার্মফল
হইতে ঘন, পীতবর্ণ পুয্প্রাব। স্কাঞ্চের ক্যায় পীডকা।

উপাচ রা উপাশ ন।—জাগ্রত হইবার পর, ক্রত বিচরণের পর, অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইবার পর; উষ্ণতায়, জলে ধেন্ত করিবার পর ও কাজকর্ম করিবার পর এই ঔষধের লক্ষণ সমুহের উপস্থিতি বা বৃদ্ধি হয়।

কাল স্থারী হইলে ক্যাক্তলক বিশেষ উপযোগী। গাচ, পীতবর্ণ, বক্তাক্তলবং হর্গক্ষ আব ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। আর্দ্রতার বৃদ্ধি। শুদ্ধ উষ্ণু বাতাতপ এই ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সিলিনিয়া পুয়ন্ত্রার বৃদ্ধিত করে, এজগু স্ফোটকাদি পাকাইবার প্রয়োজন হুইলে উহা দিতে হয়। ক্যাক্ষ-সলফ পুয়ন্ত্রাব হ্রাস করে, এজগু ক্ষতাদি শুকাইবার নিমিত ইহা ব্যবহার্যা। পেশী বা কপ্তরার অতিচালনা বশহঃ রোগ জিমিলে ইহা বিশেষ উপকারী।

ত্রতা—এই ঔষধের ৩×, ৬×ও ১২× সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।
চক্ষুপ্রদাহাদি চক্ষুর রোগে পৃষ্বৎস্রাব লক্ষণে নিয়ক্রম (৩×) বিশেষ
উপকারী। দন্ত-শূল ও দন্ত মূল হইতে রক্তপাতে ৩×ক্রম অভিশয়
ফলপ্রদ। ইহাতে শীঘ্রই বেদনা দুরীকৃত হইয়া নিদ্রার আবেশ উপস্থিত
হইয়া থাকে। ক্ষোটক, ক্ষত ও আঙ্গুল হাড়ার ইহার বাহ্পুয়োগ ও
হইয়া থাকে।

ক্রেমিপ্রশ্যাথিক ক্রিমের সাহ্রিক সম্বর্কা এই ওরধের ক্রিয়া অনেকটা হিপার-সলফের হায়, কিন্তু হলপেকা উত্র ও গভীর মূল। হিপার বিফল হইলে অনেক সময় ইহায়ারা ফল দর্শে। কালী-মিউর ধারা আশান্ত্রপ ফল না পাইলেও কথন কথন ইহা য়ায় উপকার পাওয়া যায়। এপোসাইনমের ভিতর ক্যাঝ-সলফ আছে। পুযোৎপত্তিতে ক্যালেগুলার সহিত ইহায় ভূলনা হয়। ক্রুপ, ডিসেন্ট্রি গণ্ডের ক্ষীততা ও মিল্ককাষ্টে কালী-মিউরের সহিত; সার্লেট রোগেব পরবর্ত্তী শোগে নেট্রাম-সলফের সহিত; কঠিন ও পুযোৎপত্তিশীল প্রস্থির রোগে এবং কর্ণিরার ক্ষন্ত, টক্সিলাইটিস, স্তন-ক্ষোটক, নীহার ক্ষোটক প্রন্তুতিতে সিশিসিয়ার সহিত তুলনীয়। পাইরোজে রেও পুযোৎপত্তির ক্ষমতা আছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বোগ্য; স্লায়ুশুলে তীব্র বেদনায় ম্যাগ্রুম্বতা আছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বোগ্য; স্লায়ুশুলে তীব্র বেদনায় ম্যাগ্রুম্বতা আছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বোগ্য; স্লায়ুশুলে তীব্র বেদনায় ম্যাগ্রুম্বতা আছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বোগ্য; স্লায়ুশুলে তীব্র বেদনায় ম্যাগ্রুম্বতা আছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বোগ্য; স্লায়ুশুলে তীব্র বেদনায় ম্যাগ্রুম্বতা আছে, ইহাও ত্রুম্বতা ম্যার্ব্রুম্বতা আছে, ইহার (ক্যাঞ্জনক) ক্রিয়া এই ছই উষধের মধ্যবর্তী স্থানে। বুদ্ধিগের রোগ্রে কালী-ফ্স অধিকত্র উপযোগা।

প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায়, কালীমিউর বাবহারের পর, যদি প্রাব ঘন ও প্রাক্ত হয়, তবে ইহা উপযোগী। কিন্তু যদি প্রাব পীতবর্ণের ও পাতলা হয় তবে কালী-সলফ; যদি প্রাব পূষবৎ অথবা রক্তাক্ত পুষের স্থায় হয় তবে সিলিশিয়া ব্যবহার্য। কার্কাঙ্কলে এছ্রাসাইনম ইহা অপেকা উৎকৃষ্ট। কালীমিউর, বেলেডোনা প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে যথন সম্পূর্ণ আরোগ্য জন্মে না, তথনই এই ঔষধ উপযোগী। যথন কোনও স্থনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সামাগ্য উপকারের পর আর কোনও ফল দর্শে না, তথন সলফার, সোরিণম, টিউবারকিউলিনমের খ্যায় এই ঔষধ ও ব্যবহৃত হইতে পারে।

ফিরম ফসফরিকম।

Ferrum Phosphoricum.

ইহার ইংরেজী নাম ফক্ষেট অব্ আয়রণ। সংক্ষিপ্ত নাম ফিরম-ফস।
ইহা রক্তের লোহিত কণার বর্ণকপদার্থ (হিমোগ্রোবিণ) মধ্যে পরিদৃষ্ট
হয়া থাকে। ফক্ষেট অব আয়রণের ক্রিয়ায় রক্তের কণা লোহিতবর্ণ
ধারণ করে, শরীরের সর্ক্ত্র অক্সিজেন বাহিত হয় এবং এতদ্বারাই
জীবনীশক্তি পরিরক্ষিত হয়য়া থাকে। রক্তে ইহার আভাবিক পরিমাণের
নানতা ঘটিলে আছা ভঙ্গ হয় ও রক্তসঞ্চলনের ক্রততা জয়ে।
কেননা, তথন রক্তে যে অলপরিমিত আয়রণ আছে তাহার সাহায্যেই
রক্ত সমস্ত শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করিবার চেটা করে। এজন্ত
রক্তকে অবশ্রই ক্রততর সঞ্চালিত হইতে হইবে।ইহা সহজেই অমুমেয়,
যে কাজ দশ জনের সাধ্যায়ত্ব, তাহা সাতজনকে সম্পাদিত করিতে
হইলে এই সাতজনের অবশ্রই অধিকতর বা ক্রততর পরিশ্রম করা
আবশ্রক। রক্তের এই ক্রত সঞ্চালনেই শরীরে অধিকতর তাপোৎপর হয়
(heat is evoloved from motion)। এই তাপই ক্রেলামে

অভিহিত হইয়া থাকে। শোণিতে লোহাংশের স্বল্পতা এবং তরিবন্ধন শরীরে অক্সিজেনের অপ্রচুরতাই জরের 'অস্থিরতা" উৎপাদন করিয়া থাকে। (Nature's cry for oxygen which is dependent on molecules in the blood which brings on the condition of not at ease.)

শরীরে লৌহের স্বল্পতা ঘটিলে শীঘ্রই অপরাপর উপাদানের ক্রিয়ার ও ব্যাঘাত জন্মে এবং তজ্জন্ত অপর বহুবিধ উপসর্গ বা লক্ষণ প্রকাশ পাইরা থাকে। পোটাসিয়ম ক্রোরাইড অথাৎ কালীমিউরের সহিত লৌহের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কোনও কারণে জীব-দেহে ইহার (কালী-মিউর) পরিমাণ ব্রাস প্রাপ্ত হইলে এবং এই অভাব শীঘ্রই পরিপুর্নিত না হইলে সঙ্গে লৌহের পরিমাণ্ড ক্মিয়া ধায়।

প্রত্যেক সেলের (cell, প্রাণী ও উদ্ভিদের মূল উপাদান; অণুকোষ) মূল অর্থাৎ প্রধান উপাদানই হইল এব্নেন অর্থাৎ অগুলাল। এব্নেনের মধ্যে আবার দিরম অর্থাৎ আয়রণ (লোহ) আছে। অতএব জান্তর শরীরের প্রত্যেক অণুকোষেই (সেল) দিরম আছে। কিরমেন প্রবান ধর্ম হইল অরিজেনকে আহর্ষণ করা। রক্তম্থ আয়রণ নিঃশ্বনিত বায়ু (inspired air) হইতে অরিজেন গ্রহণ করে। শরীরস্থ আয়রণ ও কালী-সলফের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এই অরিজেন শরীরের সর্ক্রি বাহিত হইয়া থাকে। কোনও কারণে মাৎস পেশীতে আয়রণের পরিমাণের হ্রাস জন্মিলে, পেশী-সেত্রের (muscular fibres; শিথিলতা (relaxation) জন্মে। রক্তবহানলীর প্রাচীরস্থ পেশীতে (in muscular coats of the vessels) এই পদার্থের (অর্থাৎ আয়রণের) স্বন্ধতা ঘটিলে শিরা বা ধমনী প্রসারিত হয় ও ভজ্জা শিরা বা ধমনীতে প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হয়। এইরণে রক্ত-

ৰাহী প্ৰণালীতে প্ৰচুৱ বক্ত সঞ্চিত হওয়ায় উহার প্ৰাচীরে (wall of the blood-vessel) অধিক চাপ প্রদান করে। ইহাকেই ল্লাড-প্রেশার বলে। এই অতিরিক্ত চাপের ফলে রক্তবাহীনলী বিদারিত ও হইতে পারে (ইহাকেই এপোস্লেবিয়া ফ্রোরের আলোচনা কালে বলা হইয়াছে যে, মাংশপেশীর হিভিন্থাপক স্ত্রের (elastic fibres) প্রধান উপাদান ক্যাক্ষেরিয়া ফ্লোর। ইহার স্বল্পতা ঘটিলে, ও পুর্ব্বোক্ত কারণে রক্তবাহীপ্রণালীতে অধিক রক্ত সঞ্চিত হইলে শিরা-প্রাচীরে চাপ পড়ার ফলে পেশীর স্থিতিস্থাপক স্থত্র সকল উত্তমরূপে প্রশারিত হইতে পারেনা, কাজেই রক্তের চাপের ফলে শিরা-প্রাচীর বিদীর্ণ হয়। এজন্ম ব্লাডপ্রেসার বা এপোলেফি রোগে ফিরম-ফস ও ক্যান্ত-ফ্লোর এই ছই ঔ্যধেরই বিশেষ প্রয়োজন - এইরূপে অন্ত্রের ভিলাইর (villi) পেশীতে ফিরমের অভাব হইলে অন্ত্র-প্রাচীর প্রসারিত হইয়া পড়ে; ইহার ফলে অতিসার অর্থাৎ ডায়েরিয়া উৎপন্ন হয় এবং অস্ত্রের পেশীতে ইহার অভাব হইলে পেশীর ধমনক্রিয়া (peristaltic action) সুচারুরূপে নিষ্পর হইতে পারে না, এজন্ত কোঠকাঠিন্ত উৎপন্ন হইতে পারে। যে কোন কারণেই রক্তবাহীনলীর প্রসারণ ও তজ্জ্য কৈশিকা নাড়ীতে রক্তাধিক্য (হাইপারিষিয়া) জন্মে (যেমন আঘাত, উপঘাত ইত্যাদি) তাহাতেই এই ঔষধ (ফিরম-ফদ) প্রয়োজনীয়। ফিরম-ফস অতি স্ক্রমাত্রায় প্রয়োগ করিলেই লোহের এই অভাবজনিত অবস্থা বিদ্বিত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা স্প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অক্সিজেনকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতার জগুই এনিমিয়া (রক্তহীনতা), ক্লোরোসিস (মৃৎপাঞ্) এবং লিউকিমিয়া প্রভৃতি রোগে ইছা একটা অত্যাবশুক ঔষধ। পুর্বোক্ত কারণেই দেখা যাইতেছে বে, পেশীর শিথিশত। জম্ভ অথবা রক্তের লোহিতকণিকার

পদাভাবিক অবস্থা হইতে যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হইরা থাকে তাহাতেই ইহা প্রযোজ্য।

চক্ষু ও মুখমগুলের আরক্তন, মস্তকে রক্তাধিকা, নাড়ীর পূর্ণতা ফততা ও উচ্চ গাতোজাপ, শিডঃপীড়া. কোন ও স্থানে রক্তসঞ্চয় ও তজ্জ্য দেই স্থানের স্ফাততা, আরক্তা ও উত্তপ্ততা অথাৎ এক কথায় প্রাদাহিক লক্ষণ বিশ্বমান থাকিলে, ভাহার প্রারম্ভাবস্থায় (অর্থাৎ রস-ক্ষরণের পূর্বের (before exudation takes place) ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। যথন শিশুদের ক্ষুধার বিলোপ, ফ্রেইনিতা ও শক্তিহীনতা জন্মে ও ওজন কমিয়া ধায়, তখন ইহা ব্যবহার কবিলে কোট পরিষ্ণার হয় এবং ক্ষুধার প্রত্যাবৃত্তি জন্মিয়া বিশেষ উপকার দর্শাইয়াথাকে।

অধিকাংশ প্রাদাহিক রোগে এবং কোন কোন সম্প্রতিক জবে, বিশেষতঃ যুবক ও সায়বিক প্রস্কৃতির রোগীর পক্ষে, উগ্রতায় একোনাইট ও বেলোডোনা এবং ওলাশীতো জেলসিমিয়ন এই চুইয়ের মধ্যে ইহার সান । জর হইলে এলোপ্যাপিক চিকিৎসকগণ দেথিয়া পাকেন, টাইফস, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়াল বা অপর কোন প্রকার জর হইয়াছে। কিন্তু বাইওকেমিক চিকিৎসকগণ ইছার কিছুই দেখেন না। দেথিবার আবশুক ও করে না। তাঁহারা এই সকল রোগীর লক্ষণদৃষ্টে ফিরম-ফসের অভাব দেথিয়া, রোগীর কল্প উহাই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং উহাতেই রোগারোগ্য হয়। এই চিকিৎসায় রোগের নামে কিছুই আইসে যায় না, কেবল অভাবের প্রণ করিতে হয় মাত্র।

(১) সর্বপ্রকার প্রাদাহিক রোগের প্রারম্ভাবস্থা, (২) যে সকল বেদনা নড়িলে চড়িলে বাড়ে ও শীতল প্রয়োগে উপশমিত হয়, (৩) রক্তের অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত সঞ্চয় জক্ষ রক্তমাব (Hæmorrhages caused by hypercemia) এবং (৪)কোনও প্রকার আঘাত উপঘাতাদি কারণে তরুণ ক্ষত জন্মিলে ফিরম-ফন্ স্বফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

ভালা। যে কোন কারণেই হউক, মন্তিকে রক্তের প্রধাবন। উন্মন্ততা।
মন্তিকের প্রদাহ; শিরোঘূর্ণন (ক্যাল্ক-ফ্নস, কালাফ্নস)। শিশুদির্গের দড়কা
(ক্যাট-মিউর প্রধান উষধ)। শিরা বা ধমনীর কোনও অংশে রক্ত সঞ্চিত্
ইইলে তাহা অপস্থত করিতে ফিরম-ফ্সের একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ
বিষয়ে উদাসীক্ত। আশা ও উত্তমহীনতা; নিদ্রার পর উপশ্ম। সামাক্ত
বিষয়ও বড় বলিয়া মনে হয়; সামাক্ত কারণেই বিরক্তি বা ক্রোধর
ফলে মন্তকে রক্তসঞ্চয় ও শিরোঘূর্ণন। ঠিক শক্ষ প্রয়োগ করিয়া
মনের ভাব প্রকাশে অপারগতা।

মন্তব্দ ।— মন্তিকে রক্তের প্রধান বশতঃ শিরংপীড়া বা প্রকাপ;
মন্তব-শিথর হইতে দক্ষিণ চক্ষুর উপর পর্যান্ত বেদনা। স্র্য্যোত্তাপ
লাগার মন্দ ফল (ক্যাল্-ফ্স সহ)। শিশুদিগের মুপ্মগুলের আরক্তা
সংযুক্ত শিরংপীড়া, মন্তবেদ দপ দপ্ত চক্ষুর আরক্তা। নড়িলে চড়িলে
ও অবনত হইলে রন্ধি। শিরংপীড়া সহ দৃষ্টিশক্তির অপরিচ্ছন্নতা।
মন্তবের সপ্তাটিক পীড়া। সন্ত্র্য কপালে বেদনা বিশিষ্ট শিরংপীড়া
(ক্যাট্-ফ্স); চক্ষুর উপরে অথবা মন্তব-শিথরে বেদনা (ন্যাট্ সল)।
মুপ্মগুলের আরক্তা বা জর সহকারে মন্তবেদ গুরুত্ব, দপ্দপ্
বা অবিরাম মৃষ্ববেদনা। মন্তবের অতিশয় স্পর্শন্বের। মন্তক স্পর্শেক্তব্ধ বেদনা; চুল স্পর্শে বেদনা। নাসিকা হইতে রক্ত্মাব।

অপরিপাচিত ভ্করের বন্দন সহকারে শির:পীড়া বা শিরোঘূর্ণন (ন্যাট ফস); শির:পীড়া সহকারে অশুস্থাব। মূথমগুলের রায়্-শূল (ক্যান্থ-ফস, ম্যাগ ফস)। নাসিকা হইতে রক্তপাতে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তের পরিমাণের হ্রাস জন্মিয়া উপকার দর্শিয়া থাকে। মন্তক্তক পার্শে বিদনা। মন্তকে বেদনা, মনে হয় চক্ষ্র উপর দিয়া এক পার্থে প্রেক বিদ্ধ হইতেছে। হাতুড়ীঘারা আঘাতের ন্যায় বেদনা, দক্ষিণপার্থে রুদ্ধি। নাসিকা হইতে রক্তপাতে মন্তক বেদনার উপশম। রৌদ্র ভোগের মনকল জনিত অন্থা। মেনিঞাইটিস সহ তন্ত্রালুভাব; ঠাণ্ডা ও স্পর্শে অসহাতা।

তেকু ।—চক্ষুর তরুণ প্রদাহ (কালী-মিউ)। হাদ বা অপর
কোনও উদ্ভেদ বিশিষ্ট রোগে চক্ষুর প্রদাহ, এবং তৎসহকারে আলোকে
অতিশয় বিদ্বেদ। আক্ষিগোলকে তীত্র বেদনা, চক্ষু নাড়িলে বা উহার
ব্যবহারে রুদ্ধি। রেটনাইটিসের প্রারম্ভাব্যা। কর্নিয়ায় ক্ষেটক
জানিলে বেদনা নিবারণার্থ। অক্ষিপুটে ফতাঙ্কুর এবং উহাতে বালুকণা
বিভামানজার নাায় অনুভব (কালী-মিউরের সাহত পধ্যায়ক্রমে)। চক্ষুর
আরক্তা। কোন প্রকার প্রাব ব্যতীত চক্ষুর তীত্র বেদনা ও
প্রদাহ। কঞ্জাংটাইভার শিথিলতা সহ দৃষ্টির অগরিচ্ছয়তা। আবক্ততা
ভ জালাসহ চক্ষু প্রদাহ, চক্ষে ক্ষত্বৎ বেদনা, বেটিনায় বক্ত সঞ্চয়।
চক্ষে বালুকণার বিভামানতা অনুভব। চক্ষুর পাতায় টিউমার। দক্ষিণ
চক্ষ্র নীচের পাতায় অঞ্জনী।

কর্। কর্প্রান্ত; প্রতিশায় জনিত কর্ণবেদনা। কর্ণা-ভাতরে থোঁচামারার ভায় বা দপ দপকর বেদনা। স্টিবিদ্ধবং বেদনা। ব্লাডপ্রেসার দরুণ কর্দে নানা প্রকার শক্ষ শ্রুত হয়। ফর্ণনাদ, প্রবাহিত জলের শব্দের ন্যার কল্ কল্ শব্দ। জ্বর সংযুক্ত কর্ণ-প্রদাহ (প্রারন্থাবহা); কর্ণের পশ্চাতত্ব স্তনাগ্রসদৃশ অন্থির (mastoid-process) প্রদাহ। মধ্যকর্ণের প্রতিশ্রার সহ কর্ণ পটহের স্থলত্ব (thi-ckening) কর্ণের বাহাাংশের প্রদাহ বিশিষ্ট গোমাংসের ন্যার আরক্তবা। কর্ণপটহের প্রদাহ; কর্ণপ্রদাহ জনিত বধিরতা। শব্দে বিরক্তি।

নাতিনকা।—মন্তকের প্রতিশ্রায়ের প্রথম বা প্রাণাহিক অবস্থা।
সহছেই সন্লিলাগে (ক্যাল্ক-ফদের সহিত পর্য্যায়ক্রমে)। সন্দিব্র ।
যে কোন কারণেই হউক, নাসিকা হইতে উজ্জল লোহিত রক্তরাব।
রক্তহীন বা সংন্যাস রোগগ্রস্ত (এপোপ্রেকটিক) ব্যক্তিদিগের রক্তরাবের
প্রবণতা (ক্যাল্ক-ফস, কালী-ফস, নাাট-সল)। প্রাব লাগিয়া চমটি পড়ে।
ব্যাব লাগিয়া নাসার্জ্র হাজিয়া যায়। ঠাগু। লাগিবার পর প্রাব নিঃস্ত
হইবার পুর্বেই একোনাইট ব্যবহার করিতে হয়, নতুবা উহাতে কোন ফল
দর্শে না, কিন্তু ফিবমে তাহা নছে। ঠাগু। লাগিবার কতিপয় ঘটকা
পর পর্যান্ত ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নুখান প্রনাদ্ধ বির বার করা বার করা, ও জালা সহকারে শিরঃপীড়া। মুগমগুলের আরক্তা সহকারে গীবাপুর্চ্চ শীতলভার ভর ।
রক্তে লোহিতকণার হলতা নিবেনন মুখমগুলের স্নায়ুশ্ল। শীতলভার
উপশ্যিত হয় মুখমগুলের এরপ বেদনা এবং এবং উত্তপ্ততা। মুখমগুলের
বিস্প (স্থাট সল)। দপ্দপ কর বেদনা সহ মস্তকে ও মুখমগুলে
ঘর্ম ; রক্তহীন পাতুর মুখমগুল। চক্ষ্র নীচে ক্ফবর্ণ মগুল।

মুখ-মধ্য—মুধের প্রদাহ। মাড়ির আরক্তা ও ফীততা। মুধাভ্যম্তরম্থ শ্লৈমিক ঝিলীক আরক্তা।

ভিন্ত্া-প্রদাহস্চক পরিষার, আরক্ত জিহ্বা। ক্লীততা

সহকারে জিহ্বার মলিন আরক্তভা (কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে)। শিরংপীড়া সহ আরক্ত, পরিষ্কার ও বিদারিত জিহ্বা।

স্কে ।—দন্ত-ম্লের প্রদাহ বিশিষ্ট দন্ত-শ্ল । মাড়ির প্রদাহ ও গালের উত্তথতা, শাতল জলের সংস্পর্শে উপশম বোধ হয় এরপ দন্ত বেদনা। দন্তরোগ সহকারে জ্বানুত্ব (ক্যাল্ফফসে বিশেষ কোন ফল না দর্শিলে)। উক্তায় এবং নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি। উক্তল সংস্পর্শে দন্তবেদনার বৃদ্ধি (হাস, ম্যাগ ফস)। শিশুদের দন্তোদ্রেদ কালীন উপসর্গে জ্বলক্ষণের বিপ্রমানতা, অতিসার প্রভৃতি। দন্ত দীর্ঘ বোধ হয়। বেদনা অন্তব না করিয়া তুই পাটা (মাড়া) একত্র করা যার না

প্রকাশনা ।—প্রদাহ সহকারে গলক্ষত। গলার শুদ্ধতা, আরক্তা ও প্রদাহিততা। সবম্যাক্সিলারি অর্থাৎ হয়নিমগ্রতির রহকতা। জর এবং বেদনা সংয়ক্ত গলক্ষত, আলজিহ্বার প্রদাহ (টনসিলাইটিস)। তালুমূল বা গলার প্রদাহ (কালীমিউর, ক্যান্দসল); বক্তা এবং গায়কদিগের গলক্ষত। ডিফথিরিয়ার প্রারম্ভাবস্থা। বক্তৃতা বা সঙ্গীতের পর স্বরনাশ। গলকোষ, স্বর্ষত্ব, গলনলী এবং সম্ভবতঃ বায়ুনলীভূজ হইতেরক্ত প্রাব।

আনাশহা।—ছগ্ধ ও মাংসে অকৃচি। কোনও প্রকার উত্তেজক (stimulant) পানীয়ের (যেমন আভি) আকাজ্জা। ঢেকুরে তৈলাক্ত বা বসামর স্বাদ। ঠাণ্ডা লাগার ফলে শিশুদের আমাশর প্রদাহ, তৎসহ পাতলা মলপ্রাব। আহারের পর বিবমিষা ও বমন। বাস্ত পদার্থের অন্ন স্বাদ। অন্ন দ্রব্য, মাংস, কফি অথবা পিইকাদি সহ্য হর না। আমাশ্রের প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থার যৎসামান্ত আহার্য্য

গ্রহণেই বেদনা। আমাশর-প্রদেশে স্পর্শদেব, আমাশরে জালাকর বা কতবং বেদনা। বৃকজালা (ক্যান্ত ফস, ন্তাট ফস); অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বা উজ্জল লোহিত রক্ত বমন, ভুক্তদ্রব্যর স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার। শীতল পানীয়ে বেদনার উপশম। বাহ্ন উষ্ণভারও বেদনার হ্রাস, অগ্নিমান্দ্য সহকারে মুখ্মগুলের আরক্ততা ও আমাশরে দপদপকর বেদনা। ভুক্তদ্রব্য ও তৎসহ তিক্ত তরল পদার্থ বমন; শৈত্য জন্ত আমাশরে বেদনাও তরল মল্প্রাব। ভুক্তদ্রব্য বমন ও তৎকালে শিরঃপীড়া। বিদারিত জিহবা, চাপদিলে বা আহার্য্যগ্রহণ মাত্র আশাশ্রে বেদনা।

ভিদ্তা ত মলে!—অন্ত্র-প্রদাহের প্রারম্ভাবন্থা। আন্ত্রিক (চাইকরেড) জর, কলেরা, রক্তামাশর ও অন্তরেষ্টপ্রদাহের (পরিটোনাইটিস) প্রথমাবস্থার রোগী শীত শীত অমুভব করিলে। স্থলান্ত্রে (কোলন) ও সরলান্ত্রে উত্তপ্ততা সহ কোষ্ঠবন্ধতা, তৎসহ হাড়িশ বা অর্শ। আচুষণ (এবসর্পদন্) ক্রিয়ার অভাব বশতঃ অতিসার। অপরিপাচিত দ্রব্য সংযুক্ত বা জলবৎ মল; রক্তামাশর (কালা-মিউ প্রধান ঔষধ)। উচ্ছল লোহিত রক্তশ্রাবী অর্শ এবং উহাতে ক্ষত্রবং বেদনা (ক্যান্ধ ফ্লোর)। ভেসিলিনের স্থানিক প্রয়োগও আবশ্রুক। ক্ষমির বিগ্রমানতা, তৎসহ জীর্ণ শক্তির ক্ষাণতাও অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য নিঃসরণ (স্থাট ক্ষম প্রধান ঔষধ)। বৃহতের প্রদাহ, মলন্বার হইতে উচ্ছল লোহিত রক্তশ্রাব। অতিসার। শিশুবিস্ফিকা। ঘর্শ্ববিলোপের ফলে জলবৎ বা রক্তাক্ত মল। আম এবং রক্ত সংযুক্ত মল। কৃষ্ণন ব্যতীত পুনঃ পুনঃ মলবেগ। হার্ণিয়া। ক্ষ্ম ক্ষমি।

মুক্ত।—লিম্ব-মুণ্ডের গোলাকার পেশীর (ফিম্কটার মাসল)
মুর্বলিভা নিবন্ধন অবারিত মুত্রপ্রাব। মুত্রাশরের প্রদাহের প্রারম্ভবস্থার

(সিপ্তাইটিস) ও মুত্রন্তন্তে মুত্রন্তানের চেপ্তাকালে তাঁত্র জালা। বৃক্ক-প্রদেশে তাঁত্র জালা ও ক্ষতবং বেদনা। পুনঃ পুনঃ মুত্রবেগ। প্রতি কাসেই মূত্র নিঃসরণ; রক্তমূত্র; মুত্রনাশ (মুত্রলোপ), বিশেষতঃ শিশুদের; বৃক্ককের যে কোনও প্রকারের প্রাদাহিক বেদনা। প্রগাঢ় বর্ণবিশিপ্ত মূত্র। ত্রাইটস ডিজিজ সহ জ্বর এবং মধুমেহ। জ্বর ও তৎসহ শরীরের কোন কোন স্থানে বেদনা। গ্রম লাগার দরুণ মুত্রন্তন্ত, বিশেষতঃ বালকদিগের মূত্রাশরের মুথশারী পেশীর চর্বলতা নিবন্ধন শন্যামূত্র কোলফিস)। অনিরাম মূত্র প্রবৃত্তি (রোগ পুরাতন না হইলে), প্রভূত মূত্র্রাব; বৃক্ক প্রদাহ। দ্র্ভার্মানাবস্থায় মূত্র শক্ত্রাগ।

পুৎ ক্রেন্সের নুতাশরের মুখশারী গ্রন্থির (প্রাংগিকয়্যাও)
প্রদাহ (ইহার পর কালী মিউ ব্যবহার্য।)। শুক্রবাহী-শিরাপ্ত ছের
বেদনা ও স্ফীততা সহ হ ও-প্রনাহ (মণ্ডের স্ফীততা, বেদনা ও কাঠিতা)
বাঘি, প্রমেহ, অপ্রপ্রদাহ মথবা মণ্ডের উপকোষের প্রদাহের প্রারন্থা।
স্বাদপ্রকর বেদনা। প্রমেহের প্রথমাবস্থার কালীমিউরের সহিত
প্র্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। শুক্র করণ।

প্রেকিন্সলে ক্রিয়া । অভিশয় শুন্ত তার্ত্তর বহন এবং বেদনা নিবারণার্থ ব্যবহার্যা। অভিশয় শুন্ততার্ত্তর সহকারে যোনির আক্রেপ (গ্রাট মিউর)। প্রমেহের প্রথমাবস্থায় (স্থানিক-প্রয়োগও ফলপ্রদ)। বাধক বেদনা (ম্যাগ ফস); বিরজকালে বাধকের প্রতিষ্ণেক রূপে ব্যবহার্যা। উজ্জল লোহিত রক্তশ্রাব। মুখমগুলের আরক্তা সহ বেদনা সংযুক্ত রক্তশ্রাব ও তৎসহ বিব্যাম্যা ও ব্যন। প্রতি তিন সপ্তাহ অত্যে ঋতু প্রকাশ। উদর ও কটি বেদনা সংযুক্ত প্রকৃত রক্তঃ

শ্রাব, তৎসহ মন্তকশিথরে বেদনা। ডিম্বাশয়ের (ওভেরি) বেদনা
সহ নিমোদরস্থিত সমুদয় পদার্থ ভগ-পথে নামিয়া পড়িবে এরপ
অমুভব। শ্বল্ল ও বেদনাপূর্ণ রক্ষ:সহ পুন: পুন: মূত্রবেগ। ঋতুর
পূর্ব্বে ও প্রথম তিন দিন উদরে বেদনা। যোনিমুথের আক্ষেপিক
অবরোধ ও তর্জন্ত সঙ্গমক্রিয়ায় অসমর্থতা। বোনির প্রদাহ; যোনির
শুদ্ধতা ও উত্তপ্রতা; সঙ্গমকালে অথবা পরীক্ষাকালে যোনিতে বেদনা।
অভ্যধিক শুদ্ধতা ও স্পর্শানুভবতা জন্তা যোনির আক্ষেপ।

গ্রা—প্রাত:কালে বিবমিষা ও ভুক্ত দ্রব্য বমন ও কথন কথন উহার অমুসাদ (ক্রাটফস)। স্তন-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থা; প্রস্বান্তিক বেদনা; প্রসবের অব্যবহিত পরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রস্বান্তিক অরের ভয় গাকেনা।

ব্রক্ত সঞ্চলন হাস্তা—রক্তবাহী-নালীর ও লসিকাগ্রন্থির প্রণাহ। জরে পূর্ণ, ক্রন্ত নাড়ী। প্রদাহিত অবস্থার হৃৎপিত্তের দপ্দপ্কার্ডাইটিস পেরিকার্ডাইটিস এক্তোকার্ডাইটিস, আটিরাইটিস প্রভৃতিরোগের প্রাদাহিক অবস্থার। রক্তে লোহিতকণার সমতা (রক্তহীনতা) ক্যাল্ব-ফনও ব্যবহার্যা; এনিউরিজন (ক্যাল্ব ফ্রোর প্রধান ঔষধ)। হৃৎপিও বা রক্তবহণ নাড়ীর প্রসারণ (ক্যাল্ব-ফ্রোর সহ পর্যায়ক্রমে)।

পৃষ্ঠ এবং অঞ্চলপ্রত্য ক্স-ঠাণা লাগার দরণ গ্রীবাপৃষ্ঠে বেদনা ও গুরুতা। বন্ধনী বা কণ্ডরার অতিচালনা জনিত বেদনা। হত্তের ফীততা ও বেদনা, হাতের তালুর উত্তপ্রতা। পৃষ্ঠে, ব্রক্ত প্রদেশে এবং উরুদেশে প্রাদাহিক বেদনা। কটিবাত (ক্যান্ধ-ফ্স)। পৃষ্ঠের আড়স্টতা, সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি। আমবাতে প্রদাহ এবং জর নিবারণার্থ। বাতজনিত জর। শৈত্য নিবন্ধন গ্রীবাপৃষ্ঠের পেশীর

আড়প্রতা। বাত বা অন্ত কোন কারণে হস্তাঙ্গুলির ফীততা ও বেদনা।
হস্তপদের অন্তির ভগ্নতা। উরুসন্ধির রোগ। হাটু ও গুলফসন্ধির
বেদনা, জর সহকারে সন্ধির বাতজনিত খন্ততা (কালী-ফদ)। অতিশর
বেদনা সংযুক্ত সন্ধির তরুণ বাত। ঠাগু। লাগার দরুণ বাত। সর্বাদাই
সঞ্চালনে বেদনার রৃদ্ধি। কোন স্থান মচকিয়া গেলে প্রথমেই এই
তিষধেব প্রয়োজন। যে যে স্থলে তিষধের স্থানিক ব্যবহার প্রয়োজন
সেই সেইস্থানে ইহা অবশ্র ব্যবহার্যা। আমবাতিক বেদনার বিচরণে
বৃদ্ধি, উন্ধতার উপশম; সন্ধির বিশেষতঃ স্কন্ধসন্ধির বাত, ও বেদনার
বক্ষঃস্থল পর্যান্ত সম্প্রদারণ; এক সন্ধির পর অপর সন্ধির বাতের আক্রমণ।

শ্রাহ্ন-ইত্র-শাস-যন্ত্রের সর্ব্ধ প্রকার প্রদাহের প্রারম্ভাবন্তার জ্বর এবং বেদনা নিবারণার্থে বিশেষ ফলপ্রদ। নিউমোনিয়া, ব্রন্থাইটিস, প্রুরাইটিস ট্রেকিয়াইটিস প্রভৃত্তি বোগে প্রাধাহিক অবস্থার বেদনা বিদ্রিত না হওয়া পর্যান্ত ব্যবহার্যা। ইহার পর রোগের বিতীয়াবস্থার যথন খেত শ্লেমা নিঃস্কৃত হইতে থাকে, তথন কালী মিউর ভাল থাটে। কুসকুস হইতে উজ্জ্বলাছিত রক্তপ্রাব, রক্তের রেখান্বিত স্বল্প শ্লেমা, বক্ষে কতবৎ বেদনা। রোগের প্রারম্ভাবস্থার বা রোগের ভোগকাল পর্যান্ত হুস্ব ক্রন্ত, শ্রাস-প্রশাস; শুদ্দ কঠিন কাম ও কুসকুসে বা পার্মে চিড়িকমারা বা ক্রতবৎ বেদনা সহকারে বক্ষঃস্থলের প্রতিশার; সকল প্রকার সিদ্দি ও কাসির প্রারম্ভাবস্থার ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ক্রুপ এবং হুপিংকালের জ্বর লক্ষণে। শ্রাসকালে বক্ষে ক্ষতবং বেদনা। যক্ষা কামে কুসকুস হইতে রক্তপাত; জ্বর; স্বরনাশ; স্বর্যন্ত্র কণ্ডুরিত হইয়া শুদ্দ কাসের উদ্রেক; স্বর্ভঙ্গ; সঙ্গীত বা বক্তৃতাদির পর স্বর্যন্ত্রে

প্রাক্ত্র অভিভারের পরবর্তী সায়্শ্ল।

ব্দর এবং মন্তকে রক্তের প্রধাবন বিশিষ্ট অপন্মার বা মৃগী। দস্তোভেদ-কালীন জর ও তৎসহ আক্ষেপ। অতিশয় অবসন্নতা ও ক্লান্তি, বিশেষতঃ শিশুদের রোগে।

ভর্ম।—চর্মের সকল প্রকার রোগেই প্রাদাহিক অবস্থায় এই ঔষধ বাবহার্যা। ক্ষোটক, কার্মন্ধল এবং আঙ্গুলহাড়া প্রভাত রোগে জর এবং বেদনার উপশ্মার্থ। হাম, স্বালেট ফিভার, বসন্ত, পানি বসন্ত, বিসর্প (ইরিসিপেলাস) প্রভৃতি রোগের প্রারম্ভাবস্থায় (কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে, বা ইহার পরে কালী মিউর)। স্বকের স্থানিক রক্তসঞ্চয়, কাটাঘায়ে পুয জ্মিবার পুর্বে।

ক্রেল্রা:—সর্বপ্রকার প্রাদাহিক ও প্রাতিশায়িক জরের প্রা:ভাবন্থার অতিশয় ফলপ্রদ। যে কোন রোগের সহিত জর থাকিলে প্রথমেই ইহা ব্যবহার্য্য এবং যে পর্যান্ত জর বা বেদনার উপশম পরিলক্ষিত না হয়, ততক্ষণ ইহা প্রয়োগে বিরত হইবে না। বিধানের ক্ষয় নিবারণে ইহা বিশেষরূপে সাহায্য করে। সর্ব্যপ্রকারের জ্বরেই প্রারম্ভাব্যায় ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যে কোনও প্রকার জ্বরই হউকনা কেন, উচ্চ গাত্রোভাপ থাকিলে এই ঔষধ ১২× ক্রমে লক্ষণ দৃষ্টে অপর কোন ও ঔষধের সহিত হা পর্যায়্রক্রমে ঘন ঘন ব্যবহার করিলে জ্বর ক্রিয়া থাকে।

নিদ্রা।—নিদ্রাহীনতা ; বিশেষতঃ মন্তিক্ষে রক্তসঞ্চয় জনিত। হর্মলতা বা উত্তেজনা জনিত নিদ্রাহীনতায় কালী-ফলের সহিত পর্য্যায়ক্রমে রাত্রিকালে অন্থিরতাযুক্ত অনিদ্রা। উদ্বেগপূর্ণ স্বর; অপরাহে নিদ্রালুতা।

নস্তব্য ।—সর্বপ্রকার আঘাত, উপঘাত, ক্ষত, কাট। যা প্রভৃতিতে আভ্যন্তরিক ও বাহিক প্রয়োগ ফলপ্রদ। অন্থির রোগে বা ভয়ে, কোমলাংশের প্রদাহ ও বেদনায়, ব্রক্তহীনভায়, রক্তক্ষরজনিত শোখে

(ক্যান্ধ-ফলের সহিত পর্যায়ক্রমে) রক্তহীন ব্যক্তিদিগের ও শিশুদিগের নাসিকা হইতে রক্তপাতে রক্তের উজ্জ্বল আরক্ততা ও শীঘ্র শীঘ্র সংযততা লক্ষণে ইহা অন্বিতীয় শীতলভায় উপশম এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি, ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। রক্ষহীনতা, রক্তে লোহিত কণিকার ন্যুনতা ও শ্বেত কণিকার আধিক্য (লিউকিমিয়া), শরীরের কোন অংশের কৈশিকা নাড়িতে রক্তাধিক্য (হাইপারিমিয়া); প্রাদাহিক পীড়ায় রসসঞ্চয়ের পূর্বে (pre-exudative state); লাগি, আঘাত, কাটাক্ষত ও পতনাদির ফলে প্রাদাহিক লক্ষণের বিভ্যমানতার ইহা অভিশয় উপকারী। গ্রন্থির ক্ষত, অন্তির প্রাহ্ম ও কোনলাংশের ক্ষতেও ইহা সমান উপযোগী। ক্লোরোসিস রোগে ক্যান্ধ-ফ্সের পর ব্যবহার্য্য।

ক্রম।—সদলার এই ঔষধের সাধারণতঃ ৬× হইতে ২২ ক্রম ব্যবহার করিতে পরামর্গ দেন। রক্তহীনতার ১× এবং ২× ব্যবহার করিতেও উপদেশ দেন। কোন কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই ঔষধ ১২× ক্রমের নিমে ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন, যে হেতু উহাতে অনিলা উপসর্গ আনয়ন করিতে পারে। আমরাও এই বাক্যের সারবহা পুনঃ পুনঃ উপলাজি করিয়াহি। জর থাকিলে যে কোনও রোগে আমরাও ১২× ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং ইহাতে উত্তম নিদ্রা জালয়া থাকে। ক্রতমা (cut-wounds), মচকিয়া যাওয়া, রক্তম্রাব, অর্শ প্রভৃতি রোগে ইহার বাহ্ন প্রয়োগও হইয়া থাকে। প্রতিশ্রায় (সাদি), গ্রীম্মকালীন অভিসার ও প্রমেহাদি রোগে ২০০× ব্যবহার করিয়াও স্থানর ফল পাওয়া গিয়াছে।

সম্ভাবস্থার অর্থাৎ রসক্ষরণের পূর্বে (before exudation)
ব্যবহার্য্য। ক্ষমেক্সে কিঞ্ছিৎ আয়রণ বর্তমান আছে, এজন্ত শাস-যত্তের

ষেরপ অবস্থায় ফিরম উপযোগী সেই সব লক্ষণে রুমেক্সও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একোনাইট ও জেলসিমিয়মের মধ্যবর্তী স্থানই ফিরম কর্তৃক অধিক্বত হইয়া থাকে। উৎকণ্ঠা ও অন্থিরতা সহ পূর্ণ উল্লফ্টনশীল নাড়ী থাকিলে একোনাইট; কোমল প্রবহমান নাড়ী সহ তক্রালুভাব ও হতবৃদ্ধিতা বিশ্বমান থাকিলে জেলস্ প্রযোজ্য। রোগীর রক্তহীনতা বিশ্বমান থাকিলে চায়নার সহিত ভূলনা করিবে, কেননা চায়নার সহিত ইহার (ফিরম) বছ লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। আশ্চর্যোর বিষয়, যে ভূমিতে চায়না জ্মিয়া থাকে তৎপ্রদেশীয় ভূমি হইতে আয়রণ ও উত্তোলিত হইয়া থাকে।

খাস-যন্ত্রের রোগে ইহার স্থান ফিরম-মেট ও ফসফরাস এই উভয়ের পরবর্ত্তী স্থলে। শ্বাস যন্ত্রের প্রদাহে ফিরম-মেটের ভার রোগীর অভি উচ্চগাত্রোক্তাপ থাকিলেও ইহা ব্যবহার্য্য, বক্ষ:স্থলে যাতনা সহ স্বাস-কষ্ট উভয়েই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত লক্ষণ বিশেষভাবে বর্ত্তমান থাকিলে ফিরম-ফম অধিকতর উপযোগী। বাই, বেল ও আর্ণিকার সহিতও অনেক বিষয়ে ফিরম-ফসের সাদৃশ্র আছে ; মধ্যকর্ণের ভরণ প্রদাহে হিণার ও মার্কের সহিত, শিশুদের চুর্কুলতা ও জীবনী শক্তির অবদাদনে, রোগীর দৃঢ়পেশী, স্কুমার বদন এবং কেশ সুশ্ম ও কৃষ্ণিত থাকিলে ফিরম-ফস এবং মলিনবর্ণ, শিথিল পেশী এবং কুঞ্চিত কেশ বিশিষ্ট রোগীশিগের পক্ষে সলফ অধিকতর উপযোগী। বুদ্ধদিগের আমবাতিক উপসর্গে পেশীর আড়ষ্টভাব (stiffness) ও বেদনাযুক্ত খলী (pain-ful cramps) থাকিলে ষ্ট্রিকনিয়া-সলফের শহিত তুলনীয়। ক্লোরোসিদ্ রোগে ক্যাল্ক-ফদের পুর্বের বা পরে; অর্শে ক্যাত্ম-ফ্রোরসহ, ডায়াবিটিস অর্থাৎ বহুমুত্তে নেট্রাম-সলফের সহিত ; কর্ণের রোগে ও প্রতিশায়জনিত বধিরতায় ক্যালেণ্ডুলা ও হাইড়াষ্টিসের সহিত ; এবং শির:পীড়ায় ইহার পর নেট্রাম-ফলে व्यत्नक भगग्रहे ऋक्त प्रभीहिन्ना थाटक

क्रानी भिडेतिरशंिकम्।

Kuli Muriaticum.

ইগা অপর নাম কোরাইড অব্পটাশ। সংক্ষিপ্ত নাম ক্যালী-মিউর।
অন্থি ভিন্ন, শ্রীরের আর সর্ব্বভই ইহা বর্ত্তমান আছে ও সর্ব্বভই এই
পদার্থের প্রয়োজন : আওলালিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ইহা
দেহস্থ ফাইব্রিণ নামক পদার্থ (প্রাণী ও উদ্বিদ দেহের ভন্তময় উপাদান)
উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই পদার্থ ব্যতীত নৃতন ব্রেইন-দেল
(brain cell) উৎপন্ন হইতে পারে না। রক্তের অণুকোয়, মাংশ পেশী,
য়ায়ু এবং মস্তিক্ষের অণুকোষ এবং অস্তঃকৌষিক বিধানে (intercellular tissue) ইহার বিভ্যমানতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহে ইহার ক্রিয়া
অনেকটা সোডিয়ম ক্লোরাইডের অমুরূপ। রক্তে একমাত্র নেট্রাম-মিউর
ব্যতীত অন্তান্ত লাবনিক পদার্থ অপেক্ষা ইহার পরিমাণ অধিক।

যদি কোন প্রকার উপদাহ (ইরিটেশন) বশতঃ উপত্তকের অনুকোষ্
হইতে কালী-মিউর (প্রাশিয়ম ক্লোরাইড) নামক পদার্থের
কিরদংশ অলিত বা চ্যুত হয়, তবে শ্রেত বা প্রেতাই-পুসর বর্ণ
বিশিষ্ট ফাইব্রিণ ত্বকপথে নির্নাত হইয়া যায়। ইহা তক হইলেই এক
প্রকার কোমল উদ্ভেদরূপে (mealy cruption) প্রকাশিত হয়।
যদি প্রদাহ আরও গভীরতর প্রদেশ পর্যান্ত ছড়াইয়া পড়ে, তবে ফাইব্রিণ
ও 'সিরম" (মস্তু, রক্তের জলবৎঅংশ, রসানি) উভয়ই নিঃস্তৃত
হইয়া থাকে এবং প্রদাহিত অংশ ফোদ্ধার আকার ধারণ করে।
এই ফোদ্ধা দেখিতে অনেকটা বসন্ত, গোবসন্ত বা টিকার ফোদ্ধার আয়
(vaccine disease); ত্বকের্সায় এপিথিলিয়েল অর্থাৎ ঔপত্তকিক
বিধানেও পুর্ফোক্তরূপ অবস্থা জ্মিতে পারে। এইরূপ অবস্থান্ধ

যদি শীঘ্র শীঘ্র রোগীকে কালী-মিউর দেওরা যায়, তবে শীঘ্রই ইহার ফলে নিঃস্ত রঙ্গ আশোষিত হয় এবং ত্বক বা উপত্বক স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

धरे कार्रेजिन तरक यर्थक्षेत्ररम विश्वमान बार्छ। तरक यर्थक्षेत्रम কোরাইড অব পটাশ বা ক্যালী-মিউর বর্তমান আছে বলিয়াই ফাইবিণ নামক পদার্থ উৎপন্নও কার্য্যকারী হইয়া থাকে। রক্তে এই পদার্থের অভাব হইলে এই ফাইব্রিণ নামক পদার্থ রক্তন্তোত হইতে বাহির হইয়া ঘাইতে চেষ্টা করে বা স্থানবিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকে। রক্তন্ত ফাইব্রিণের উপর পোটাসিয়ম ক্লোরাইডের বিশেষ প্রভাব আছে। এজন্ম, ইহার (পটাশ ক্লোরাইড) স্বর্মতা ঘটিলে ব্যবহারকারীর অভাবে রক্তস্থ ফাইব্রিণ শরীরে নানারপ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে এবং প্রকৃতির সাহায্যে পেছ হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করে। এই 'ফাইব্রিণ শ্রীরের বিভিন্ন পথে বাহির হইলে বিভিন্ন রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা, নাস-পথে বাহির হইলে সন্দি, ফুসফুস-পথে বাহির হইলে কাসি; ফুসফুস্ পথে নির্গমন কালে ফুসফুস বিধান বিশেষরূপে প্রদাহিত ও ক্ষাত হইয়া উঠিলে ডাক্তারেরা উহার নিউমোনিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। সকল প্রকার প্রাদাহিক পীড়ারই ক্ষরিত নিঃস্রবে (exudation) ইহার বিভ্যমানত। প্রত্যক্ষ করা যায়। প্লুরিসি ও পেরিটোনাইটিস রোগে ফুসফুসাবরণ (plura) ও অস্ত্রাবরণ (peritoneum) ছয়ের মধ্যভাগে এবং ক্রুপ, ডিফ্থিরিয়া, সন্দি প্রভৃতি রোগে তত্ত্ব স্থানের নৈত্মিক ঝিল্লীতে এই ফাইব্রিণ শ্লেমার সহিত সঞ্চিত দৃষ্ট হয়।

আময়িক প্রয়োগ।

ভিহ্না ও টন্সিলে খেতবর্ণের লেপ ইহার অভাব জ্ঞাপক বিশেষ লক্ষণ। রক্তে খ্যালীমিউরের অভাব নিবন্ধন ফাইব্রিণ কার্য্যকারীর

অভাবে নিজ্রিয় হইয়া সঞ্চিত থাকে। জিহ্বা, টন্সিল বা শরীরের অপর শৈষ্মিক ঝিল্লীর **খেতলেপ এই** ফাইব্রিণ ব্যতীত আর কিছুই কোনও নহে। সকল প্রকার গ্রন্থির কোমল স্ফীততা, প্রদাহিত স্থানের রসসঞ্চর-জনিত স্টাততা এবং যে সকল শৈশ্মিক ঝিল্লীর প্রাবে ক্ষরিত পদার্থের খেতবর্ণ, স্থত্তবৎ পদার্থ বিশিষ্ট ও আঁটাল অর্থাৎ চট্চটে প্রকৃতি থাকে, তাহাতেই ইহা পরম উপকারী। এজন্ত সর্দি, প্রমেহ, শেতপ্রদর, বাত হাম, বসস্ত, বার্গী, অগ্নিদাহ, ইরিসিপেলাস. প্লীহা-যক্তৎ ও টব্দিলের বিবৃদ্ধি প্লেগ, কর্ণমূল স্ফীতি, স্তন-প্রদাহ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগে লক্ষণের সাদৃখ্যে উপকারিতায় সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্বাহকার প্রদাহেরই দ্বিতীয়াবস্থায় যথন একজুডেশন অর্থাৎ রস নির্গত বা সঞ্চিত হইতে থাকে ও উল্লিখিত প্রকারের প্রাব দেখা যায় তথনই ইহা স্থব্যবস্থেয়। যদি কালী মিউর প্রয়োগের ফলে ফাইব্রিণ আনোষণের পরও লিউকোসাইট (রক্তের খেতকণা) অবশেষ থাকে তবে তথন নেট্রাম-ফস প্রয়োগ করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য জন্মে। ক্রুপ, ডিফথিরিয়া, রক্তামাশয় ক্রুপংস নিউমোনিয়া, সান্তর বিধানের অন্তর্কার্ত্তী (fibrinous exudation in the interstitial connective tissue) তান্তব রসক্ষরণ, লসিকাগ্রন্থির স্ফীততা (lymphatic enlargement), প্রাদাহের পরবর্তী বৈধানিক ফীততা (infiltrated inflamation), খারাপ বীজে টীকা দেওয়ার ফলে চর্ম্মে নানা প্রকার উদ্ভেদের প্রকাশ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগে আশ্চর্য্য উপকার দেখা যায়। হাম ও বসন্ত রোগের ইহা আমোঘ ঔষধ। বসন্তের প্রাত্তর্ভাবকালে প্রতিষেধকরূপে প্রত্যহ ৩× ক্রম ব্যবহার করিলে উহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। টিকা লইবার পুর্বেব বাপরে ইহা সেবন করিলে টিকা উঠে না। হাম রোগে বা হাম বসিয়া গিয়া গুরুতর লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেও ইছা ফলপ্রদ। ইছা প্রয়োগে বিলুপ্ত হাম

পুন: প্রকাশিত হইয়া থাকে। জিহ্বায় খেত বা ধ্সর (gray) বর্ণের লেপ, নি:স্ত আবের (exudation) খেত বা ধ্সর বর্ণ; গ্রন্থির কোমল ক্ষীততা; শ্রৈমিক ঝিলী হইতে গাঢ় সাদা আঠাল বা আঁশ আঁশ (সৌত্রিক) পদার্থ যুক্ত নিষ্ঠীবন বা শ্রেমা কালী-মিউর প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। চর্ম্বরোগে ত্বক হইতে ময়দার ভায় পদার্থ ক্ষরিত হইলে ও ইহা ব্যবহার্য্য। যক্তেরে নিজ্জিয়তায়ও ইহা ফলোপধায়ক কর্ণ রোগেও প্রদাহের দিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। উপদংশ (সিফিলিস্) ও প্রমেহ রোগের ইহা প্রধান ঔষধ।

विर्मिष विरम्य लक्ष्ण।

হাল।—রোগী ভাবে তাহাকে উপবাস থাকিতেই হইবে।

আন্তর্ক ।—শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা সহকারে শিরংপীড়া; গুল্র শ্লেমা বমম অথবা গাঢ় শ্বেতবর্গ শ্লেমা থক্ থক্ করিয়া কাসিয়া তোলা। যক্তের ক্রিয়ার বৈষম্য নিবন্ধন (পিত্রের অভাব জনিত) শিরংপীড়া ও তংসহ কোষ্ঠকাঠিত। মস্তিদ্ধ-বিল্লীর প্রদাহ (মিনিঞ্জাইটিস)। খুসকী; শিশুর মন্তকের পামা (crusta lactea).

চিক্র ।—চক্র সকল প্রকার রোগেই খেতবর্ণ গাঢ় শ্লেমা-প্রাব লকণে ইহা ব্যবহার্যা (প্রাবের পীতাভ সব্ধবর্ণ থাকিলে কালী সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে)। কিরেটাইটিস; চকুর কত; চক্রের পাতার ক্র্ কুর্ পৃষ বিন্দু বা পীতবর্ণ মামড়ি (কালী সলফ)। ত্রণ হইতে উৎপন্ন চেপ্টা অগভীর কত। দানার স্থায় উদ্ভেদ বা পীড়কা বিশিষ্ট অকিপ্ট (চকুর পাতা), তৎসহ চক্ষে বাসুকণা বিশ্বমানতার স্থায় অন্তব (পর্যায়ক্রমে—ফিরফ্স); রেটিনার প্রদাহ। কর্ণিয়ার ফোস্কা। তারকামগুল প্রদাহ। ছানি (ক্যান্ধ-ফ্লোরের পরে)। অক্ষিত্রণ (হাই

পোপিয়ন); চক্ষুউঠা। ট্রকোমা; রেটিনাইটিন (আব ক্ষরিত হইলে)।

ক্রপ্রা—গ্রন্থির ক্ষাত্তা এবং খ্রেত বা ধ্নরবর্গ লেপারত জিহবা
নহকারে কর্ণ বেদনা। আলজিহবার এবং ইটেকিয়ান টিইবের ক্ষাত্তা
নহকারে কর্ণশূল (ফির-ফন)। মধ্যকর্ণের প্রাতিগ্রায়িক অবস্থা (ফির-ফন); মধ্যকর্ণের ক্ষাত্তা বশতঃ বধিরতা নাসিকায় ফুৎকার
করিলে বা ঢোক গিলিবার কালে কর্ণে চড় চড় বা চিড় চিড় শব্দ।
ইটেকিয়ান টিইবের বা কর্ণপটের ক্ষাত্তা জনিত বধিরতা। গলরোগ
বা মধ্যকর্ণের রোগ নিবন্ধন ক্রতিক্ষাণতা; কর্ণ হইতে দানা দানা নরম
ধুসরবর্ণ গাঢ় খেতবর্ণ প্রস্রাব। কর্ণের চঙুদ্দিকস্থ গ্রন্থির ক্ষাত্তা,
কর্ণনাদ; কর্ণে পট্পট্ চড় চড় শব্দ (ফিরফন । বাহ্যকর্ণের ক্ষাত্তা,
কর্ণনাদ; কর্ণে পট্পট্ চড় চড় শব্দ (ফিরফন । বাহ্যকর্ণের ক্ষাত্তা,
কর্ণনাদ; কর্ণে পট্পট্ চড় চড় শব্দ (ফিরফন । ইটেকিয়ান টিউবের
অবকদ্ধতা। (কতিপয় মাত্রা ব্যবহারেই ফল পাণ্যা যায়)। টিম্পেনিক
মেন্থে ণের কুঞ্জিততা। কর্ণমূল গ্রন্থির ক্ষাত্তা। কর্ণে পট্ পট্
বা অস্ত প্রকারের শব্দ। কর্ণাভ্যন্তরে অত্যধিক মাংসান্ধ্রের উৎপত্তি।

নাসিকা—নাসাপথের অবরুদ্ধকর প্রতিশ্রায় সহ শ্বেত শ্রেমা নিঃসর্ব এবং তৎসহকারে জিহ্বায় খেত বা ধুসর বর্ণের লেপ। প্রতিশ্রায় সহকারে অস্বচ্ছ শ্বেত্বর্ণ শ্লেসাম্রাব। মন্তকের শুল প্রতিশ্রায় সহকারে নাসাবরোধ। অপরাহে নাসিকা হইতে রক্তপাত।

মুখাম গুলা।—গালের বেদনা সংযুক্ত স্ফীততা (ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে) গাল বা মাজির স্ফীততা বশতঃ মুখমগুলের বেদনা।

সুখ্য স্থান - ওষ্ঠ বা মুখের ঘা। গ্রন্থির অথবা মাড়ির স্ট্রন্তিতা।
শিশু বা স্তন্ত্র দাদিবীদিগের মুখের খেতবর্ণ ক্ষত ; খেত লেপারত
জিহ্বা; প্রচুর দাদাস্রাব। মাড়ির ও গ্রীবাগ্রন্থির স্ফ্রীততা।

ক্ত ।— মাড়ির বা গালের স্বীততা সহকারে দস্ত বেদনা। এই ঔষধ শরীরস্থ অসার (উৎপাদন শক্তিহান) পদার্থ নিঃসারণে সহায়তা করে। মাড়ির স্ফোটকে পুয উৎপন্ন হইবার পুর্বেষ্ব ফির-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য (সিলিশিয়া)।

জ্বো।—জিহ্বার শুদ্ধ, আঠা, আঠা খেত বা ধ্বরাত খেতবর্ণের নেপ। জিহ্বার প্রদাহ ও স্ফীততা (ফির-ফন)। ম্যাপেরভার চিত্রিত জিহ্বা।

পাল্স-আন্ত্য।—শ্বেত অথবা ধুসরাভ খেতবর্ণ বিশিষ্ট গল-ক্ষত। খেত বা ধুসরবর্ণ জিহবা। আলজিহ্বার প্রদাহ ও স্ফীততা। তালুমূল প্রদাহ (তরুণ বা পুরাতন)। স্ফীততা জিন্মবামাত্রই ইহা ব্যবহার করিতে হয়। ডিফথিবিয়ার (ঝিল্লীব প্রদাহ) প্রায় সকল রে।গীব পক্ষেই ইহা একমাত্র ঔষধ (ফির-ফদেব সহিত পর্যায়ক্রমে)। ডিফ্থি-রিয়ার এবং প্রায় সকল প্রকার গলরোগেই ইহার বাহ্য প্রয়োগও বিশেষ উপকারী (২× বা ৩× ক্রমের ১০০০ গ্রেণ এক গ্লাস জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাতে এক খন্ত নেকঙা ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ)। স্বর-নাশ ও কর্ণ-মূল ফীভিতে (মঃম্পস) ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে; প্রচুর লালাম্রাব বা অঞ্চের স্ফীততা থাকিলে ভাট-মিউরের সহিত পর্যায়প্রমে। ফ্যারিঞ্জাইটিস (গলকোষ প্রদাহ); গলার শ্টীততা সহ স্ফীতস্থান হইতে শ্বেত বা ধুসরাভ শ্বেতবর্ণের শ্লেমা ।নঃসরণ। গলগ্রন্থির প্রদাহ ইহা দারা প্রায়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। কাসিতে কাসিতে হর্গন্ধ ছানার স্থায় কুদ্র টুকড়া উত্থিত হয়। গিলিতে বেদনা বোধ হয়। উপদংশজনিত গলক্ষত। টকিলাইটিসে স্ফীতভা দৃষ্ঠ হইবামাত্র ইহা ব্যবহার্যা। টন্সিলের এত অধিক ক্ষীততাধে.

ভজ্জন্ত খাস-প্রখাসে প্রায় অসমর্থতা। ফ্যারিংসের উপর মামড়ির উৎপত্তি (০× বা ৬ × ক্রমের বিচূর্ণ অভিশয় ফলপ্রদ)।

আকাশালা ।— মক্তের ক্রিয়ার বৈষম্য হচক জিহ্বায় ধ্সর
বা খেত লেপ সহকারে ক্র্ধামাল্য। জিহ্বার পূর্বে।জ লেপ
সহকারে অগ্নিমাল্য এবং তৎসহ দক্ষিণ কণ্ঠান্থির (ক্রেডিকেল) নিম্নে
প্রেবল বেদনা; চক্রু বৃহত্তর এবং প্রশাস্তিত বা বা বহির্গত হইয়াছে বলিয়া
বোধ হয়। চর্কিব বা বসাসংযুক্ত দ্রব্য সহ্য হয় না। চর্কির স্থায়
গন্ধ বিশিষ্ট বাতোলগার। পিষ্টক ও লুচি কচুরি প্রভৃতি বসাসংযুক্ত
দ্রব্য আহার করিলে আমাশয়ের জালা ও বেদনা; অপাক। বসাময়,
খেতবর্ণ, অস্বচ্ছ শ্লেমা বমন। খেত লেপার্ত জিহ্বা সহকারে
আমাশয়ের প্রদাহ। উষ্ণ পানীয় গ্রহণের পর এই রোগ জনিলে
অনতিবিলম্বে এই উষ্ধ প্রয়োগ করা একাম্ব কর্ত্ব্য (ফির্ফস)।
যক্রতের ক্রিয়ার বৈষম্য সহকারে উদ্বাধ্যান; কোন্ঠবদ্ধ সহকারে
আমাশয়ের বেদনা এবং গাঢ় খেতবর্ণ শ্লেমা বমন (বা কাসিয়া তুলিয়া
ফোনা)। মলিন সংযুক্ত রক্তব্মন। মুথে তিক্তস্বাদ সহগ্রদ্ম্য কোন্ঠকাঠিতা। প্রব্যাক্ত লক্ষণ সহ কামলা (জঙিস)।

ভিদ্রে এবং মলা । – পিত্রশ্বের অপ্রচুরতাস্চক মলের মলিনপীত (ফেঁকাশে), গিরিমাটির স্থায় বা কর্দ্মবং বর্ণ ও তৎসহ জ্ঞিস। যক্ত-প্রদেশে বা দক্ষিণ স্বন্ধান্থির নিয়ে বেদনা। যক্তের ক্রিয়ার বৈষম্য সহকারে ক্রেষ্টকাঠিত, খেত লেপার্ড জিহ্বা এবং প্রলম্বিত (বহিরাগত) অক্ষিগোলক। পাঞ্ (কামলা) রোগে খেত লেপার্ড জিহ্বা ও ফেঁকাশে বর্ণ বিশিষ্ট মল। টাইফয়েড জ্বরে খেত লেপার্ড জিহ্বা এবং পাতলা মল্মাব, অপ্রগাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট মল; উদ্বের স্ফীততা ও স্পর্শামুভবতা। কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত টাইফঃস ফিবার।

ক্ষেনাশে পীত বা কর্দম বর্ণ মলবিশিষ্ঠ অতিসার; উদরের দ্বীততা;
শেওলা শেওলা বা আঠা আঠা মল; বসাময় দ্রব্য ভক্ষণের পর অতিসার।
শেওলা শেওলা বা আঠা আঠা প্রময় মল ও উদর বেদনাসংযুক্ত রক্তাতিসার;
পুনঃ পুনঃ মল-বেগ। মলত্যাগকালে অতিশয় বেগ দিতে হয়, এজন্ত
মলদারে অতিশয় বেদনা জন্ম। রক্তাতিসারে এই ঔষধ ফিরম-ফনের
সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে (ম্যাগ-ফনের
সহিত তুলনা করুন)। মলিন, গাঢ়, রক্তশ্রানী অর্শ।

সূত্র হাক্স—খেত, গাঢ় আঠা আঠা শ্লেমাপ্রাবী তরুণ মুত্রাশর প্রদাহ (সিষ্টাইটিস)। এই রোগের বিতীয়াবস্থায় এবং পুরাতনাবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী। মলিন ও ইউরিক এসিড সংযুক্ত মূত্র। বৃক্ক প্রদাহের বিতীয়াবস্থা (প্রথমাবস্থায় ফিরফস)।

পূৎজ্বি বিশেষ ফলপ্রদ। ৩মার এবং অও প্রদাহের ইহা প্রধান

এবং প্রায়ই অমোঘ ঔষধ। প্রমেহ-প্রাবের বিলুপ্তি বশতঃ অত্তের
প্রদাহ ও ক্ষাত্তা। বাগার কোমল ক্ষাত্তা, পুরাতন উপদংশ এবং
তৎসহ শ্বেতবর্ণ প্রাব। শ্বেত বা ধুসর লেপার্ড জিহ্বা। কোমল
আদিম উপদংশজ ক্ষত। ৩× ক্রমের চুর্ণ আভ্যন্তরিক এবং স্থানিক
প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রেক্তিল ক্রিক্ত্র— হথের ন্থায় খেতবর্ণ, গাঢ় ও অপ্রাদাহিক লেগা প্রাবী খেতপ্রদর। প্রাব জন্ম জরায়ুমুখে ও জরায়ুগ্রীবার ক্ষত। এই ঔষধের স্থানিক প্রয়োগও উপকারী। বিলুপ্ত, বিলম্বিত বা শীঘ্র প্রত্যাগত ঋতু। মলিন, সংযত, কঠিন, ও প্রভূত রক্তপ্রাবী ঋতু, জরায়ুতে রক্তপঞ্জয় (বিভীয় বা প্রাতনাবস্থা), শীঘ্র শীঘ্র ঋতু প্রত্যাগত হয় (ক্যান্ত-ফ্স)। দীর্ঘকালস্থায়ী ঋতু (কালীফ্স);এই সকল রোগীর জিহ্বার বর্ণ দেখা নিতাস্তই প্রয়োজনীয়।

প্রস্থিত।—গভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও খেত শ্লেমা বমন সহকারে খেত লেপারত জিহবা। স্তন-প্রদাহ (পূয সঞ্চয়ের পূর্বেই); স্তিকাজরের প্রারম্ভাবস্থার (ফিরফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে) ইহা একটী স্ল্যবান ঔষধা উন্মন্ততা, মস্তিফ বিক্রতি ইত্যাদি। স্থন-প্রদাহে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র শ্লীততা বিলীন হইয়া যায়।

শ্বাচন হালের প্রদাহের দিতীয়াবস্থা। গাঢ় চন্ছেলা, থেত বা গ্রের স্থায় নিষ্ঠীবন; পূর্বোক্ত লক্ষণ সংযুক্ত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ক্ষমকাস। উচ্চ, সশন্দ, আমাশর হইতে উত্থিত, নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস। এই প্রকার রোগীর জিহ্বার শ্বেত লেপার্ততা ও চক্ষ্র প্রলম্বিততা। হুপিংকাসের স্থার হ্রম্ম, আক্ষেপিক কাস (ফির-ফস)। ক্রুপ কাসের স্থায় স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাস; ক্রুপ রোগের ইহা প্রধান ঔষধ (ফিরফস)। নিউমোনিয়া; প্র্রিসি (জিহ্বার বর্ণ দ্রন্থর) শ্বেত লেপারত জিহ্বা ও শ্বেত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট শ্বাস কাস। স্বর-নাশ; শৈত্য জনিত স্বরভঙ্গ (কালী-সল); হুপিংকাফ। কাসিবার সময় শিশুর গলাম হন্তপ্রদান। হুপিংকাসে ফির-ফসের সহিত পর্যায় ক্রমে ব্যবহার করিলে চমংকার ফল দর্শে।

ব্রক্ত সঞ্চলন হাস্ত্র—হদপিণ্ডের দপ দপ। হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে রক্তের সংযত হইবার প্রবণতা বা আশঙ্কা। পেরিকার্ডাইটিসের বিতীয়াবস্থায় হৃৎপিণ্ডে অভ্যধিক রক্ত সংপ্রবেশ জন্ম দপ দপ ও স্থবুদ্ধি

পুষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যক্ত্র-খেত দেপারত জিহ্বা সহ
শরীরের যে কোন স্থানের স্ফীততা সংযুক্ত আমবাতিক বেদনা।
সঞ্চলন কালে অমুভূত হয় অথবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এরূপ আমবাতিক
বেদনা (ফিরফস)। পুরাতন বাতের বেদনা, সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি। বাত

শহকারে অর ও সন্ধির ক্ষীততা। ক্ষীততার কাঠিতো ক্যাল্ক-ফ্লোর সহ পর্যায়ক্রমে। পদের প্রাতন ক্ষীততা, উরুসন্ধির ক্ষীততার পৃষ জন্মবার পূর্বে; হস্তপদের শীতক্ষোট। গ্রীবাগ্রন্থির ক্ষীততা। গ্রন্থির আমবাতিক ক্ষীততা। রাত্রিকালে ও শ্যার উষ্ণতায় বাতের বেদনার বৃদ্ধি। কটি হইতে পা পর্যান্ত বিদ্যাতের আয় বেদনা; এজ্ঞ উঠিয়া বিদ্যার আবশুকতা। লিখিবার কালে হল্ডের স্তন্ধতা (Stiffness); পদ এবং পদতলের পুরাতন ক্ষীততা ও চুলকানি। হস্ত-পৃষ্ঠের কণ্ডড়ার কড় কড় শন্দ। হস্ত, পদ বা যে কোন স্থানে নীহার-ক্ষোটক (চিল্রেন)।

প্রাম্থা প্রকাশ কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম বিশ্বপ্ত হটবার পর মৃগীরোগের কর্ম প্র মৃগীরোগের কর্ম পর মৃগীরোগ ; মেরুরজ্জুর কর ।

ত্রক।—সর্বপ্রকার চর্মরোগে উদ্ভেদ গুলির ভিতর হইতে খেতবর্ণ পদার্থ ক্ষরিত হইলে অথবা চর্ম হইতে ময়নার আয় গুড়ি গুড়ি পদার্থ অথবা খেতবর্ণ শব্দ বাহির হইলে ইহা উপযোগী। মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ার বৈষম্য বশতঃ পামা (জিহ্বার বর্ণ ক্রন্টব্য)। ফোফাকার বিদর্শে (ইরিসিপেলাস) ইহা প্রধান ঔষধ (অর থাকিলে ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে)। ফোটক, বিস্ফোটক (কার্কাঙ্কল) প্রভৃতি রোগে পূ্যোৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে; রোগের দিতীয়াবস্থায়; হার্পিজ (আট-মিউ) ছাম ও হামের লোপজনিত অন্থথ। স্থালেট ফিবার। সাইকোসিসের প্রধান ঔষধ। বয়সফোড়া বিথাউল প্রভৃতি চর্মরোগের উদ্ভেদের অভ্যস্তর হইতে গাড়। খেতবর্ণ পদার্থ নিঃস্তে হইলে। ক্লেংরোধের ফলে একজিমা। ফুর্দন্য একজিনা অর্থাৎ বিথাউজ রোগে ইহার ফলবন্ধা পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে। ফোলা অথবা যে কোনও প্রকারের পোড়া ঘারে ইহা সবিশেষ উপযোগী। দর্ম ক্ষতে ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে। অভিশন্ন উত্র প্রফুতির দর্ম ক্ষতে ৩× ক্রমের বিচুর্গ বাহ্য প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ আলা যন্ত্রণা দ্র হয়। ইরিসিপেলাসের ইহা প্রধান ঔষধ। দক্র, শিক্ষেল্স (কটিবন্ধের স্থায় দক্র), রুক (লুপঃস) হাম ও তৎসহ স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাসি ও গ্রন্থির ক্ষাত্রতা অথবা এই সকল চর্মারোগের কুফলে ইহা অতি উৎক্রন্ত ঔষধ। মুখমগুলে ও গলায় ঘামাচির স্থায়কুদ্র কুলে উদ্বেদ (pimples)। ব্রন্থ রোগের ইহা প্রধান ও অব্যর্থ ঔষধ প্রথম হইতেই ফিরম-ফ্রন্স সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে গুটি গুলি নিয়্মিতরূপে প্রকাশিত হয়। সাইকোসিসের প্রধান ঔষধ। কুণী; হত্তে আঁচিল।

ক্তর্ন্ত্র — শরীরের যে কোন ও যয়ের (বা অংশের) প্রদাহের দিনীরা বহার। টাইফয়েড জরে, আক্রান্ত বিধানের বিশুদ্ধতা উৎপাদনার্থ। মার্লেট ফিলারে ফির-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ও উহার প্রতিযেধার্থ। টাইফস ফিবারের কোর্চবদ্ধতায় এবং স্থতিকা ত্ররের প্রারম্ভাবস্থায় (ফর-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে) ইহা একটি উৎরুষ্ট ঔষধ (কালী-ফস)। আমবাতিক জরে রুস অশোষণার্থ; সকল প্রকার জরে ব্সরাভন্মেত, শুদ্ধ অথবা আঠা জিহ্বা লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য। সবিরাম জরে এই ঔবধের অন্তান্ত লক্ষণ বিশ্বমান থাকিলে। প্রাতিশ্রাম্মিক জরে অত্যক্ত শীতামুত্রব, একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই অত্যক্ত শীত বোধ, এজক্ত অগ্নির চুল্লীর নিকট বসিবার প্রয়োজন। বিছানায় গা ঢাকিয়া বসিলে উপশ্ম বোধ।

ব্দিদ্রো।—যংসামার শব্দেই চমকিত ১ইরা উঠা। অস্থির নিদ্রা। অভিশন্ত নিদ্রালুতা।

ত্রী ত্রা ।—রক্তায়তাসহ চন্মরোগ বিশ্বমান থাকিলে উপযুক্ত ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ইণা ব্যবহার করা কর্ত্রা। সর্বপ্রকার পোড়াঘারে আভামারক ও স্থানিক প্রধাগ বিশেষ উপকারী। যে কোন ও রোগেই বিধান হঠাত গাছ স্থেত মাঠা আলা ফাবত হঠলে ছিলা না করিলা ইলা ব্যবহার করিবে। লাম ও বসন্ত রোগের ইলা সর্বপ্রধান ঔষণ। জুফিউলা জনিত গ্রন্থির স্ফীতভায় ও স্কঃভি সোগের ইলা প্রধান ঔষণ। চর্বি অথবা অধিক মসলা সংযুক্ত দ্রবা ভক্ষণে পেটের অন্থ্রের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি এবং স্কুলনে বেদনার হৃদ্ধি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। ক্ষতে মাংসায়ুরের উৎপত্তি। খারাপ বীজে টাকা দেওলার ফলে কোন ও অন্তর্গের উৎপত্তি। খারাপ বীজে টাকা দেওলার ফলে কোন ও অন্তর্গের উৎপত্তি। খারাপ বীজে টাকা

উপাচ্ছা ও উপাশ্ব ।— ঘুতাদি বসাময় জিনিষ অথবা লুচি কচুমী ও পিইকাদি অথবা অপর কোনও প্রকার গুরুপাক প্রবাদি ভোজনের ফলে উৎপন্ধ বা বৃদ্ধি। আমবাত ও সর্কপ্রকার বেদনার সঞ্চলনে বৃদ্ধি। এণ্টিস্তুফিউলাস, এন্টিসাইকোটক ও এন্টিসিফিলিটিক এই তিবিধ মন্তর লক্ষণ ও মন্ত্রগতি বিশিষ্ট ধাতু-দোবের ইথা একটা মন্তর ক্রিয়াশীল ঔষধ। (It is a sulggish remedy for the sluggish symptoms and sluggish constitutions, being antiscrofulous, antisycotic, and syphilitic)

ক্রেন্তা — এই ঔষধের ৩×, ৬× ও ১২× সাধারণতঃ ব্যবস্থত হইয়া থাকে। ডিফথিরিয়া রোগে ৩× ক্রমের বিচূর্ণ ১০ ১৫ গ্রেণ্ এক গ্রাস উষ্ণ ক্রমে ক্রিয়া ক্রমের করিলে বিশেষ উপকার হয় (এতং সহ এই ঔষধ আভাস্তরিক প্রতি আর্দ্ধ বা) এক ঘণ্টাম্বর গরম জলে গুলিয়া সেব্য)। পোড়াঘা, স্ফোটক, কার্মস্কল, আঁচিল ও অক্তান্ত প্রকার চর্মরোগেও ইহার বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই সব স্থলে জলে গুলিয়া লিন্ট বা নেকড়াথও ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ করিতে হয়।

স্কু হা — সর্বপ্রকার প্রদাহের দিতীয়াবন্ধার যথন একজুডেশন অর্থাৎ রসক্ষরণ আরম্ভ হয়, তথন ব্রাই, মার্ক, এপিস, থুজা, স্পাঞ্জিয়া, আইওডিন, পলসেটিলা, রসটক্স সলফার ও কালী-কার্ম প্রভৃতির সহিত তুলনীয়। ফাইটোলাকা, স্থাজুইনেরিয়া, ষ্টিলিঞ্জিয়া, পাইনংস, এসক্ষেপ, এইলাছ, এনিস, টেল, হেমে-ভার্জ্জ, সিমিসি ও বার্মেরিস এই কয়টী ঔষধ বিশ্লোবণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কালী-মিউর বিশ্লমান আছে। এবং এই সকল ঔষধের অধিকাংশ লক্ষণের সহিতই কালী-মিউরের লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্রও আছে। ভবিষ্যতে যথন সমগ্র প্রাণীঞ্জ ও উদ্ভিল্গ ঔষধগুলির এই প্রকার বিশ্লেষণ হইবে তথন সেই সকল ঔষধের আংশিক লক্ষণের সহিত এইসব (বাইওকেমিক) ঔষধের লক্ষণের তুলনা চলিবে। ইটেকিয়ান টিউবের পীড়ায় মার্কসলের সহিত তুলনীয়। উপদংশ ক্লোগে ইহার পর কালী-সলফ ও দিলি ব্যবহার্য্য। লুপংস অর্থাৎ বৃক রোগে ক্যান্থকসের সহিত তুলনীয়।

হোমিওপ্যাথিক মতে গভীরমূল ঔষধ বলিয়া সলফার যেরপে বছ প্রকার বিষদোষ দেহ হইতে নিষ্ক্রাস্ত করিবার নিমিত্ত ও অন্তর্ক্তী ঔষধ রূপে মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে স্পলারের আবিদ্ধৃত বাইওকেমিক শাস্ত্রমতে কালী-মিউরও সেই স্থানটী অধিকার করিয়াছে। যথন উপযুক্ত কোনও ঐষধ ব্যবস্থা করিবার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না, তথন এই শুষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে এমন লক্ষণ সকল প্রকাশিত চইয়য়া
গড়ে যে, তাহা দৃষ্টে একটা ক্ষুদ্র ঔষধ ব্যবস্থের হইতে পারে।
কালী-মিউরের পর প্রায়ই ক্যাল্ক-সলফ প্রয়োজিত হইয়া থাকে ও
তথন ইহা উহার অনুপ্রক ঔষধরূপে কার্যাকরিয়া থাকে। প্রদাহে
যথন উপত্তের গভীরতর অংশ আক্রান্ত হইয়া থাকে, তথন নেটাম
মিউরের পরিবর্তে ইহা ব্যবস্থেয়।

আমাশরাদ্রের (gastro-intestinal) প্রবল উপদাহ বলতঃ যখন ক্ষত গ্যাংগ্রিণের আকার ধারণ করে তথপ কালী-মিউর অপেক্ষা কালী ক্লোর অধিকতর উপযোগী। একথি (মুখক্ষত) রক্তামাশর ও এপিণে লোমা অর্থাৎ ঔপস্থাকিক টিউমারে কালী-ক্লোবের সহিত তুলনীর

কালী-ফসফরিকম!

Kali Phosphoricum

ইহার অপর নাম ফফেট্ অব্পটাল। সংক্ষিপ্ত নাম কালী-ফ্স।
আন্তবলরীরের প্রান্ধ সর্বতেই, বিশেষতঃ মস্তিক্ষের "গ্রেমাটার", স্বান্ধ
এবং ম'ংল পেলীতে এই পদার্থ বহুলরূপে পরিদৃষ্ঠ হইরা থাকে। যে
সকল পদার্থের সাহাযো টিশু সকল নির্মিত হইরা থাকে ভাহাতে এবং
সর্বপ্রকার পৃষ্টিকর তরল বিধানেই এই জিনিব বর্ত্তমান আছে।
অতএব অমুমান করা হয় যে, টিশু সংগঠনের পক্ষে ইহা অপরিহ্র্যা।

অওলালের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা মন্তিক্ষের 'গ্রে-ম্যাটার' (grey-matter) নামক পদার্থ প্রস্তুত করে। গ্রে-ম্যাটারের মধ্যে

আরও কতিপয় জান্তব ও লাবণিক পদার্থের বিগুমানতা পরিল ক্ষিত হইয়া थारक वरते, किन्न कानी-कप्तरे উद्दात मरधा मुक्त श्रधान । कीवनी मिक्त সংবক্ষণ ও সহদ্ধিনার্থে শরীরে আরে যে যে পদার্থের প্রয়োজন, এই কালী-২-দের সাহায়েই ভাহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, জীবনী: শক্তি সংৰক্ষণে যে উপাদাদের প্রয়োজন ত্রাধ্যে এই কণ্ডেট অব গটাশ্র স্কাপ্রধান। মন্তিক্ষে এই পদার্থের অভাব বা স্বল্পতা ঘটিলেই लाना शकाव भाषावक नक्षण छेरला इहेशा श्राटक। मिखरकर य कामछ ্শকার সকল প্রকার। বিক্লতির ইতা সক্ষপ্রধান ঔষধ। গ্রে-ম্যাটারের শ্রুত ক্ষর নিএরন বাহার। সাধাবক দৌকাল্য বা অপর কোনও সাংঘাতিক বোগাক্রান্ত (যেমন কলেরা প্রভৃতি) হইরাছেন, ভাহারা ইহা বাব্হার মাত্র ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বুদ ও লায়বিক বেংক্ষাগ্রন্থ পিলের কাল্-ফ্স ৩২ ট্যাবলেট সর্বাদা সঙ্গে রাখা একান্ত কত্র্য। ভাহ। হটলে জগৎ হটতে বহু বেশি ভোগের ত্রেস্ব ২ছবে। মডিদ্ধের অভিচালনা বা আফিসের অভাধিক হাটনতে ভালনাৰ দেহ ও মন অবদন হইরা পড়িয়াছে 👂 কালীফদের (ex) शक्ति देशवटक मुर्थ क्लिक्स किन, अञ्च क्रिट ও প্रमाधित গুহে প্রভাগের্ডন করিতে পারিবেন। রুধু আত্মীয়-সভনের সেবা শুক্রাষা ক্রিতে রাত্রি জাগরণ বা উৎসবাদি উপলক্ষে খাঁটুনি ও রাত্রি-ক্রাগ্রের ফলে আপনি অবসর ও ক্লাস্ত ইয়া প্রিরাছেন ও আপনার भदीत खत खत कति एक है। काली-कम ७×, शही है। वर्ण है शत्र करन ছালিয়া সেবন করুন, দেখিবেন কেমন সত্ত আপনি স্থ ও প্রকৃতিত্ বোধ করেন। স্থল-কলেজের ছাত্রগণের রাত্রি জাগরণ করিয়া মণ্ডিছ পরি-চাসনার কুফলে বা উকীল মোক্তার বারিষ্টার প্রভৃতির আফিষে ম্ভিক্পরিচালনা করিয়া স্ওয়াল জ্বাব করার দক্ষণ অথবা কুল মাষ্টার হা প্রফেসারগণের অধ্যাপনা জনিত মন্তিকের অবসাদে ও শ্বৃতিকীণতায় ইহা অমুশ্য ঔষধ।

প্টেরগতে প্রকৃতির কার্যা নিরীক্ষণ করন। উদ্ভিজ্জ্যে, ফ্লে-ফলে কেমন ধীরে ধীরে, অল্লে অল্লে, বাছিয়া বাছিয়া আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অর্থাৎ গ্রহণ ও ত্যাগ হারা অভাবের পূরণ চালভেছে। দেহেও প্রেলিনীর বস্তার বিপ্তমানতার স্বাস্থ্য; অভাবে —রোগ; রোগ ইউলে শরীরে কোন্ কোন্ পদার্থের অভাব ঘটিয়ছে তাহা জানিয়া অভাবের পূরণ করুণ—দেখিবেন, শীঘ্রই স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাত্তিত হটয়াছে।

ষধন চিকিৎসক্ষণ্ডলী এই পদার্থের অসাধারণ গুণাগুণ বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, অভাব স্থলে ইহা, বাবহা করিতে শিক্ষা করিবেন, তথনই দেশে পাগলা গারদ (Lunatic Asylum) রাধার আবশুক্তা আর থাকিবেনা, এবং জগত হইতে বহু রোগের অবসান ঘটিবে, এই মর-জগতই আবার অমরধানে পরিণত হইবে। মানবজাতির কল্যাণার্থে ইহা শীভগবানের স্ক্রেষ্ঠ দান, মন্ত্রের আবিষ্কৃত পদার্থ সমূহ মধ্যে স্ক্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং রোগারোগ্যে স্ক্রেষ্ঠ মহৌষধ, একথা বলিলে বোধহয় কিছুমাত্র অত্যক্তি ইইবেনা।

শরীরে কালী-ফদের স্বল্পতা ঘটিলে:—(১) লক্ষাশীলতা, উবেগ, আহিরতা, ভর, অশ্রন্থাবশীলতা, সন্দেহ, স্বগৃহে ফিরিরা যাইতে উৎস্ক্য (Home sickness) স্বৃতিক্ষীণতা এবং অবসাদ প্রভৃতি মাননিক লক্ষণ; (২) প্রথমতঃ নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও ক্রন্ততা (Small and freqent) এবং পরিশেষে উহার বেগের প্রতিবন্ধকতা বা বিশ্ববিত্তা (retardation); (৩) বোধক স্বায়ুতে (sensory nerves) বেদনা সহ স্পর্শনজ্বির বিলোণ; (৪) পেশী ও স্বায়ুর দৌর্বল্য জনিত গতি-জনক স্বায়ুর পক্ষাঘাত বা অবশতা এবং (৫) সহামুভোতিক সায়ুতে ইহার

বরতা নিবন্ধন পরিপোষণের অভাবহেতু ঐ সকল স্নায়ুর কোমলতা ও বিগলনশীলতা (degeneration) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সর্বপ্রকার স্নায়বিক দৌর্বল্যের (নিউরেছিনিয়া) মহৌষধ বলিয়া ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

সর্বপ্রকার আবের—(মল মৃত্র, রক্ত, শ্লেমা ও নিষ্ঠাবন প্রভৃতির এবং কত হইতে নিঃস্ত আবের ও প্রদরাদি আবেরও) ভরত্ব পৃতিগন্ধ (পচাগন্ধ) এবং টিশুর পচন বা বিগলনশীলভা কালী-ফল প্রয়োগের
অপর বিশেষ লক্ষণ। বৃদ্ধদিগের শীর্ণতা (এটফি) এবং যে কোন
প্রকার কত বা আবাদির দেল্টিক হইবার আশক্ষায় ইহা সফ্লতার সহিত্
বাবহৃত হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

নান্দলী-ফল সায়ু ও মণ্ডিছের রোগের সর্বাপ্রধান ঔষধ।
সায়ু এবং মন্তিছের প্রবলতা জনিত সক্ষপ্রকার মানাসক বিকাততেই ইল
বিশিপ্ত ক্ষণ উপযোগী। মিন্তিছের এই উপাদানের স্বল্লতা ঘটিলে
নিয়লিখিত ক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়; যথা—মন্তিছের প্রবলতা (আত্যধিক শ্রমজনিত) নিরুৎসাহিতা, ক্রোধ প্রবণতা, অসহিফুতা এবং অভিশন্ন
সারবীন্নতা, শিশুদিগের থিট্থিটে স্বভাব; ক্ষণরাগিতা, ক্রন্দন ও
চিৎকার; ভর; স্বৃতিক্ষণতা (ক্যাল্কেসের সহিত পর্যান্নক্রমে) রাত্রিতে
নিদ্রিভাবস্থার শিশুদিগের চিৎকার (কথন কথন ক্ষিত্রশ্র)। পূর্ব্বোক্র

অন্তিরতা, বিষয়তা, নানারূপ কল্পনা, বিনাকারণে ভন্ন, পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে স্থিনিশ্চয়তা বা বুঝিতে পারা; বিষয়কর্ম এবং আর্থিক বিনাশ সম্বন্ধে স্থিরসিকান্ধ, লোকাণ্যে যাইতে বা লোকের সহিত্ মিশিতে ভর বা শজা; শুক্রশ্রমক্ষনিত মানসিক ছর্বলিতা; সহক্রেই ক্রোধের উদ্রেক ও শ্বৃতিক্ষীণতা, শিথিবারকালে শব্দ বা অক্ষর ভূল পড়ে, সমস্ত বিষয়ই শুলাইরা যায়; গোলমাল বা শব্দে বিশ্বেষ; উল্পমহীনতা, সামান্ত কাজও বৃহৎ বলিয়া মনে হয়, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের আলাপ বা প্রলাপ; ভরের কুফল; শোকের কুফল; বিভ্রম দৃষ্টি; হিটিরিয়া পর্যায়ক্রমে হাল্ড ও ক্রন্দন; উন্মন্ততা; বিষাদ বায়ু, সর্বাদা চুপকরিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি; নিত্রাহ্তীনতা রাত্রিকালীন ভয়, জীবনের অসার-ভাগ দর্শন। উৎসাহ-হীনতা, স্নায়বীয় ব্যক্তিগণের মৃদ্র্যাপ্রবৃত্তি। মনের সামান্ত আবেগের ফলে হিটিরিয়ার উদ্ভব।

ডিলিরিয়ন ট্রিমেন্স (বালাকেপ) মস্তিক্ষের কোনলতা, শুন্তে করিত বস্ত ধরিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ। অতিশয় লজ্জাশীলতা; জরকালে প্রলাপ বকা (ফির-ফদ, জাট-মিউ)। স্তিকোঝাদ; হাস্ত বা ক্রন্দনের আবেশ; বিযাদবারু; অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জনিত জাবদাদ; অপ্রে বাক্রোধ। মানসিক বিভ্রম।

নতক। — সারবীর ব্যক্তিগণের শির:পাঁড়া; শব্দে অমুভবাধিকা, ক্রোধপ্রবণতা; মন্তিক্ষের রক্তহীনতা। রক্তঃপ্রাব কালীন শের:পীড়া, তৎসহ ক্ষা। বাম মাটেরেড অন্থিতে দারুণ বেদনা। প্রম, ত্র্র্বলতা, চিন্তা করিতে অপারগতা, ক্লান্তি, হাঁইতোলা, আড়ামোড়াভাঙ্গা (হন্ত-পদের প্রসারণ—ট্রেচিং) অবসরতা ও হিষ্টিরিয়া সহকারে শির:পীড়া। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ সহকারে শির:শূল, মানসিক প্রফুলতার উহার হ্রাস এবং একাকী থাকিলে বৃদ্ধি; অশ্রুমাব প্রবণতা। আহার করিলে ইংার কিঞ্ছিৎ উপশ্ম। মন্তক-পৃষ্ঠে বেদনা ও গুরুত্ব,

তংশত ওর্মানতা ও রাজি (ফিরফ্সের পর)। আহার কালে উহার
উপশ্ম। চাত্রগণের মানসিক পরিশ্রমকানিগণের ও অনিদ্রা-ফ্রনিত
ফ্র্নিনীভূতব্যক্তিগণের শিরংশীড়া। আহাবাজে, সামান্ত সঞ্চলনে বা
মনের প্রফুল্লভায় বেদনার হ্রাস। আবাজ হেতু মন্তিছের ভজন
(মন্তিছের বিকম্পন—কঙ্কশন)। প্রশারিত চক্রভারা। মন্তিছের
রক্তানিতা, ডজ্জ্যু স্নায়বীয়তা ও শিরোবূর্ণন, চর্মাণতা ও রাজি বশতঃ
শিরোবূর্ণন (ফির-ফ্স)। নিদ্রাহীনতা, নিদ্রিত ফ্রামাত্র মন্তকে নানা
প্রকার শক্ষ্ প্রবা। মন্তকে জল সঞ্চয়। মন্তকে আবাত লাগা।
মন্তিছের রক্তহীনতা। বাম ম্যেইয়েড অন্তিতে প্রচিণ্ড বেদনা।

স্ত্রীলোকের ঝাতুকালীন শিরঃপীড়া ও তৎসহ ক্ষা। সামবিক শিবঃপীড়া। মস্তকত্বক কঞ্মন। নড়িলে চড়িলে ও থোলা বাতাসে বৃদ্ধি।

তিক্র ।—দৃষ্টিদৌর্কলা, উত্তেজিত, একদৃষ্টিবিশিষ্ট চকু। প্রসারিত আফিতারা। পেশীর হ্বাণতা বশতঃ চকুর পাতার পতন। ডিফ্পিরিয়ার পরবর্ত্তী তির্যাক্দৃষ্টি। চকুর পাতার পকাঘাত বশতঃ পতন; চকে বালু, কুটা ইত্যাদি থাকার ল্লায় অনুভব। পাতার স্পানন। চকুর সম্মুখে কুফবিন্দু দর্শন। ঝাপ্সা দৃষ্টি।

ক্রি—মন্তকে এবং কর্ণে নানারপ শক্ষ প্রবণ সংযুক্ত বধিরতা।
স্বায়ু মন্তলের ত্র্নেণতা জন্ত শুতিফাণতা। কর্ণেকত ও উহা হইতে ত্র্নির্নি
পূষ্ময়, রক্তাক্ত প্রাব দিঃদরণ। মেম্বেণের ক্ষত। কর্ণের অভারবে
চুল্কানি। যে কোন প্রকার শক্ষ অসহা বোধ হয়।

নাসিকা।—হর্ণনিজাববিশিষ্ট, শ্লেমান্রাবী বিশ্লীতে সীমাবদ হুতিশ্রার (সিলিশিয়া জুইব্য)। হর্নদি পৃতিনশু (সিলি)। নাসিকা হুইতে পাত্রা রুফাভ রক্ষপাত। এই রক্ত জুমাট হয় না। নাসিকা হইতে হরিদ্রা বর্ণের প্রাথ নিঃদরণ।

সুখ্যতিল—মুখমগুলের সায়ুশ্ল। মুখমগুলের নীলাকতা ও নিমগ্নতা; পাত্র ও রোগা মুখমগুলের আরক্তা, উত্তপ্তা ও জালা। বাম পংর্ষের উপরের মাড়ি হইতে বাম কর্ণ পর্যান্ত বেদনা!

সুথ-সহা—মুখের পচাক্ষত (কালী মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমৈ)
ওঠে জলক্ষেটক; ওঠের ছাল উঠা; মুখমব্যের প্রদাহ। মুখ হইতে
হর্গন্ধ নিঃদর্গ। প্রভূত লবণাক্ত গাঢ় লালা নিঃদর্গ। স্পাঞ্জের স্থার
মাড়ি।

দক্ত ।—সায়প্রধান ব্যক্তিদিগের দন্তবেদনা (ম্যাগ-ক্স)। ত্র্বলতা, মানগ্রক পরিশ্রম অথবা নিজ্ঞাহীনতার পর দল্ভবেদনা। যৎসামার
সঞ্চলনে এই বেদনার উপশম। ধীর অস্পষ্ট ভাষণ (কথা বলা); শীত
বাতীত সায়বীর কারণে দল্ডে দল্ডে ঠক্ ঠক্ করা। সহজেই দন্তমূল হইতে
রক্তপাত। ক্ষয়প্রাপ্ত দক্তে অত্যন্ত বেদনা; সাম্বিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের
দন্তশূল।

ক্রিন্থা—বাসি সরিয়া গোলার স্থায় লেপ বিশিষ্ট ভিছ্বা। মুথ কইতে চর্গন্ধ নিঃসবণ প্রাতে ভিছ্বার অভিশয় গুদ্ধতা, মনে হয় ভিছ্বা উপর ভালুতে লাগিয়া থাকিবে। অভিশয় চুর্বলতা বা ওছতা সহকারে জিহ্বার প্রদাহ (স্থাট-মিউ)।

পালেক প্রাধান ইত্যাদি। গল-মধ্যের প্রাক্তর প্রারম্ভাবস্থার); জাংশিক প্রাধান ইত্যাদি। গল-মধ্যের প্রাক্তর প্রারম্ভাবস্থার); জুপ রোগের শেষাবস্থার মূর্চ্ছা, বিবর্ণ ও বলক্ষরে এই রোগের প্রধান ওবধ কালী-মিউরের সহিত পর্য্যারক্রমে ব্যবহার্যা। স্বর্গভঙ্গ ও স্বর-নাশ। নাকাস্বরে কথা বলা, ধীরে ধীরে, অমুচ্চস্বরে কথা বলা। স্বর-রজ্বর

পক্ষাৰাত। মানসিক অথবা সায়বিক ছক্ষাতা বৰ্ত্তমান থাকিলে দকল প্ৰকার গল-রোগেই ইহা ব্যবহার্যা। বৃহৎ ক্ষত বিশিষ্ট টিন্সিল ভত্তপরি গাঢ় খেত লেপ। সর্বালা ঢোক গিলিবার ইচ্ছা।

ত্র্বিশতা ও অবসরতা হইতে উৎপর আমাশরের বেদনা; জরাদি রোগের পর অতি কৃধা ও অন্বাভাবিক ক্ষ্ধা। উদর পূর্ব কবিয়া আহার করিলেও ক্ষ্ধা যার না. আবার খাইতে ইক্তা হয়। উদরের ক্ষীততা। বাতোলগার। বিবমিষা সহ তিক্ত বা অম ভূক্ত দ্রব্য বমন। রক্ত বমন, তিক্ত বা অম বাম্পোদগার। পাকস্থলীর কোন ও এক ক্ষে স্থানে অবিরাম বেদনা। মস্তিক্ষের রোগসহ গাঢ় সবুজ বা নীল পদার্থ বয়ন। পাকস্থলীর প্রদাহ। ভন্ন বা উত্তেজনার পর পাকস্থলীতে বেদনা। অতিশন্ধ পিপাসা; বিবমিষা সহ অম তিক্ত পদার্থ বা রক্ত বমন। থালি পেটে থাকিলে পেট কামড়ার, কিছু থাইলে উহার শান্তি।

তিদ্বা ত চালা । তিদরের
ক্রীততা, রোগীর প্রকাপ বকা; মলের পচা গন্ধ, জিহ্বার শুন্ধতা ইত্যাদি।
পচা গুর্গন্ধ মল সংযুক্ত অতিসার ও তৎসহকারে অতিশন্ন গুর্বলতা ও
স্পর্যন্ধতা। যে সকল রোগের সহিত উদরের উপসর্গ বিভ্যমান থাকে,
তাহাতে প্রধান ঔষধের সহিত এই ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে।
উদ্ধরের প্রদাহ ও মলে গুর্গন্ধ থাকিলে ইহা বিশিষ্টরূপে উপযোগী। উদরের
বামপার্থে হৃৎপিত্তের নীচে বেদনা। প্রীহার রোগ সহ আমাশন্ধের
বাম পার্থে বারু সঞ্চয় ও বেদনা। ভন্ন বা অপর কোন দৌর্বল্যকর
কারণে বেদনা শুন্ত জলবৎ অতিসার ও তৎসহ বলকর। চেলেনি জলের
স্পান্ধ বর্ণ বিশিষ্ট অতিশন্ধ হুর্গন্ধ বিশিষ্ট মল প্রাব। টাইফরেড ডিসেন্টি।

উদরের স্থাতিতা সহকারে বামপার্থে ক্লান্তিকর বেদনা ও হৃৎ প্রাদেশে যন্ত্রণা। চাউল ধোরা জলের ন্থার বর্ণ বিশিষ্ট প্রকৃত মল সংযুক্ত ওলাউঠার ইচা বিশেষ উপকারী। এই মল সশব্দে নির্গত হয়। টাইফ্রেড ফিবারের আল্লিক লক্ষণে। সরলান্ত্রনির্গমন (ফির-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে)। আল্লিক জ্বের ক্ষুদ্র হর্মণ নাড়ী ও মুখমগুলের নীলাভা। সন্মুখদিকে অবনত হইক্ষে উদর বেদনার উপশম। খাইতে বিসিলেই মল বেগ, তৎক্ষণাৎ উঠিতে হয়। মলস্রাবেও মলবেগের শাস্তি জ্বেম না। নড়া চড়ায় মলহ রে জ্বালা; কোট কাঠিয়। হাড়িলে ক্ষত, বেদনা ও চুলকানি; কোলন ও সরলান্ত্রের পক্ষাঘারের ক্রায় অবস্থা।

বুক্তি ব্যন্ত —পুনঃ পুনঃ প্রভুত সুত্রপ্রাব ও তৎপরে মৃত্র-পথে ঝলসিরা যাওরার ন্যায় বেদনা। প্রায়র দৌর্বলানশতঃ মৃত্রবেগধারণে অসমর্থতা।
অবারিত মৃত্রপ্রাব। বৃবক ও শেশুদিনের শ্যাসূত্র (।ফর ফস সহ
পর্যায়ক্রমে, ক্রমিঞ্চনিত রোগে শুটি-ফদের সহিত); মধুমেন। বাইট্রদ
ডিজিজ (মৃত্রে এবুমেন থাকিলে ক্যাক্ত ফলের সহিত পর্যায়ক্রমে)।
বছমূত্র সহ অতিকুধা। কুলুমেরক্রায় পীতবর্ণ মৃত্র। মৃত্রমার্নে কঞ্রন।
প্রমান্তর্বাপর ও মৃত্রনালীতে কর্তনবহ বেদনা।
বাইটস্ ডিজিজ। স্বার্থিক দৌর্বলা জনিত অবারিত মৃত্র। সিপ্তাইটিস

পুৎজননৈ ক্রিয়া—গণিত, আদিন উপদংশজ কত (স্থান্তার)
বক্তমানী প্রমেহ। <u>গর্দন্য সঙ্গমেছো।</u> ধ্রজভন্ধ; রাত্রিকালে লিসোখান
ব্যতীত যন্ত্রণাকর শুক্রমাব। কামেছোর সম্পূর্ণ বিলোপ। স্ত্রীসঙ্গমের
পর অত্যন্ত হর্মগতা অমুভব ও দৃষ্টিদৌর্মগ্রা। ব্যালেনাইটিস
(শিক্ষেমণ্ডের শৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ)।

জ্ঞীজনতন ক্রিন্ত ও বল্লাব বিশিষ্ট ঋতু। উদ্ধান জীলোক

ক্ষণাভ লোহিত, পাতলা, অসংখত, হুর্গন্ধি প্রভৃত ঋতু । অনিয়মিত ঋতু ; ঋতুকালে উলর বেদনা (ম্যাগ-ফ্স) ; রজলোপ। ঋতুকালে ভিষ্টিরিরা ; গলা বাহিয়া, বলের স্থার গোলাকার একটা পিশু উঠিতেছে, রোগিনীব এরপ অহন্তব। বিদাহী খেতপ্রদর (প্রাট-মিউ প্যায়ক্রমে)। সার্বাবক প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের নির্মিত স্মরের বছপুর্বের অত্যধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব। ছব্রগতা, উন্নমহীনতা ও অপ্রফুলু । সহ ঋতুলোপ। ঋতুফালে মাথাধরা, অবসন্ধতা, নিদ্রাস্থা, পারের কামড়ানি এবং নিরোদ্বের প্রায় স্ব্রিত চিড়িক্মারা বেদনা। উদরের বাম পার্থে ও বাম ডিম্বাল্রের (ওভেরি) বেদনা। কটির নিয়ে ত্রিকান্ত্র সেক্রাম) প্রদেশে অসহা বেদনা। পীতাত, ক্ষত ও জালাকর প্রাব বিশিষ্ট খেতপ্রের । ঝতুর শর তর্জমা সন্ধ্রেছে। অতিশন্ধ স্থান্তিক প্রকৃতির বেণিলী হ্রবিভা ও শুরিহীনতা সহ মহ্বা ঋতু (এমেনোবিয়া)।

পার্ভা । — ছবল জীলোক দিগের গর্জনাবাশকা (কাাক-ফোর)।
ভানপ্রদাহে হুর্গন্ধি পিল্লবর্ণ পৃষ্ট্রাবে আভাতারিক ও বাহা প্রয়োগ
ফলপ্রদ। স্থতিকা জ্বঃ; গর্জাবতায়ু বা প্রনাবর পরবর্তার উন্মন্ততার
বা সর্বাপ্রকান মানসিক নির্কাতিতে ইতা বিশেষ উপকরী। ক্ষাণ প্রসব-বেদনা। প্রসবের একসাদ পূর্বে হইতে নিয়মিত রূপে ইহা ব্যবহার
করিলে প্রসবে কোন কন্ত হন্ধ না। প্রস্ব বেদনা উপত্তিত হইলে
১০।২০ মিনিট পর পর ৪% ক্রম ৪।৫ গ্রেণ মান্রায় উষ্ণ জলের সহিত্
প্রায়োগ করিলে অভি শীঘ্র ও সহক্ষে প্রসব হুইয়া থাকে।

প্রাহ্ন-অক্তা-শ্বর্থন্তের অভিচালনা বশতঃ শ্বরভঙ্গ ও তর্বলতামুভব। ছপিং কাস। খাস প্রখাসে অভিশর কট চইলে অধিক মাত্রায়
এবং অল্ল সময় পর পর ৩×ক্রম বাবচার করিলে উৎকৃষ্ট ফলদর্শে।

শ্বনাশ। খাদবোধের আখকা (অলবং ফেলা নিষ্ঠাবন পরিতাক্ত হইলে স্থাট-মিউ সহ পর্যায়ক্রমে)। ক্রুপ রোগের শেষাবস্থার (পর্যায়ক্রমে কালীমিউ)। প্রাস-কালে খাসের হ্রম্বভা, পরিশ্রমে বা যৎসামাষ্ট্র সঞ্চলনে বৃদ্ধি। খাসনলার উপদাল বশতঃ কাস। বক্ষে ক্ষত্বং বেদনা। কুসমূসে কলসঞ্চর। প্রমন্তনক কার্য্য বা উপরতালায় উঠিবার সময় মারাসিত ও ফ্রত খাস-প্রখাস। সায়বিক প্রকৃতির রোগীদিগের ছপিং কাস ও তৎসক্ ক্ষত্যন্ত অবসনতা। শ্বরহজ্বে (ভোকাল-কর্ড) পক্ষাঘাত ক্ষনিত মর নাশ।

ব্রত্ত সঞ্জলক হাক্র।—মৃহ, সবিরাষ, বিষয় নাড়ী। উৎকণ্ঠা, অন্থিরতা, খাসের ক্রমতা ও নিজাহীনতা সহকারে হংপিঙের দপ্দপ্। উত্তথানে উঠিতে স্দ্পিঙের দপ্দপ্। ভর অথবা ক্র্পিঙের হুর্গতাবশতঃ মৃহ্যা। হুৎপিঙের জিলার স্বিরামতা।

প্রতি ও তাত্ত্ব লিত্রতা লিকান্তর কোন্দ্র কোন্দ্র ও রক্তন্ত্র নিতা। হও পদের আংশিক বা স্মত্রের পক্ষাঘাত। চলং-শক্তির বিপথ্যর; ই:টিতে গিয়া পড়িয়া যায়। আমবাতিক বেদনা, রোগাক্রাক্ত স্থানের থঞ্জতাও আড়ইতা; প্রবল পরিশ্রমে বৃদ্ধি, সামান্য সঞ্চলনে উপশম। থোঁড়াইয়া থোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয়। বিশ্রাম কালে য়ৢয়রথ বেদনা, আত্তে আত্তে নড়িলে চড়িলে ক্রমে ক্রমে উপশম বোধ; তরুল বা পুরাতন বাতের বেদনা। প্রাতে বিশ্রামের পর, অথবা উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উথানকালে বোগাক্রান্ত হানে আছেইতামুভ্র (ইফনেস্)। হস্ত পদের সায়ু শুল ও তৎসহ অবশতামুভ্র (ক্যাক্রক্স); হস্ত পদ বা কর্ণে শীতক্ষোট (আড়ান্তরিক ও বাহ্য)। হস্ত ও পদ তলের কঞ্রন ও জালা।

আঃমণ্ডল।—শরীরের বে কোন ও স্থানের বা বে কোন ও

প্রকারের পক্ষাঘাতেই কালীফদ প্রধান ঔষধ। শরীরের যে কোন যন্ত্রের সায়ুশ্লে অবসরতা, বলকর গোলমালে বা আলোকে দ্বের এবং সামাপ্রকানে ও মনের প্রভুলভায় উপশন ও একাকী বা স্থিরভাবে থাকিলে অভিশর বৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে ইছা বিশেষ ফলপ্রদ অভিশয় স্বায়নীর প্রকৃতির রোগী, বিনা কাংশে সহজেই উৎক্তিত হয়।

সহজেই ক্রেণের উদ্রেক। সামান্ত বিষয়কে রহৎ করিয়া ভোলে; ব্যোগের বর্ণনাকালে রোগীর অশ্রন্তাব। সামান্ত মনোবিকারে চিষ্টিরিয়ার আবেশ, শিশুদিগের পকাঘাত, মৃগী; কটিবাত; উরুর পশ্চাৎদিয়াইটুপর্যান্ত আকর্ষণবৎ বেদনা এবং সহজেই চ্বালিতা ও অবসন্নতা। মৃগী ও চিষ্টিরিয়া, বিশেষত: ভয় প্রাপ্তির পর। সহজেই চমকিত হইয়া উঠা। দস্মাতম্বরের ভয়। সামান্ত্রক ম্বালিতা, বিশেষত: ইন্দ্রিয়ের অতি চালনার পর। ইন্দ্রিয়ের অতি চালনার ফলে নিদ্রাহীনতা, কটি, পৃষ্ঠ ও মন্তকপৃষ্ঠে বেদনা সমন্ত্র সার্বার আবেশ ও তৎপর অবসন্নতা। চলৎ-শক্তির লোপ (loco-motor paralysis); পকাঘাত সহ রোগাক্রান্ত অলের শীর্ণতা। একাকী বা চুপক্রিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি। সামেটিকা, উরুর পশ্চাৎ দিয়া হাটু পর্যান্ত বেদনা; চকিত প্রবেণতা, সহজেই চমকিয়া উঠে।

ক্রেক্ত।—গাত্র কণ্ডু আঙ্গুণুচাড়া, পেন্দিগঃস (জল বিষের স্থায় ফোজা বিশিষ্ট এক প্রকার চর্ম্ম রোগ)। ফোজা, কুঞ্জিত স্বক, বসন্ত রোগের পচনশীল অবস্থা। স্থড়স্থড়ি অমুভ্র সহকারে স্বকের অভিশ্ব কণ্ডুরন; সামান্ত বর্ষণে উপশম অমুভ্র কিন্তু জোড়ে চুগকাইলে ক্ষত্রৎ বেদনা (ক্যাক্ষ্কস), হস্ত ও পদের ভালুর কণ্ডুয়ন; শীতন্দোট; মন্তক্ষেত্র।

বিদ্রা —উৎকণ্ঠা বা উত্তেজনার পর মায়বিক কারণে শনিদ্রা।
ব্রপ্ন সঞ্চরণ; শিশুরা অপ্ন দেখিয়া উঠিয়া পড়ে। অনিদ্রা নশকঃ হাঁই-

তোলা, আড়ামোড়াভালা, ছর্মলভা এবং উদয়ে শুক্তামুভব।
সমগ্র নিফ্রাকাল ব্যালিরা অগ্নি, দহ্যভন্তর ও ভূত প্রেভাদির স্থাদর্শন;
স্থানালে মনে হর নীচে পড়িয়া গেলাম। শিশুদের রাত্রির ভর
(night terrors)। গভীর নিজ্ঞাকালে ভয়ে চিৎকার দিয়া জাগিয়া
পড়ে। রভি বিষরক বা কাম সংক্রাস্ত স্থা দর্শন। প্রোতে শ্রা। হইডে
উঠিতে ইচ্ছা হয় না। নিজিত হওয়া মাত্র পেশীর স্পানন বা উল্লেখন।

ক্রের।—দর্বপ্রকার মৃত্ প্রকৃতির অনিষ্টকর বা সাংঘাতিক অবে ইহা ব্যবহার্য। নিজাহীনতা, বিড্বিড় করিয়া প্রলাপ বকা, ভক্রা, উচ্চ গাজোভাপ, নাড়ীর বেগ স্বাভাবিক অপেক্ষা মৃত্ত অথবা ক্রত ও কদাচিৎ অমুভবযোগ্য (ক্রাটমিউ)। সবিরাম অবে প্রভূত হুর্গনি, দৌর্বল্যকর অর্থ। টাইফয়েড ও স্থালে টিফিবারের পচনশীল অবস্থায়। উচ্চ গাজোভাপ। হুর্গনিযুক্ত, প্রভূত, দৌর্বল্যকর ঘর্ম। সর্বপ্রকার সাংঘাতিক অর ও লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। টাইফয়েড অরে এই ঔষধের জিহ্বা লক্ষণ দ্রুইবা। আহারকালে আমালয়ে হুর্বলতা সহকারে প্রভূত দৌর্বল্যকর ঘর্ম। টাইফয়েড অরের ইহা একটা প্রধান ঔষধ বিশেষতঃ শুক্ষ কটাবর্ণের (brown) বা সরিষা বাটার স্থায় বর্ণ বিশিষ্ট জিহ্বা, নিদ্রাহীনতা ও প্রলাপ থাকিলে।

ভাকত না ।—কর্কর রোগের পচনশীল অবস্থার ;শরীরের যে কোন হান হইতে রক্তপাতে রক্ত কৃষ্ণাভ ও উহা সংঘত না হইলে; সর্বালীন দৌর্বল্য ও অবসরতার ; পচাক্ষতের প্রথমাবস্থায় এবং ভোগ লালসার সংঘম বা অতিরিক্ত ইক্রিরচালনার কৃষ্ণলে ইহা বিধা না করিয়া বাবহার করিবে। সর্বপ্রকার হিন্তিরিয়া ও উন্মাদ রোগের ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ। ইহার বেদনার উপচয় ও উপশ্মের লক্ষণ গুলি বিশেব মূল্যবান। মক্তিক্ষের রোগে ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ। শরীরের অতিশয় শীণ্তা ও

উহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, তৎসহ হুর্গন্ধি মলপ্রাব। ক্ষতের পচনশীলতা।
দূষিত রক্তপ্রাব (সেপটিক হেমরেজা। বৃদ্ধিদেশের জীবনী শক্তির ক্ষীণতা
সহ শরীরের ক্রমশঃ শীর্ণতা, অকের শুক্তা ও শুল্র শন্ধবৎ উপতৃক স্থানন।
রক্তহানতা, শীর্ণতা; হুর্গন্ধি মল সংযুক্ত ক্ষরকর রোগে ইহার বিশেষ
প্রয়োজন। ক্যান্সার রোগে হুর্গন্ধি প্রাব ও বেদনার উপশ্যার্থ ইহার
বিশেষ প্রয়োজন। রিকেটস্ রোগে হুর্গন্ধ মলপ্রাব হইলে ইহার
ক্রকান্ত প্রয়োজন। শীতল বাতাসে রোগীর লক্ষণের কৃদ্ধি।

ভাগতি বি তি তিশিকা।—বিশান, উত্তাপ ও পুষ্টিকর থাছাদি গ্রহণে এই ঔষধের লক্ষণ সমূহ উপশমিত এবং উত্তেজনা, শারীরিক বা মানদিক শ্রম, ছশ্চিন্তা, গোলমাল, উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থান, বিশ্রামের পর এবং ক্রমাগত পরিশ্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকল প্রকার বেদনারই শীতল বাতাস লাগিলে বৃদ্ধি এই ঔষধ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। সামাল্ল সঞ্চলনে, ভোজনে এবং প্রফুল্লকর আলাপাদি শ্রবণে এই ঔষধের রোগী ভাল বোধ করে এবং একাকী থাকিলে সর্বাদাই খারাপ বোধ করে। সামেটিকা ভোগে প্রথম সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্দ্র ক্রমাগত চলিতে থাকিলে বেদনার লোপ।

প্রেলার খাস-কাসিতে ইহার ২ স বা ৩ স ক্রম ব্যবহার করিছে বিধি দিয়া থাকেন। ৬ স, ১২ স ক্রম ব্যবহার করিয়াও অনেক রোগে ও রোগীতে উপকার পাওয়া গিরাছে। গর্ভাবস্থার ইহার স ক্রম এবং প্রম্ব বেদনা উপস্থিত হইলে মুখ-প্রস্বের নিমিস্ত ৪ স ক্রম ব্যবহার করিয়া আমরা চমৎকার ফল পাইয়াছি।

সহাক্ষা ও প্রভেদ বিচার —রসটকাও ফসফরাসের লক্ষণের সহিত ইহার অনেক সাদৃশু আছে। পলসেটিলার ভিতর কালী-

ফস বিস্থমান আছে। এজন্ত উভয় ঔষধেরই সায়বিক লকণ সমূহে অনেকটা সাদৃশ্র পরিশক্ষিত হইয়া থাকে। প্রসেটলার বিশেষ মানসিক লক্ষণও ইহাতে বিশ্বমান আছে। ফাইটোলাকার অনেক লক্ষণের সভিত্ত কালী-ফসের লক্ষণের সাদৃগ্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইয়েশিয়ার মধ্যেও সম্ভবতঃ কালী-ফদ আছে। যেহেতু উভয় ঔষধের হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ সমূহ প্রায় একই রূপ। সায়বিক লক্ষণসমূহের শান্তি জন্মাইতে ইহার ক্রিগা অনেকটা ইগ্নেশিয়া, কফিয়া, হায়োসায়েমাস ও ক্যামোমিলার মত। রজ্ঞাব কালীন সিরংপীড়ার, জিঙ্কম, সিমিসিফুগা জেলস ও সাইক্লেমেনের সহিত তৃলনীয়। মুত্রাশয়ের রোগে কালী-ফলের পর অনেক সময় ম্যাগ-ফস অনুপুরক ঔষ্ণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তশ্রাবে, রক্ত উজ্জন আরক বা মলিন যাহাই কেন হউকনা, রক্তস্রাবের পর উহা সংযত না হলে কালা-ফদ ব্যবহৃত হয়। কথন কথন ইহার পর নেট্রাম-মিউর বা নাইট্রিক-এসিডেরও প্রয়োজন হইতে পারে। মানসিক বিভ্রম পাইক্লেমেনের সহিত ইহার তুলনা করুন। স্থতিকা-জ্বে কালী-মিউরের সহিত তুলনীয়। ডিফণিরিয়ার পরবর্তী কুফলে ল্যাকেসিস্ ও কষ্টিকমের সহিত ইহার তুলনা হইরা থাকে। পঢ়াক্ষতে কালী-ক্লোরিকমের সহিত তুলনা করা কর্ত্তব্য।

কালী সলফিউরিকম।

Kali Sulphuricum

ইহার অন্ত নাম পটাশিয়ম সলফেট বা সলফেট অবু পটাশ। সংক্ষিপ্ত নাম ক্যাল -সলফ। এপিডার্মিস্ অর্থাৎ উপত্বক এবং ওঠ, স্তনাগ্র এবং শ্লৈষ্মিক, সৈহিক ও মন্তিক-ঝিলীর উপরিস্থ পাতলা আচ্ছাদন-ত্বকে ইহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরে এই পদার্থের অভাব হইলে জিহ্বার উপর পীতবর্ণ চট্চটে একপ্রকার পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং শরীরের অন্তান্ত স্থানের শ্লৈমিক-ঝিল্লী হইতে পীতাভ সবুজ, পাতলা জলবং প্রাব নিঃস্ত হইতে থাকে। ফিরম-ফসের আলোচনাকালে বলা হইয়াছে, ফিরম-ফন ও কালী-সলফ এই ছই দ্রব্যের সাহায্যে শ্রীরে অক্সিঙ্নে নামক গ্যাস বাহিত হইয়া থাকে। স্থতরাং শরীবে এই পদার্থের অভাব বা ন্যুনতা ঘটিলে, উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন বাহিত হইতে পারে না। তর্জন্ত শাস-রোধের ন্যায় অন্তত্তব এবং শীতলবায়ু প্রাপ্তির প্রবল আকাজ্ঞা জন্ম। দেহস্থ তৈলাক্ত পদার্থের উপরও ইহার বিশেষ প্রভাব আছে । এই পদার্থের অভাবে শরীরস্থ তৈলাক্ত পদার্থ সমূহ অকার্য্যকারী হইয়া থাকে। শরীরে এই পদার্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিলে তৈলাক্ত পদার্থ সকল ইহার সাহায্যে কার্য্যকারী হইয়া চর্ত্মকে মস্থাও পরিষ্কার রাখে। চর্ত্ম মস্থাও পরিষার থাকিলে লোমকূপ সকলও পরিষার থাকে। লোম-কুপ পরিষার থাকিলে শরীরের নানাপ্রকার মল (ময়লা) লোমকৃপ-পথে বাহির হইয়া যায় এবং বায়ু হইতে অক্সিজেন নামক গ্যাস রক্তে প্রবেশ করিয়া রক্তকে পরিষ্কার রাথে। কিন্তু যথন শ্রীরে এই পদার্থের অভাব হয় তথন চর্মের উক্ত কার্য্যসমূহ সম্পাদনে ব্যাঘাত ঘটে। চর্মপথে উপযুক্ত পরিমাণ অ্ফ্রিজেন রক্তে প্রবেশ করিতে না পারায় ফুস্ক-ফুসক্

বাধ্য হইয়া বাহ্য-বায়ু হইতে অধিকতর অক্সিজেন সংগ্রাহ করিতে হয়। এই প্রচুয় অক্সিকেন সংগ্রহের জন্ম ফুসফুসকে ফুচতরবেগে কার্য্য করিতে হয়। ফুসফুসের এই ফুত ক্রিয়া দারাই "অস্থিরতা', শ্বাসের ২কি ও "শীতল বায়ু প্রাপ্তির আকাজ্জা স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

পূর্বেই বলা হইরাছে, শরীরের তৈলাক্ত পদার্থ সমূহের উপর ইহার ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্ম আছে। এজন্ত ইহার নানতায় শরীরস্থ তৈলাক্ত পদার্থ সমূহ অপরাপর ময়লার সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া য়ায়। এই জন্ত ইহার অভাব স্চক যে আব নিঃস্ত হয়, তাহা চট্চটে অর্থাৎ আঠা আঠা ও পিচ্ছিল হয় এবং ইহার বর্ণ সাধারণতঃ হরিদ্রান্বা স্বুজ্থাকে।

ইহা ব্যবহারে ঘর্মপ্রাব বিবন্ধিত এবং ও লোমকূপসকল পরিদ্ধত হয়। কোন প্রকার চর্মরোগে (যথা, হাম বদন্তাদি) গুটি বা দানাগুলি বসিয়া গেলে ইহা ব্যবহারে উহা পুনঃ প্রকাশিত হয়। সন্ধার প্রাক্তালে রোগলক্ষণের রুদ্ধি। বিশেষতঃ জ্বের প্রত্যাবহুন) এবং মধ্যরাত্রে হ্রাস প্রাপ্তি এই ঔষধের একটা প্রধান প্রিচালক লক্ষণ। এই ঔষধের অপর বিশেষ লক্ষণ হইল থোলা, শাতল বাতাসে রোগীর বিশেষ উপশম বোধ।

আময়িক প্রয়োগ।

প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায়, যথন নিঃস্ত প্রাব হরিদ্রাভ, পিচ্ছিল, চটচটে অথবা জলবৎ কিংবা সব্জাভ জলবৎ হয়, তথন ক্যালী-সলফ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। এজস্ত শাস যন্ত্রের পীড়া, যথাক্ষয় কাস (যক্ষা) ফুস্ফুস প্রদাহ (নিউমোনিয়া), বায়ুনলীভুজ প্রদাহ (বঙ্ককাইটিস)

প্রভৃতিতে পিচ্ছিল পাতলা হরিদ্রাবর্ণের, বা সর্জাভ হরিদ্রাবর্ণের পাতলা আব নিঃস্ত হইলে ইহা স্বপ্রযোজ্য।

স্বালেটি ফিভার হাম, সমন্ত প্রভৃতি রোগে গুটিকা গুলি ভালরপে বাহির না হইলে, অথবা কি ু কিছু বাহির হইয়া আবার বসিয়া গেলে, এই ওঁষধ ব্যবহাব করিলে গুটিকা গুলি সন্ধর প্রকাশ পায় এবং পুর্বোক্ত রোগ সমূহে যগন শুক্ষন্ম বা বা উপত্বক স্থালিত হইতে থাকে, তথন ইহা ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র শুক্ষ আইসবৎ থোদা স্থালিত হইয়া নুতন চর্ম উঠিয়া থাকে।

এই ঔষদেব একটা প্রধান লক্ষণ হইল অপরাহ্ন কালে বোগের বৃদ্ধি বা প্রজ্যাবৃত্তি এবং মধ্যরাত্তিব পর হইতে বোগীর উপশম বোধ। ইহার কারণ এই যে মানুষ ি দ্রাকালে জাগ্রভাষায়া অপেকা জোরে ও ক্রত খাস গ্রহণ করে। পুর্নেই বলা হইয়াছে যে, রক্তে বা শরীরে এই জিনিষের অভাব হইলে স্কুদ্ নিয়মিত অপেক। অধিক মাতায় কার্য্যকরিতে বাধ্য হয়। ৫০জপে নিয়মিতের অধিক কার্য্য করার জন্ম শরীর অবসয় ও অবারধগ্রস্ত হয় —ইহার ফলেই মধ্যরাতির পর নিদ্রার আবেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় খাস-বায়ু সজোরে ও ঘন ঘন গুলীত জা বলিয়া রক্তে অপেক্ষাকৃত অপিক পরিমাণ অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং ওজ্জুল কিয়ৎ পরিমাণে ক্যালী-সলফের অভাব পূরণ করে ও লোমকূপ সকল পুনরায় কার্য্যকারী হয়। এবস্প্রকাবে সচরাচর উক্ত ক্রিয়াদির আরম্ভ হইতে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যান্ত অপেক্ষা করিতে হয়। পুননায় প্রাতে উঠিলে, জাগ্রভাবস্থায় খাস-বায়ু ভাত ঘন ঘন গৃহীত না হওয়ার দরুণ শরীরস্ত রক্তে তত বেশী পরিমাণ জঞ্জিজেন গৃহীত হইতে পারে না, কাজেই পুনরায় এই দ্রব্যের (কালী-সলফ) অভাব আরম্ভ ছইতে থাকে। এই ভাবে অপরাহ্ন কালেই পুনরায় পুর্বোক্ত লক্ষণ সকলের বৃদ্ধি হইতে থাকে।
এই কারণেই, যে সকল রোগে অপরাহ্নে লক্ষণের বৃদ্ধি ও মধ্যরাত্রির পর
হইতে লক্ষণ সকল হ্রাস পড়িতে থাকে, তাহাতেই কালী-সলফ
সফলতার সহিত ব্যবস্থাত হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

ক্রন।—নিমে পড়িয়া যাইবার ভয়। অত্যস্ত ণিটথিটে স্বভাব।
অপরাক্তে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা; মান্সিক শ্রমে উহার বৃদ্ধি। সর্বন্ধাই
ব্যস্তসমস্ততা ও সকল কার্য্যেই ক্রততা ও ভয়শীলতা।

মন্তব্দ — শিরোঘূর্ণন, বিশেষতঃ উঠিয়া দাড়াইলে ও তাকাইনার কালে। কেশপতন; মন্তকের স্থানে স্থানে টাকপড়া; খুস্কি আভ্যন্তরিক ও বাহ্য, — ভাট-মি) কেশপতন। শিরঃগাঁড়া, থোলা শাঁতল বাতাসে উপশম এবং উষ্ণগৃছে বা সন্ধাব সমন্ন উপ৮য় এই উষ্ণের বিশেষ লক্ষণ। আমবাতিক শিরঃপীড়ার সংগ্রার সমন্ন বৃদ্ধি। মন্তকে এক প্রকার উদ্ভেদ এবং উহা হইতে পাতলা পীতবর্ণ রসাণি নিঃসরণ। জিহ্বার বর্ণ দ্রস্ত্রা। করোটি (মন্তকের কেশবুক্ত ত্বক) হইতে আইসবং উপত্বক স্থালন ও আঠা আঠা প্রাব নিঃসরণ।

তি ক্র্ ।— চক্ অথবা চকুর পাতা হইতে পীত, পীতাত সর্জ, আঠা আঠা অথবা জলবং প্রাব নিঃসরণ। চকুর পাতার পীতবর্ণ মামজি। পূর্বোক্ত প্রকারের প্রাব সংযুক্ত চকুর খেতমগুলের প্রশাহ। ছানি ও অফিমুকুরের অস্বচ্ছতা জন্ম অস্পষ্টদৃষ্টি (ন্যাই-মিউ)। কর্ণিয়ার স্ফোটক। অফিব্রণ।

ব্য বা ।—পীতবর্ণ জলবং প্রাব সংযুক্ত কর্ণশূল। কর্ণের নীচে জীত্র কর্তনবং বেদনা। কণ্ঠ ও কর্ণের প্রতিশ্রার, ই.ইকিয়ানাটিউব পর্যান্ত উহার সম্প্রসারণ এবং তৎসহ পীতবর্ণ আঠা আঠা প্রাব নিঃসরণ ও তজ্জন্য বধিরতা। কিঞ্চিৎ ঔষধ জলের সহিত মিপ্রিত করিয়া পিচকারী দিয়া দিনে একবার কর্ণ ধৌত করা বিধেয়। মধ্যকর্ণের স্ফীততাবশতঃ বধিরতা এবং এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ প্রাব (পাতলা পীত বা পীতাভ সর্জ) নিঃসরণ ও আপরাহ্নিক উপচয়। ভিহ্নার বর্ণ দুইবা। (পীতবর্ণ গাঢ় প্রাবে ক্যাল্ক-সলফ উপযোগী)।

লাসিকা। — কঠ ও মন্তকের তরুণ বা পুরাতন প্রতিশার, তৎসহ এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ স্রাব নিংসরণ এবং আপরাহ্নিক ও উষ্ণ গৃহে উপচয়। প্রতিশারের প্রারম্ভাবস্থার ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে বা তৎপর ব্যবহার করিলে স্কনাতেই রোগ সারিয়া যায়। নাসাবরোধক প্রতিশায়। দ্রাণশক্তির বিলোপ। পৃতিনস্ত (ওজিনা)ও নাসা কণ্ডুয়ন; নাসিকার ক্যান্সার।

মুখান ও লা ।— মুখমগুলের স্নায়্-শূল; থাকিয়া থাকিয়া বেদন। উপস্থিত হয় ও এক স্থান হইতে স্থানাস্তবে সঞ্চালিত হয়; উষ্ণ গৃহে ও অপরাহে বৃদ্ধি; শীতল বাতাসে উপশ্ম। এপিপেলোমা (ঔপত্কিক অর্কুদ)।

🕿ক। — মুখমগুলের ও নাসিকার ক্যান্সার।

সুখস্থ্য :— এঠের ক্যান্সার ও উহা হইতে এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ প্রাণ নিঃসরণ। নিয়োগ্রের শুষ্টতা ও উহা হইতে উপত্বক খলন। মুখাভান্তরে জালাকর উত্তাপ।

দ্স্ত।—দন্ত বেদনা; উক্ষতায় ও সন্ধাকালে বৃদ্ধি, শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম।

পাল্য ।—গলাভ্যন্তরে শুক্ষ গু সংক্ষান অনুভব। কাসিয়া কাসিয়া শ্লেমা ভূলিতে হয়। টন্সিলের বৃদ্ধি। গিলিতে কষ্ট। নাসার পশ্চাৎ-বিবরের অবরোধ জ্বন্ত হাঁ করিয়া খাস নিতে হয় ও <u>খাসে বড়ঘডি</u> শব্দ জন্মে।

ক্তিহ্বা:—আঠা আঠা, পীত লেপাবৃত জিহ্বা, কখন কখন উভয় পার্ষে খেত লেপ। মুখের বিস্থাদ। ওস্তদ্বয়, জিহ্বা ও মাড়ির খেতবর্ণ। স্থাদশুগুতা।

আহাশাহা।—আমাশরের প্রতিশ্রার সহকারে জিহ্বার প্রকৃতিসিদ্ধ লেপ। অমুরোগ সহ জিহ্বার পূর্ক বর্ণিত লেপ। আমাশরে
পূর্ণতা ও গুরুত্ব অমুভব সহকারে অপাক। উদর বেদনা। (ম্যাগফস বিফল হইলে) উষ্ণ পানীয় গ্রহণে ভয়। পিপাসাহীনতা। গ্যাপ্রিক
ফিবার। পাকস্থলীতে জালাকর উত্তাপ। জালাকর পিপাসা, বিবমিষা
ও বমন। আমাশরাম্বের প্রতিশ্রায় জন্য পাগু।

উদ্বেশ্য প্রবাহ করণ।—সকল প্রকার পেটের অমুথেই এই উষধের প্রকৃতি-সিদ্ধ জিহ্বার লক্ষণ ও মলের বর্ণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অবশু ব্যবহার্য্য। পীতবর্ণ, শেওলা শেওলা বা আঠা আঠা, পৃ্যবৎ, মল। গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ার দরণ শূল বেদনার ন্যায় উদর বেদনা (জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য)। স্পর্শে উদরে শীতলতামুভব। বাতকর্মে গরুকের ন্যায় গরু। আভ্যন্তরিক ও বাহ্যবলিযুক্ত অর্শে। অর্শে এই উমধের জিহ্বা-লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ক্যান্ত-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য; উদরের স্টীততা। প্রবল উদর বেদনা ও অতিসার। মলত্যাগ কালে সরলান্থে ও মলদারে বেদনা। আগ্রিক জ্বরে অপরাক্তে জ্বের বৃদ্ধি ও প্রাতঃকালে হাস; স্পর্শে উদর শক্ত ও শীতল বোধহয়। মলহারে প্রবল কণ্ডুয়ন, স্টি-বিদ্ধবৎ বেদনা ও ক্রন্থন। কলেরার শ্লায় লক্ষণের

সূত্র হাত্র।—সিষ্টাইটিসে মূত্রদার দিয়া এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ পীতবর্ণ আটাল আব নিঃস্থত হইলে উপকারী। রাত্রে পুনঃ পুনঃ জালাকর মূত্রত্যাগ। ফোটা ফোটা মূত্রপাত। মূত্রে এলুমেন দৃষ্ট হয়।

পুংজ্নে ব্রিছা।—প্রমেষ; পীত, আঁটাল অথবা সব্জাভ আব; উপদংশ ও গ্রীট রোগের আপরাহ্নিক উপ্চয়। অগুপ্রদাহ (প্রমেষ্-আব বিলোপের ফলে)। লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিলীর ক্রদাষ্ (ব্যালেনাইটিন্)

জ্বী জ্বন ক্রেন্ডা — পূর্বেক প্রকারের প্রাব বিশিষ্ট প্রমেষ ।
উদরে পূর্বতা ও গুরুত্ব সহকারে বিলিধিত ও স্বল্ল রজঃ। জিহ্বার বর্ব
র্দ্রিরা। শ্বেত-প্রদর। পূর্ববর্ণিত আব নিংসরণ। যোনিতে জালা।
অপরাক্তে রন্ধি লক্ষণ সহকারে উপদংশ। বস্তিগহ্বরে আবেগ সহ
জরার হইতে প্রভূত রক্ত্রাব।

প্রাস্থান স্থান আঠা পাতাভ সবুজবর্ণের প্রাব সংযুক্ত খাস-পথের প্রদাহ। পূর্ব্বর্ণিত নিষ্ঠাবনবিশিষ্ট ব্রহ্মাইটিস ও ক্ষয়কাস। সন্ধ্যাকালে জ্বরের বৃদ্ধি। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। পীতবর্ণ প্রাবিশিষ্ট খাস কাস। (আয়ানিত খাস-প্রখাসে কালী-ফস)। পীতবর্ণ নিষ্ঠাবনবিশিষ্ট কাস; সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি, বিমৃক্ত শীতল বাতাসে ভাস। হন্ছেন্স রজ্জুবং শ্লেম্মা, এজন্স কাসিয়া তুলিবার পরে উহা গলার ভিতরে পড়িয়া যায়। কথা বলিতে ক্লান্তি। হুপিংকাফ (পুর্ব্বোক্ত প্রকারের নিষ্ঠীবন সহ)। নিউমোনিয়া; পীতবর্ণ শ্লেম্মা, বক্ষে শ্লেম্মার ঘত ঘড় শক্ষ ও উষ্ণ বায়ুতে খাসরোধাশক্ষা। শীতল বাতাস প্রাপ্তির

আকাজ্জা। কুপঞ্জনিত স্বরভঙ্গ।

ব্রক্ত সঞ্জলন হাক্র।—ক্রত, দপ্দপ্কর নাড়ী। সন্ধার প্রাক্ষালে গাত্রোতাপের বৃদ্ধি। অতিশয় ধীর, মৃত্, প্রায় অপ্রাপ্য নাড়ী; শুক্ষ কৃষ্ণ ও উত্তথ্রক। সর্ক্শরীরেই ধ্যনীর স্পদ্দন অমুভ্ব হয়। পৃষ্ঠ ও অঞ্চল-প্রত্যঞ্জল সঞ্চালিত হয়। সকল প্রকার বাতের বেদনার ও সায়ুশ্লের সক্ষাকালে ও উষ্ণগৃতে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা বিমৃক্ত বায়ুতে উপশ্ম। পৃষ্ঠে, গ্রীবাপৃষ্ঠে অথবা হস্ত পদে স্থানবিকল্পশীল বেদনা (বেদনা নড়া চড়া করে)।

সাহ্য মণ্ডল :— এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চরণশীল সামুশ্ল; কোরিয়া।

ক্রক।—সকল প্রকার ক্ষত এবং চর্মরোগেই পাতলা, পীতবর্ণ জলবং প্রাব নিঃসরণ, কথন কথন ক্ষতের চতুঃপার্মস্থ স্থান হইতে শল্পবং উপত্বক স্থানন। শুক্ষ উত্তপ্ত, জ্ঞালাকর ত্বক; ঘর্মের অভাব। স্থালেট ফিবার, হাম, বসন্ত, ইত্যাদি যে কোন প্রকার চর্মরোগ বিদিয়া যাইবার পর। সকল প্রকার উদ্ভেদ বিশিষ্ট রোগেই এই ওষণ উপত্বক পড়িয়া যাইয়া নৃতন চর্ম উৎপাদনে সাহায্য করে! নথের পীড়া (সিলিশিয়া উৎকৃষ্ট ওষণ)। কেশ পতন। মন্তক হইতে পীতবর্ণ, আঠা আঠা প্রময় প্রাব নিঃসরণ।

ক্রের।—সকল প্রকার জরেই সন্ধার প্রাক্তণ উত্তাপের বৃদ্ধি বিশেষ উপযোগী। ত্রু বৃদ্ধিত হয়, তাহাতেই এই ওয়ধ বিশেষ উপযোগী। ত্রু, ঘর্মশ্রু ত্রু বৃদ্ধিত হয়, তাহাতেই এই ওয়ধ বিশেষ উপযোগী। ত্রু, ঘর্মশ্রু ত্রু বৃদ্ধিত হয়, তাহাতেই এই

নিদ্রা। অতি সুম্পষ্ট স্বগ্ন (vivid dreams)। নিদ্রাকালে মুখ-চাপা বোবার ধরা)। অত্যন্ত অস্থির নিদ্রা। পুনঃ পুনঃ ও অতিপ্রত্যুখে নিদ্রা হইতে জাগরণ।

শিশুলা।—যে কোন প্রকার প্রাদাহিক রোগে জলবং পীতবর্ণ অথবা সবুজ ও পুষময় প্রাব থাকিলে ইহা ব্যবহার্যা। সন্ধার প্রাকালে এবং উষ্ণ গৃহে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি এবং শীতল বিমৃক্ত বায়ুতে হ্রাস এই ঔষধের বিশেষ পরিচালক লক্ষণ। যে সকল রোগ রক্ত বিষ্ণুষ্ট হওয়ার ফলে জন্মে, তাহাতেই ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। কোন প্রকার চর্মারোগ বিসয়া গিয়া গুরুতর লক্ষণ বা রোগ উপস্থিত হইলে ইহার একান্ত প্রয়োজন। বেদনা বা রোগেব স্থান-বিচরণশীলতা (wandering pain) ইহার অপর প্রয়োগ-লক্ষণ। কালী-মিউর প্রয়োগে কোনও রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, তৎপর এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল দর্শে।

ত্রহান ।— স্বলার এই ঔষধের ৬ × ও ১২ × ব্যবহারের বিধিদেন।

ব্রুবাবস্থায় (লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে) এই ঔষধ পুনঃ পুনঃ উষ্ণুজ্বলে

গুলিয়া প্রয়োগকরা কর্ত্তব্য (ফিরম-ফ্স সহ পর্যায়ক্রমে)। এই
সময় রোগীর স্বর্বাঙ্গ উষ্ণ বস্ত্রে মার্ত রাথা কর্ত্তব্য। প্রধান প্রধান

চিকিৎসকগণ মস্তক্তকের রোগে (যথা রুখি বা খুস্কী ইত্যাদি)

ইহার বাহ্যপ্রযোগের বিধিদিয়া থাকেন।

সাহা হা ।—পলদেটিলা ইহার প্রায় সমপ্তণ উবধ। উভয়ের অধিকাংশ লক্ষণেই বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি এবং শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম বোধ, উভয় ঔষধেরই লক্ষণ। শ্লৈত্মিকঝিলীর প্রাবের প্রকৃতি, জিহ্বার লেপ, আমাশয়ে পূর্ণতা ও গুরুত, সামান্ত ঠাণ্ডা লাগিলেই স্বরভঙ্গ, অঙ্গপ্রভাঙ্গের বেদনা, রাজিতে ও উষ্ণভায় উহার বৃদ্ধি, ছৎপিণ্ডের দপদ্পানি, সায়ুশ্ল বা বাতের বেদনার স্থান-বিচরণশীলতা ইত্যাদি বছ লক্ষণ উভয়েরই একরাপ। পসসেটিলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা সিয়াছে বে উহার ভিতর কালী-সলফ, কালী-ফস ও

ক্যান্ধ-ফন বিভাষান আছে। পলসেটিলার শ্লেমা-লক্ষণ সম্ভবতঃ উহার অভ্যন্তরন্থ কালী-সলফের দরুল, এবং উহার মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণ সমূহ কালী-ফসের দরুলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কালী-মিউর প্রয়োগে সম্যক ফল না পাইলে তৎপর কালী-সলফ ব্যবহারে বেশ উপকার দর্শে। ত্বের আরক্তরা ও কল্যানে এসেটিক এসিড, আস ক্যান্ধ-কার্ম্ব, ডলিকোস হিপার, পলস, রস. সিপিয়া, সিলি, সলফার ও আটিকার সহিত্য তুলনীয়।

বধিরতা, আমাশয়ে বেদনা, বক্ষে ঘড় ঘড় শদ ও প্রভৃত শ্লেমা
নিঃসরণে নেট্রাম-মিউরের সহিত তুলনীয় নেট্র'ম মিউরের শ্লেমা
কালী-সলফ অপেক্ষা তরল থাকে। নেট্রাম-মিউরের শ্লেমা খেড
বর্ণের কিন্তু কালী-সলফের শ্লেমা পীত বা পীতাভ-সব্জবর্ণের।

ম্যাগ্রেশিয়া ফসফরিকা।

Magnesia Phosphorica.

ইহার অপর নাম ফসফেট্ অব ম্যাগ্নেশিয়া। পেশীর ও স্নায়্র শ্বেতস্ত্রে (white fibres of muscles and nerves) প্রধানতঃ এই
পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্নায়ু এবং পেশী বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন
বর্ণের সৌত্রিক-পদার্থের সমবায়ে নির্মিত হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন
প্রকারের স্ত্রে আবার বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য সাংসাধিত করিয়া থাকে।
এক একটীর কোনও বস্তুবিশেষের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ
ও আছে। ইহার সহিত দেহস্থ আগুলালিক পদার্থ মিলিভ হইয়া
পেশী ও স্নায়্র শ্বেত স্ত্র সমৃহ (white fibres) নির্মিত ও পরিপৃষ্ট

হইয়াথাকে। শরীরে এই ম্যাগ্লেশিয়া ফ্সফরিকমের নুন্যতা ঘটিলেই পেশী ও স্নায়্র শ্বেভস্তা সকলের সক্ষোচন জন্মে। অতএব শরীরের সঙ্গোচন জন্ম কোন রোগ জন্মিয়াছে দেখিলে, অমনিই বুঝিবে যে শরীরে ম্যাগ্রেশিয়া-ফসফরিকমের অভাব জন্ম এরূপ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে এই পদার্থ সেবন করিতে দিলে চমংকার ফল দর্শে।

আময়িক প্রয়োগ।

পেশী বা স্নায়ুর সক্ষোচন সহকারে অনেক সময় হলফুটান, চিড়িকমারা বা তীক্ষ তীর-বিদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। পেশীর শেবস্থ্যে ম্যাগফদের অভাব নিম্নবন যথন পেশীর সক্ষোচন জন্মে, তথন উক্ত সক্ষোচন জ্বন্ধ বোধক-স্নায়ুতে (sensory nerves) চাপ লাগে। বোধক-সায়ুতে এই চাপের জন্তই প্রোলিখিত প্রকারের বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। পাকস্থলীর (stomach) পেশীর ঐরূপ সক্ষোচন জন্মিলে পাকস্থলীর গহরর (cayity) মঙ্কুটিত হইয়া ছোট হইতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি উহাকে সন্ধ্রুতিত হইজা ছোট হইতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি উহাকে সন্ধ্রুতিত হইজা দোট পাকস্থলীর অভ্যন্তরম্ভ বস্তু বিশেষের সাহায্যে এক প্রকার গ্যাস উৎপাদন করিয়া উহাকে ক্ষীত করিয়া রাখে। এজন্ম উদ্বে বায়্ সঞ্চয় সহ শূল বেদনাবৎ বেদনা থাকিলে ম্যাগ-ফস উষ্ণজ্বলের সহিত্ব মিপ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ থাইতে দিলে অতি সম্বর উপকার পাওয়া যায়।

ম্যাগ্রেশিয়া-ফদের সহিত ক্যান্ধেরিয়া-ফদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এজন্ম অনেক স্থলে শরীরে ম্যাগ্রেশিয়া-ফদের অভাব ঘটিলে প্রস্তৃতি (Nature) ক্যান্কেরিয়া-ফস হইতে অংশবিশেষ লইয়া উহার অর্থাৎ ম্যাগ্রেশিয়া-ফদের অভাব পূর্ণ ক্রিভে চেষ্টা করে। এজন্ম ম্যাগ্রেশিয়া ফসের অভাব সূচক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় ক্যাল্ডেরিয়া-ফসেরও অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এরপস্থলে ম্যাশ্মশিয়া ফসের সহিত পর্য্যায় ক্রমে অথবা উহার সহিত মি শ্রত করিয়া ক্যাল্ডেরিয়া-ফস প্রয়োগ করিলে অভিশয় স্থফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আক্ষেপ (spasm) সংযুক্ত যাবতীর রোগে (বগা, পেশীর থালধরা, তড়কা, দাঁত কপাটি, ধমুষ্টকার, মৃগী, শ্ল, পেশীর আক্ষেপ জন্ম মূত্ররোধ পক্ষাঘাত, শিশুদিগের উদরের স্ফীততা সহ বেদনা, হুপিংকফ ইত্যাদি) ইহা প্রায় অবার্থ। কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগে ইহা দারা ৩।৪ সপ্তাহে উৎকৃষ্ট ফল দর্শিতে দেখা গিয়াছে। পাকস্থলীর বামদিকের স্ফীততা (distension) জনিত সংপিশ্ভেব দপদপানি প্রভৃতি সর্ব্ধপ্রকার উপদ্রবে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ক্ষণকাল স্থায়ী, সবিরাম, চিডিকমাবাবৎ বা হুলফুটানবৎ থালগরার ক্রায় অথবঃ টানিয়া ধরা বা ছিডিয়া ফেলার ক্রায় বেদনাযুক্ত হে কোন রোগে ইছা প্রায় অবার্থ। পুর্ব্বোক্ত প্রকারের বেদনা উষ্ণপ্রয়োগে ও প্রচাপনে উপশ্যিত হইলে ইহা সবিশেষ উপযোগী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ

আৰু ।—মানসিল বিশৃগুলা সহকারে ইন্সিরের বিভ্রম। বিশ্বতি ও কোনবিষয় সহজে ব্ঝিতে অক্ষমতা। যন্ত্রণায় বিলাপ করা। বেদনা সহ হিকা, তজ্জন্ত সর্বাদাই বিলাপ করা। রমণী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে অথবা একাকী কথা বলে (talks to herseli); একস্থান হইতে অগুস্থানে বস্তু সকল বহন করিয়া নেয়।

মস্তক।—সায়বীর শিরংপীড়া সহকারে দৃষ্টিবিভ্রম। তীব্র, তীরবিদ্ধবৎ, ভল্লাঘাতবৎ, সবিরাম এবং আক্ষেপিক বেদনাবিশিষ্ট শিরং- পীড়া। শিরংপীড়া সহকারে শীতামুত্তব, বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের অত্যন্তর দিয়া। শিরংপূল (ফির-ফস)। সকল প্রকার শিরংপীড়ারই প্রচাপনে এবং উত্তাপে উপশম এবং শীতলতার বৃদ্ধি। মন্তকে বিদ্ধকরণের তার বেদনা। গ্রীবা-পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা। মন্তকের অনৈচ্ছিক কম্পন (কালী-ফস)। শিশুদের কনভলসন। স্নারবিক শিরংপীড়া। মন্তকপৃষ্ঠে বেদনা আরম্ভ হইরা সমগ্র মন্তক পর্যন্ত ছডাইরা পড়ে, তৎসহ বিবমিয়া ও শীত শীত অমুভব। মন্তকে প্রচুর খুস্কি। প্রচাপনে ও বিমুক্ত বায়তে বিচরণে শিরংপীড়ায় কতকটা উপশম। মানসিক শ্রমের পর বৃদ্ধি। মন্তকে তাব্র বেদনা, বিশেষতঃ স্কুলে গেলে বা মানসিক শ্রমের গর। মন্তকশীর্যে বা মন্তক-পৃষ্ঠে বেদনা এই বেদনা মেরুদণ্ড পর্যান্ত প্রসারিত হয়। স্কর্বয়ের মধ্যেই বেদনা বিশেষভাবে অমুভূত হয়। মনে হয় মন্তিক বিদীর্ণ হইরা মন্তিদ্ধ স্থানা ভ্রেট হইরাছে।

চক্রা।—চক্র পাতার পতন (কালী-ফন)। সমুচিত চক্ষ্তারা;
চক্র সম্বাথে ক্স ক্স বিদ্যু ও নানা বর্ণ দেশ, দৃষ্টি বিভ্রম,
আলোকে বিদ্নেব দিন্ত-দৃষ্টি আলোকের বিদ্রিষ্ট বর্ণ দর্শন ইত্যাদি।
চক্র পাতার আক্ষেপিক স্পানন (ক্যাব্য-ফন), চক্র সায়ুশ্ল,
(দক্ষিণপার্শ্বে বৃদ্ধি) তির্য্যকদৃষ্টি (প্রায় সকলপ্রকার চক্ষু রোগেই
ক্যান্থ-ফন আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ)। অভিশয়
বদনা ও চক্ষ্ হইতে প্রভূত জলপ্রাব লক্ষণ থাকিলে ফ্রাট-মিউর
ব্যবস্থ্যে। অপ্টিক-নার্ভের চর্কলতা জনিত অপরিচ্ছর দৃষ্টি
(কালী-ফন)। পাতার গুরুজ। অক্ষি-কোটর ও তদ্দ্রের সায়ু
শ্ল; বিশেষতঃ দক্ষণ পার্শের। উষ্ণতায় ইহার উপশম।

ব্রুল্।—শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা। সায়বিক কারণ জনিত অথবা

আক্রেপিক কর্ণশ্ল। উত্তাপে উপশম; সকল প্রকার বেদনারই শীতলতার বৃদ্ধি ও উষণ্ডার উপশম। দক্ষিণকর্ণের স্নায়ৃশ্ল, শীতলজ্লে মুখ ও কর্ণ প্রকালনে এই বেদনার বৃদ্ধি।

নাসিকা—প্রতিশার (সর্দি) বাউত ঘাণশক্তির বিলোপ।
নাসাবক্দ্ধতা ও পুনঃ প্রচুর আবনিঃসরণ। বাম নাসায় জালা ও
কতিবৎ বেদনা) মন্তকের প্রতিশার, আব একবার শুকাইয়া যায় ও
তরল হইয়া পুনরায় নিঃস্ত হয়।

বিহাতের ভায় বেদনা; ম্পর্শে ও শীতলতায় উহার বৃদ্ধি এবং উষণতায় উপশম। আমবাতিক বেদনা (ইহার সহিত চক্ষু হইতে জলপ্রাব লক্ষণ বিভামান থাকিলে, স্থাট-মিউ)। অক্ষি-কোটরের উপরের বা নিমের স্থায়, শুল। দক্ষিণ পার্শের উপরের মাড়িতে বেদনা এই বেদনার কপাল বা কর্ণ পর্যান্ত সম্প্রশারণ। ম্পর্শে, হাঁ করিলে বা শীতল বাতাসে উহার বৃদ্ধি।

মুখ্য মধ্য — মৃথের এবং ওঠের কোণের (angles of mouth)
আক্ষেপিক স্পন্দন। ধর্মপ্রহারের আক্ষেপ, আক্ষেপিক ভোঁতলামি;
খীরে ধীরে এবং দন্তাবৃত করিয়া কথা বলা। হন্নন্তন্ত (দাত কপাটি);
এই রোগে থানিকটা ঔষধ গরম জলে গুলিয়া আভ্যন্তরিক সেবন এবং ঘন ঘন মাড়িতে মর্দন বিশেষ ফলপ্রদ (পরীক্ষিত) মৃথের কোণ ফাটা।

দ্কে;—শিশুদিগের দক্তোদ্তেদকালীন দড়কা, আক্ষেপ ইত্যাদি (পর্যায়ক্রমে ক্যাক্ষ-ফল)। তীত্র তীরবিদ্ধবৎ, আম্বাতিক ও আক্ষেপিক বেদনা বিশিষ্ট দন্তশূল, উষ্ণভায় উপশ্ম (শীতলতায় উপশ্ম হইলে ফির্-ফল, ব্রাই; কফি); ম্পর্শে ও শীতল বাতালে অভিশয় দেব। দন্তপুল সহকারে মুখমগুলের সায়ু-পুল উত্তপ্ততায় উপশম;
থোঁচামারার স্থায় বেদনার সবিরামতা। দন্ত বেদনার ম্যাগ-ফস
বিফল হইলে ক্যাল্ক-ফস প্রয়োগ করিবে। শ্যায় গেলে দন্ত বেদনার
বৃদ্ধি ; এই বেদনার সত্র স্থান পরিবর্তন। ক্ষয়প্রাপ্ত-দন্তে 'মগবা
দন্ত চিকিৎসক দ্বারা পরিপুরিত দন্তে (filled teeth) তাঁত্র বেদনা।
দন্তের ক্ষতসহ গলা, মাড়ি ও জিহ্বার গ্রন্থির স্ফাততা।

জিহবা।— আমাশরে বেদনা সহ পরিষ্ণার জিহবা। অতিসার সহ জিহবায় খেতলেপ। মুথক্ষত সহ জিহবার আরক্তা। মুথক্ষত জন্ম আহারে কষ্ট।

গল-মধ্য-কঠের আকুঞ্চন; শ্বাস-নলীর আক্ষেপ বশতঃ গলরোধ। ঢোক গিলিবার চেষ্টার শ্বাসরোধের আশক্ষা। আক্ষেপিক কাস। গল মধ্যে সক্ষোচন অনুভব। কথা বলিবার অথবা গান করিবার সময় ২ঠাৎ কর্কশ স্বর বাহির হইয়া পড়ে (কালী-ফ্স)। ঘ্যাগ। তরল দ্রব্য গান করিবার চেষ্টা কালে গলার আক্ষেপিক সক্ষোচন।

ত্রাক্রাল বানাশরের সায়্শুল। জিহ্বার পরিছয়তা; উত্তাপ অথবা প্রচাপনে বেদনার উপশম। আমাশয়ের আক্ষেপ, ওজ্জয় আকুঞ্চন অথবা মোচড়ানবং বেদনা; মনে হয় দেহ কবিয়া বাজা হইয়ছে। অপাক, অপবিপাচিত পদার্থ পেট কামড়ানির উৎপত্তি করে। পরিয়ত ভিহ্বা (ফির কস)। অত্যধিক বেদনা অথবা আমাশয়ের পেশীর সম্মোচন বশতঃ বমন। স্বিরাম, আফেপিক বেদনা। নিন্চিনে বেদনা মহকাবে বাতোলগার। উষ্ণ পানীয় গ্রহণে উপশম। অয় অথবা শীতল পানীয়ে রিজ। দিবাবাত ছদিমা তিক। ও তৎসহ ব্যন। ভৃত্জেরা বমন হইয়া পড়িয়া যায়। হদাহ। ব্রজালা; পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্চয় ও তৎসহ অয়িমান্য।

জালাকর ঢেকুর। আমাশয়ে বায়ু সঞ্চয় জন্ম জন্ম জন্ম জন্ম ক্ষা ক্রিছার দপদপানি ও অন্থিরতা ক্রুত্ব।

তদ্রে এবং সবে।—উণ্বে তাঁর মোচডানবং বেছনা সহকারে রক্তামাশয়, এই বেছনা উত্তাপে, ক্রচাপনে ও সম্মুখিদিকে অবনত হইলে রাস প্রাপ্ত হয় (কালা-মিউর)। চিৎ হইয়া শয়লে অসমর্থতা।
নাতা হততে বেছনা চাবিদিকে চড়াইয়া পড়ে। সবিরাম, আফেপিক বেছনা। শিশুদিগের উদর বেছনায় অভিশা চিৎকার করে ও পাউপরের ছিকে টানিয়া আনে। উপরে কামড়ানবং বেছনা ও বাতোলগায়।
উদরের অভিশয় ক্ষাতভা সহকারে বায়ু নিঃসরণ। উদরে অভিশয় মোচড়ানবং বেছনাসহকারে জলবং অভিসার, অভিশয় বেগে মল বাহির হয়। প্রবল কর্তানবং ও ঘোচামারার আয় বেছনা সংযুক্ত অর্ল। সম্মুজাত শিশুদিগের বায়ু সঞ্চয় জনিত উদর বেছনা। চাকেয়ভায় উদরের ক্ষাতভা, তজ্জ্য কাপড় চিলা করিয়া দিতে হয়।
সামান্ত বিচরণ করিলে বায়ু নিঃস্ত হয় ও উহাতে কিছু উপশম বোগ করে। মলত্যাগের পূর্বের উদরে মোচড়ানবং বেছনা; মলত্যাগের

সক্ষপ্রকার অভিসার, রক্ষাতিসার, স্নায়-শূল এবং অন্তের প্রদাহে, পুনঃ পুনঃ প্রভুত উষ্ণ জলের পিচকারী প্রদান বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতে অন্ত্র ধৌত ও পরিষ্কৃত হওয়ায় সম্বর বেদনার আশ্চর্যার উপশ্বম জন্মায় এবং বিধান সমূহের (টিগু) স্বাভাবিক আশেশ্যণের (absorption) সাহায্য করে। ফলবং অভিসার, তৎসহ পামের ডিমে থালধরে। মলত্যাগকালে শীত শীত অন্তব এবং পাকস্থলীতে বেদনা। অর্ণরোগে বিহ্যতের তার ও ক্তিনবং বেদনা; বেদনার

তীব্রতা এত অধিক যে তর্জন্ত সমন্ত্র সমন্ত্র ব্রাগীর মৃদ্র্য জন্ম।
উদরে এবং মল্লারেই বেদনার আধিকা। প্রতিবার মল্ত্যাগকালেই
মল্লারে বেদনা। শিশুদের কোঠকাঠিত সহ প্রতিবার মল্ত্যাগকালে
উদরে আকেপিক বেদনা। এজন্ত প্রতিবার মল্ত্যাগকালেই শিশু
চিৎকার করিয়া উঠে। শিশুর উদরে অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্জর
ও তজ্জন্ত কল কল্ শক। শুদ্ধ, কঠিন, মলিন বর্ণের মল, এই মল্লিঃসারণে খুব কণ্ঠ হয়। পাতলা মল সজোরে ও সশকে নির্গত হয়।

মুক্রা-মুত্রের আক্ষেপিক অববাধ (পর্যায়ক্রমে ফির-ফন)।
মৃত্রাশয়ের গ্রীবার (neck of the bladder) এবং মৃত্র-পথের
আক্ষেপ জন্ম প্রস্রার ত্যাগকালে অভিশন্ন কন্ত ও জালা (ফির-ফন,
কালীফন)। মৃত্রাশ্বরী (stone) নি:সরনকালে বেদনা (ন্যাট-সল)।
দণ্ডার্মানাবস্থায় ও বিচরণকালে অবিরাম মৃত্রবেগ। শিশুর অধিক
পরিমাণ মৃত্রন্থাগ। সায়বিক কারণে শিশুর রাত্রে শ্যাায় মৃত্রন্থাগ।
ক্যাথিটার ব্যবহায়ের পর মৃত্রমার্থের সায়শূল। মৃত্রে ফনফেট
অধ:ক্ষেপ অথবা উহার স্ক্রন্থা মৃত্রাশ্বরী (gravel)। সক্রমেন্ডার
প্রাবন্ধা। মৃত্রে ফন্ফেটের অভাব বা আধিক্য।

প্রতিক্র করিলে বাধক বেদনা (ঋতুকালীন উদর-বেদনা)।

এই রোগে বেদনা নিবারণার্থ কালী-ফনও বাবহৃত হয়। ইহা নিয়মিতরূপে বাবহার করিলে বাধক বেদনার পুনরাক্রমণ নিবারিত হয়
(ফির-ফন)। প্রসব বেদনার স্থায় উদর বেদনা এবং বাহ্যোন্ডাপে
উহার উপশম। ডিম্বাশয়ের (ওভেরিস) স্নায়শূল। যোনিমুথের
অনৈচ্ছিক আক্রেপিক অবরোধ ও তজ্জ্ঞ সঙ্গমক্রিয়ায় অসমর্থতা
(ভ্যান্তাইনিস্মাস)। এই রোগে ফির-ফনও বাবহৃত হয়। ঋতুর
পূর্বে উদর বেদনা। ডিম্বাশয়ের (ওভেরি); বিশেষতা দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের

শারুশূল বা প্রদাহ। মেলুনাস ডিসমেনোবিয়া। (ইহারার বছ রোগী আরোগা হইয়াছে)। ানয়ামত সময়েব বছ পূর্ব্বে প্রত্যাগত, ঝতু; ঝতু রক্তের মালনতা ও রজ্জুর ন্তায় প্রকৃতি। বাহা-শ্রী-কঙ্গের কীততা। সমগ্র নিম্নোদরে আক্ষেপিক বেদনা। উভয় ডিয়াশয়ে (ওভেরি) এবং কটিতে বেদনা। মালনবর্ণ সংযত রক্তপ্রাব। এই ঔষধ সেবনকালে উদরে উষ্ণ সেকদিলে ও উষ্ণকলে গুলিয়া ঘন ঘন এই ঔষধ সেবন করিলে অতি শীঘ্র ফলদর্শে। জ্রায়ুর বেদনার ইলা একটা ত্ত্যাবশ্যকীর প্রধান ঔষধ।

গভ :- আক্ষেপিক প্রস্ববেদনা; প্রস্ব বেদনার সময় হস্ত-পদের থলা। প্রস্ব বেদনার অভিশয় তীব্রতা। আক্ষেপ (কালী-ফদ স্রাইবা)। প্রস্বাস্থিক কনভলসন। জরায়ুর অভিরিক্ত সন্দোচনে ইহা ব্যবহার করিলে জয়ায়ু শিথিল হইয়া থাকে। ফুলেক অস্বোধ (retained placenta)।

প্রাক্রি—খাস-কাস সহকারে বাতোলারে; বক্ষোবেদনা; বক্ষঃ
হলের ও গণার আকুঞ্চন, এজন্ত রোগী উঠিয়া বসিয়া পাকিতে বাধ্য
হয় (উষ্ণ জল পান উপকারী)। আক্ষেপিক, নিষ্ঠীবনপরিশ্রু, কাস
এবং আবেশে আবেশে উহার উপস্থিতি। বক্ষে তাঁত্র বেদনা, খাসপ্রখাদের হুত্রতা (ফির-ফন)। ছপিং কাফ (কালী-মিউর)। পুরাতন
রোগে ধৈর্ঘ্য সহকারে দীর্ঘকাল ব্যবহার্য। স্বর্বন্ত-মুখের (মাটিস)
আক্ষেপ। বক্ষ বলের আকুঞ্চন সহকারে নিষ্ঠীবনপুত্র (অথবা স্বর্ন
নিষ্ঠীবনযুক্ত) কাসের পুনঃ পুনঃ উপস্থিতি বা আবেশ। রাত্রে
আক্ষেপিক কাস; শুইমা থাকিনে বুজি, সঞ্চলনে বক্ষ-বেদনার বৃদ্ধি।
বুকে খোঁচামারার ভার বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ পাথে।

শান-যজের পেশীর ছকলিতা। খাস-ত্যাগের পর আর খাস গ্রহণ করিতে পারিবেনা বলিয়া মনে হয়।

ব্রক্তি সন্থান্ত হাত্র অসহা বেদনা জনিতে আকেপ।

শরীরের কোনও হাত্র অসহা বেদনা জনিলে উষ্ণ জলের সহিত

পূনঃ পূনঃ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। হংশূল।

শার্ষবিক কারণে হৃংপিভের দপ দপানি। বামপার্শে শরনে উহার হু স।

পাকস্লীতে বাস জানাবার ফলে সংপিশ্রের দপ দপানি ও উংকণ্ঠা।

কাপড়ের মধাদিয়া হৃদগ্রের দপদপানি দেখা হায় (apex beat visible through clothing)।

প্রান্ত প্রান্ত প্রান্ত প্রান্ত বিশ্বনা লাল্ল প্রান্ত প্রান্

আ্মিশুলা — হন্তের অনৈচ্ছিক কম্পন। জাগ্রতাবহার অবিরত হন্ত, বাহু, মন্তক বা সমগ্র শরীরের কম্পন। যে কোন কারণ ছইতে সমুৎপদ্ম মুগী রোগ (এপিলেন্সি)। তাণ্ডব রোগ (কোরিয়া)।

শাভকপাটি (লক-জ) রোগে উঞ্জলের সহিত পুন: পুন: ব্যবহার্য।
থানিকটা ঔষধ (চূর্ণ) মাড়িতে মর্দ্দন করিলেও বিশেষ ফল দর্শে।
লক্ষালক আয়ুর (মোটর নার্ড) আক্ষেপ। পিয়ানো বা বেহারাবাদকের হন্তের আক্ষেপ।

সকল প্রকার স্নায়বীয় রোগেই কালী-ফসেব দক্ষে তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্ব্য। অতি লেখকদিগের অসুষ্ঠ ও ভজ্জনীর পেশীর আক্ষেপ (রাইটাস্ক্র্যাম্প)। রাজিতে হাত-পায়ের পেশীব থল্লী। সায়ুর অসম্যক পরিপোষণ-জনিত রোগীর অভিশ্য শীণতা ও হর্কলতা (কালী-ফস)। স্পাশ্-জ্ঞানের বিলোপ।

প্রত্ব :— সায়বিক কম্পন ও তৎসহ দাঁত ঠক্ঠিক (কালীফস)।
শীত ও গল্পী সংযুক্ত জন (ফির-ফস)। পায়ের ডিমে গল্পী সংযুক্ত স্বিরাম
জন। মেরুদণ্ডের মধাদিয়া উচ্চ ও নিয়াভিনুথে স্ফর্মান শীত।
ডিনার খাইবার পর অপরাহ্ণ ৭ ঘটকার সময় শাত শীত কলুভব।
শীতের পর খাসে কটা রাত্রি ৯ ঘটকায় প্রবণ শীত; পৈত্রিক জন;
প্রভৃত ঘর্ম।

বিদ্রো।—নিদ্রাপৃতা ও হাঁইতোলা। হাঁই তুলিবার কালে গহবর হইতে হয়র (চোয়ালের) বিচ্যুতি। হর্কণ্ডা অথবা মাস্তম্বের পরি পুষ্টির অভাব বশতঃ অনিদ্রা।

নতা ।—এই ঔষধের সমস্ত লক্ষণ উরোগে, প্রচাপনে, ঘর্ষণে এবং সম্থাদকে অবলীর্ষ ১ইলে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শীতণভায়, শীতণ বাতাস প্রভৃতিতে বর্দ্ধিত হয়। শনীরের দক্ষিণ ভাগ বিশেষভাবে আক্রান্ত হইলে ইহা সমধিক উপযোগী। শিরোঘূর্ণন, শিরংপীড়া প্রভৃতি মন্তক লক্ষণ থোলা বাতাসে উপশ্যিত হইরা থাকে। এই

खेर्य वावशत काल विषनाकां खान छेयः तक पिल खेरायत ক্রিয়া সমধিক বৃদ্ধিত হয়। ম্যাগ্রুসের অভাব ঘটলেই, যে কোনও বিধানে (টিস্ক) ধলী এবং স্নায়ুশূল উৎপন্ন হয়। অতএব ঐ সকল द्धार्भ हेट^१ यावशांत्र कतिरण स्नान कण नर्ण!

व्यच्या -- प्रमात हेरात ७× क्य वावशायत विधि (प्रमा उँ४८ কলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে ইহার ক্রত ক্রিয়া দর্শে। ৬× প্রয়োগ করিয়া কথন কথন আশান্তরূপ ফল না পাইলে ১× এবং ২× প্রভৃতি নিম ক্রম ব্যবহার করিয়াও সময় সমর ভাল ফল পাওরা গিয়াছে। ডা: মর্গান শূলবেদনায় ইহার ৩০ 🗙 ক্রম উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া পুন: পুন: দিতে বলেন। ৬× প্রভৃতি নিম জন ব্যবহার করিয়া আশানুরপ ফল না পাইলে উচ্চ ক্ম (৩০ 🗴) ব্যবহার করা কর্ত্তবা। আমরা ৬× ক্রম ব্যবহার করিয়া প্রায় সক্ষতই চমৎকার ফল পাইয়াছি।

সম্ব্রা—সাম্বিক রোগে, বিশেষতঃ সাম্ব শূলে অমোধ खेराध व'लाम এই खेरा विस्मय शाम्लिक कत्रियाहाः এই श्रा हैशद ममकक छेयस कानी-कम। कानी-कम ও म्राग-क्रम পार्थका এই বে, কালী-ফ্স মন্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রধান পরিপোষক (nutritive) রূপে ও মাগ্-ফদ আক্ষেপনিবারকরপে (antispasmodic) ব্যংস্ত হইয়া থাকে। এই উভয়ের উপচয় ও উপশ্মের ও পার্থক্য আছে। কাল্য-ফলেব বেদনা ও উপসর্গ শীরলভায় উপশ্যিত হয়, আবার ম্যাগ্-ফ্দের বেদনা উঞ্চায় উপশ্যিত ১য়। ম্যাগ-ফ্দের বেদনার সহিত কলোগিছের বেদনা এবং উহার উপচয়-উপশ্মের সম্পূর্ণ माष्ट्रभ पृष्टे हदेशा थाएक। व्याम्हर्सात विषय अहे, करनामिरम्त्र मरश

শতকরা ৩ ভাগ মাাগ-ফদ বর্ত্তমান আছে। ম্যাগ-ফদের আমাশরে (stomach) বায়ুদঞ্গলনিত উদর বেদনার সহিত ডায়াস্থোরিয়ার কতকটা সাদৃশ্য আছে। জেলসিমিয়মও ইহার একটা সমগুণ ঔষধ। হিষ্টিরিয়া, হাইপোক্তি য়েসিম, স্পাইক্তাল ইরিটেশন প্রভৃতি রোগে ইহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করা করিয়। মেরুদ্ধের অভাস্তর দিয়া শীতের উত্থান ও অবন্যন উভয়েই বিশ্বমান আছে। আক্ষেপে (spasm) বেলেডোনার সহিত ইহার विष्म मानुश পरिष्ठ हेरेया थाकে। विष्णु नाषात्रा कन ना भारेत তৎপর ইহা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। প্রসারিত অক্ষিতারা, বিঘূর্ণিত একদৃষ্টি এবং সামাক্ত শব্দে বা সহজেই চমকিত হট্য়া উঠা, উভয়েই বিস্নান আছে। তির্ধান্দৃষ্টিতে, বিশেষতঃ উহা যদি ক্লমি জন্ম উপস্থিত হইয়া থাকে; তবে নেট্ৰাম-ফদের দহিত ইহা তুলনীয়। জলবৎ স্থাব এবং উদরাময়ে নেট্রাম-মিউরের সহিত, মুগীরোগে কালী-মিউর, ক্যাল্ক-ফস ও দিলির সহিত; শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের রোগে বেল, ব্রাই, চেলিডোন, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, লাইকো, এবং পড়োর সহিত ; প্রচণ্ড বেদনায় বেল ও ক্যামোর সহিত ; সত্তর বেদনাব স্থানবিচৰপশীলভায় পলস, কালী-সলফ ও ল্যাক-কানেব সভিত ; সকোচন বা মোচড়ানবৎ বেদনায় ক্যাক্টাস, ক্যাক্ষ, আয়েড ও সলফের সহিত তুলনীর। ইহার রজঃশূল ও প্রাস্ববেদনা অনেকটা ভাইবার্ন ও পলসেটিলার ভার। কিন্তু পার্থকা এই যে, ম্যাগ-ফলের বেদনা উদ্ভাপে উপশ্মিত হয়, অপর হুইটাতে তাহা হয় না। সিমিসিফুগার বেদনার সহিতও ইহার কতকটা সাদৃশ্র আছে বটে, কিন্তু সিমিদির বেদনা একভাবে থাকে. আর ম্যাগ ফদের বেদনা আকেপিক প্রকৃতির, থাকিয়া থাকিয়া আকেপিক বেদনা উপস্থিত বয়। আরও, মাগি-ফদ দ্বারা ডিবাশর, জবায়ুর মূলদেশ (fundus) প্রভৃতি গভীর ধ্রা দকল আক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু দিমিদি দ্বারা লিগামেন্ট প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। মেছেবংদ ডিদমেনেরিয়য় মাগি-ফদ ব্যবহা কবিবার কালে বোবারা, নাগেটিক এফড কটবার্ণম ওপ্রশাসেক কথা আরণ কবা কর্মনা। লোবেলিয়া, সিফ্টেটম ট্রামো এবং ভাইবার্ণম প্রভৃতি উদ্ভিদে ম্যাগি-ফ্য বিহন্তান আছে। এজঞ্চ ইহাদের হক্ষণ সকল মধ্যে বছ লক্ষণেরই সাদৃশ্য পরিগক্ষিত হইয়া থাকে। রাত্রিকালীন স্নায়ুশুল ও উহার উহাপে উপশ্যে আর্সের স্থিত এবং সাধানে স্নায়ু-মণ্ডলের রোগে জিল্পের স্থিত ম্যাগি-ফ্রের ভূলনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

বিষয় গুলা—এই ঔষধ বেলেভোল জেলন ও ল্যাকেসিসের ক্রিয়া-হারণ।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকম।

Na rum Mu iaticum

ইহার অপর নাম সোডিঃম ক্লোরাইড ; বাজালা নাম লবণ ; সংক্ষিপ্ত নাম ভাট-মিউ। ভাব-দেহে ইন-অরগ্যানিক সন্টের মধ্যে একমাত্র ফসফেট্ অব্ লাইম বাতীত এই লবণের ভাগই অধিক।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ

শরীরের শতকরা ৭০ ভাহি জগ। দেহস্থ এই পদার্থের (নেট্রাম-মিউর) আধিক্যের কারণ সহজেই নির্দেশ করা ঘাইতে পারে। লবণ ব্যতীত দেহত এই জল শরীরের কোন কাধ্যেই আইদেনা, বরং এতদভাবে শরীরের পক্ষে উপদ্রবকারী

ছ্ইয়া উঠে। কাজেই লবণ মানব-দেহের একটা প্রধান ও বিশেষ क्षामनीम উপাদান। नवर्णत माश्रासाई क्रम मानव एम्स निर्मः रण জৈবনিক-ক্রিয়া সম্পাদনে এবং দেহ হইতে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নিঃশারণে সমর্থ হয়। দেহে নেট্রাম-মিউরেব পরিমাণ কিঞ্চিৎ ञ्चान आश्र रुट्टन, भन्नीत्रष्ट कन এक विषम গোলঘোগ উৎপন্ন করে। কারণ, যে পদার্থের সাহায়ে ইহা ক্রিয়াশীল হয়, ভাহারই অভাব ঘটিগাছে। সন্ধি-সন্মি রোগে সোডিগ্রম ক্লোৱাইডের ন্যুনতা বশতঃ শ্রীবের অখ্যান্ত স্থান হইতে (বিশেষতঃ গ্রীব:-পৃষ্ঠ হইতে) জলীয়াংশ আশোষিত হইয়া মন্তিক্ষের ভূমিদেশে সঞ্চিত হয় ও উহার উপর চাপ थामान करता करण, देश मगत्र मगत्र माश्चा ठिक रुदेश उठि। স্ভাট-মিউর ৩দ ক্রম ব্যবহারের সত্তর ও নিঃদন্দেহে এ সঙ্কটাপর ব্বত্থা দুরীভূত হয়। ডিলিরিয়ন ট্রিমন্স (পানাভ্যয়) রোগও স্ভাট-মিউবের স্বল্পতা নিবন্ধন উপদ্বিত ২ইয়া থাকে। তাহাতেও পুনঃ পুন: এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া এক ঘন্টার মধ্যেই আশ্চর্য্য কল প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। নেট্রাম-মিউরিয়েটিকম্ শরীংস্ লাসকাবাহিনী প্রণাশীতে (লিক্টেক-সিপ্টেম), রক্তে, প্রীহা ও বক্ততে এবং শৈল্পিক্রিকে (মিউকাদ মেম্বেণ) কার্য্য করিয়া থাকে। এজঞ্জ এই সকল স্থানের পীড়ার ইহার প্রয়োগ-সূচক লক্ষণ বিভয়ান थाकित्य देश बाता উड्य क्य पत्नी

দেহে উপযুক্ত পরিমাণ নেট্রাম-মিউর বর্তমান থাকিলে টিশুর ক্রিয়াশীলতা র্দ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং দেহ হইতে ইউরিয়া (urea) নামক বিষাক্ত পদার্থ সংক্ষে নিজান্ত হয়। এজন্ত ক্রফিউলাত্রন্ত বোগীদিগের পুরাতন অবস্থায় গ্রন্থি, জন্ত এবং ত্বক আক্রান্ত হইলে ইহার একান্ত প্রয়েজন। ম্যালেরিয়া এবং উহাতে কুইনাইন

व्यथ-वावशास्त्र कृत्य (य এक अकात्र धाजूताम उद्भन हम्न, जाशांज इहा ব্যবদৃত হয় এবং ইহার ফলে এ দোষ সংশোধিত হইয়ারোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। শরীরের অসম;ক্ পরিপোষণ ও উহার ফলে যে শীর্ণতা জন্মে ভাহতেও ইহা অতিশর ফলপ্রদ। রক্তথীনতা, লিউকিমিয়া (রক্তে খেঁত কণার আধিক্য ও লোহিত কণার হ্র'স), হাইড্রিমিয়া (রক্তে জলীয়াংশের আধিক্য) ক্লোরোসিদ্ (হরিৎপাঞ্) এবং স্বাভি (সরস উদ্ভিজাদি আহার না করার ফলে এই দের্ঘ রোগ জন্মে) প্রভৃতি রোগ যাহা ভুক্তদ্রব্য সমীকংপের অভাবে রক্তের বৈশুণ্য বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে (nutritive defects with their profound blood poverty) ভাষাতে ইয়া বাবহার করিলে রক্তের উৎকর্ষ দাধন করিয়া এই সব অবস্থা দুরীক্বত করিয়া থাকে। মাস্তকবিলীর রসক্ষরণ (serous exudation) ইহার অপর পরিচালক লক্ষণ। প্রচুর লাগা বা অঞ্সাব, এবং জল বা শ্লেমা ব্যন সহ শ্রীরের কোন অংশে বেদনা জান্মলে ইহা সফলভার সহিত ব্যবহাত হয়য়া থাকে। শ্বীরের যে কোন স্থানের স্লৈখিকনিলী চইতে স্বচ্ছ, জলবৎ বা ফেলিল শ্লেম। নিঃস্ত চইলে ইং। অভিশয় উপকারী, কোন কোন স্থানের শ্লৈথ্যিক ঝিলী ১টতে তবল জলবৎ লেখা নি:সরণ, আবার কোনও স্থানের ইম্লিফ ঝিল্লীর শুক্ষতা (যেমন তরুণ প্রতিশ্রায় সহ व्यवण देशां ; नामिका, हक्क् ७ पूथ श्टेल्ड क्रणवर व्याव निःमत्रन, किन्न সর্বাস্ত্রের শ্লৈখ্রিক বিল্লীর শুক্ষতা বশত: কোঠকাঠিক্ত লকণে ইহা ক্ষদিতীয় ঔষধ। এই ঔষধের জিহ্বার লক্ষণও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পরিষ্কার চক্চকে ভিছ্ৰা উহার উদয় পার্শে কৃদ্র কৃদ্র লালাব বুল্দ অথবা ক্ষতি পাঞ্র বিবর্ণ (palid) মরণার্ত জিহবা। মুখে লৰণাক্ত স্থাদ। এই সব দক্ষণ দৃষ্টে নেট্ৰাম-মিউর হ্যবস্থা করিলে অভি উদ্ভন ফল দর্শে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

ক্ষান্ধ ।— যে কোন সময়ে প্রলাপ বকা; সকেণ বা শুক্ষ ও ঝলসানবৎ জিহব। নহকারে রোগীর মৃত্প্রলাপ (বিড় বিড় করিয়া কথা বলা) ও থেয়াল দেখা। অচৈততা ও নিদ্রালুতা। টাইফয়েড বা টাইফঃস্ফিবারে মৃত্র প্রলাপ। পানাতায় (অতিরিক্ত মাদক জব্য সেবন অথবা উহার বির্তি বশতঃ অনিদ্রা ও কম্পুন সংযুক্ত প্রলাপ রোগ) রোগে মন্তিক্ষের শুক্ষ্ তা নিবারণে ইহা সক্ষপ্রধান উম্ম (কালা-ক্স)। বিষপ্রধা আশাশুভাতা ও উন্নমহীনতা। নিহাপ্র সহকারে কোঠকাঠিত বা জলীয় লক্ষণ সমূহের আধিকা; সহজেই অক্রপ্রধান অতীত বিষয়ের প্রলাপ। রোগাতক। যৌবনের প্রাক্তালে বির্দেশ্য । মতিকের গ্রন্থলিতা। মানসিক প্রমে ক্লান্তি অক্তব। ক্লোধ, হাজ্যপারহাস বা গান করিবার প্রবৃত্তি সহ স্নায়বিক উত্তেজনা।

সক্তর্ত প্রথ মন্তব্দ-ব্রক্ত ,—অর্কাবাজের (সংনষ্ট্রাক)
সর্বাধান ঔষধ। কোন কোন স্থানের স্থৈত্বিক প্রাব সংযুক্ত এবং
কোন কোন স্থানের স্থৈত্বিক প্রতিরিক্ত প্রাব সংযুক্ত মাথা
ধরা। শিবংপীড়া সহকারে কোন্তরোধ। শিবংপীড়া সহকারে প্রভূত
অপ্রপ্রাব বা ভিহ্বায় ফেপিল লেপ। কপালে, উভন্ন শত্মদেশে
(temples), অথবা মন্তব্দের একপার্থে বেদনা বিশিষ্ট শিরংপীড়া।
মন্তব্দে রক্ত সঞ্চয় বিশিষ্ট শিরংপীড়ার বিশেষতঃ প্রাত্তংকালে ; নিদ্রান্ন
ইহার উপশন ; এইরূপ শিবংপীড়ার প্রান্থই শত্কালে উপস্থিতি।
পশ্চাৎ-গ্রীবার মাংস-পেশীন মুর্বালতা জন্ত মন্তব্দের সমুথ-দিক্তে

পতনের প্রবণতা। অর্জ-শির:শূল (আধ কপালে মাথা ব্যথা)।
বিদ্যালয়ের বালিকাগণের ঋতুকালান শির:পীড়া, তৎসহ মন্তক-পীর্ষে
জ্বালা। ফেণা ফেণা ও জলবৎ শ্লেমা বমন সহকারে শির: টিয়া। প্রপ্রপ্র ষৌবনা বালিকাদিগের শির:পীড়া; বিশেষণ: ঋতুকালে, তৎসহ মন্তকে
জ্বালা, নিরুত্বম ও জড়তা। নিদ্রালুখা ও অপারত্ত্র নিদ্রা সহকারে
মন্তকে হাতুড়ির আঘাতের ত্রায় শির:পীড়া, প্রাত:জালে উহার বৃদ্ধি;
মন্তক-ত্বকে জলপূর্ণ উল্ভেদ; থুসকি। গ্রীবা-পৃঠে চুলের গাহদেশে
কণ্ডরনকর উল্ভেদ ও উহা হইতে আঠা আহা জলবং প্রাব নিংগবণ।

हुल डेठेः। भञ्जक-घरक क्षाया

চক্র ।— প্রভূত অশ্রন্থান সংযুক্ত চক্ষের হার্পুল (মাগি-ফন)।
মন্তকের তক্ষণ প্রভিত্যার সহকারে অঞ্জনাব! চকুর ছক্ষেতা; ঠাণ্ডা
বাতানে গহির ছকলে ভাগবা চক্ষে বাতান্ন লাগিলে অশ্রন্থান।
অশ্রনালীর অবক্ষতা সহ চকু ছইতে পরিষ্কার প্রেম্মানা জলবং আব
নিঃসরণ। পাতার শুষ্কতা, জালা ও কণ্ডুলন। পাতার প্রান্তদেশের
আরক্তা। পাতার দানা, তংসহ অশ্রন্থান বা উহার অভাব।
অক্ষিমুকুরের (lens)অম্বছতা। যে কোন রোগেই অশ্রন্থান লক্ষণ বিভ্যমান
থাকিলে ইহা প্রয়োজ্য। ক্ষতামুর্বিনিষ্ট চকুর পাতা (ফির-ফ্রন,
কালী-মিউর)। কণিয়ার কোষ্কা (কালী-মিউর)। প্রভিশ্যার জনিত
অশ্রন্থানী-নালীর অবক্ষতা। অশ্রন্থান সংযুক্ত চক্ষ্বেদনার প্রতি দিন
একই সময়ে উপস্থিতি। চকুর পাতার ক্ষতাতা; প্রাবের অভিশর
ছর্গন্ধ ও বিদাহিতা। চকু কূট কুট করে। দৃষ্টিদৌর্জলার (ম্যাগফ্রস
সর্জ্প্রধান প্রথম। খেতমগুলের প্রদাহ সহকারে প্রভূত অশ্রু ও
শ্রেমান্রাব। ঝাপসাদৃষ্টি; অক্রাভাত (স্থি গণ্মি)। আলোকে বিবের।
চকুর স্বায়ুশুল, ভংসহ অশ্রন্থাও প্রতি মঞ্জলের আরক্তা।

ব্রত্য — কর্ণনালের ফ্রীভতা বশতঃ বিধিনতা (কালী-মিউর, কালী-সলফ)। কর্ণের বছপ্রকার রোগ সহকারে প্রভূত লালাম্রাব। কর্ণনাদ; কর্ণহটতে পুষ্মাব। চন্দ্রকালে কর্ণে চড় চড় শক্। কর্ণে ক্ঞুমন ও জ্বা। কর্ণে চিড়িকমারা বেদনা।

ক্রাতিন্তা।—অওলালের ন্থার হছে শ্লেমা ও পরিকার জ্বাবং এবং প্রবল ইাচি সংযুক্ত তরুণ প্রতিশ্রার (সার্দি)। নাসিকা হইতে জ্বাবং বরণাক্ত প্রাব ক্ষরণ (ক্যাল্ড-ফ্রন্স)। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের লবণাক্ত খ্যেমাপ্রাব সংযুক্ত পুরাতন প্রতিশ্রার। হে ফিবার এবং ইন্কুয়েঞ্জা বোগে প্রথমে ইাচি এবং ভৎসহ নাসিকা ও চক্ হইতে জ্বাবং প্রাব ক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রাদ (৩০ × ক্রম)। মন্তকের প্রতিশ্রার। স্বাদ ও প্রাবশক্তিব বিলোপ। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের নাসিকা হইতে জ্বাবং পাতলা রক্তরাব (ফ্রি-ফ্রন্স); নাসান্ড্যন্তরের অতান্ত গুক্তা ও অবরুদ্ধতা এবং ভৎসহ জালা; নাপার চমটি পদা। সম্বাধে অবনত হইলে জাপবা কাদিবার সমর নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে। নাসিকা হইতে এখ্যেনের স্থার শ্লেমা প্রাব। প্রাভংকালে প্রাণিক গ্রামিক ব্যক্তবের বৃদ্ধি।

সুখা তাল — কোঠবদ্ধ সহকারে মুখম গুলের স্বায়ৃশ্ল। পরিষার অলবং শ্রেয়া বমন অংবা চক্ষ্ হইতে প্রভূত পরিষ্কার শ্রেম স্থাব সহকারে মুখম গুলের স্বায়ুশূল। সাইকোসিয়া শাশ্রু পতন। ভোজন কালে মুখমগুলে হর্মা। মুৎপাঞ্। কুইনাইন সেবনের পর সায়ুশ্লের উৎপত্তি। কপালে গুটিকার ভারে উদ্ভেদ।

মুখ-মহ্না—্যে কোন হোগ কালে প্রভুত লহণাক্ত লালা নিঃসরণ।
মুখ এবং গল-নগীর প্রতিশ্রায় সহকারে স্বচ্চ, জলবৎ ভরল শ্লেমা

নিঃসরণ (এবু মিনস—ক্যান্ধ-ফস)। শিশুদিগের মুখের ভিতর ফুদ্র কৃতি
সাদা ক্ষত ও তৎসহ লালাস্থাব (কানী-মিউরের সাইত প্র্যায়ক্রমে)।
জিহ্বা-নিয় গ্রন্থির ফীতভা (রেণুলা)। জিহ্বার নিমে এক প্রকার কর্ম
অর্কুদ (রেনিউলা)। আবিরাম মুথ হইতে কল ও তরল শ্লেমা
তুলিয়া ফেলা। শিশুদের কর্মা বলিতে শিথিকে বিলম্ব। িহ্বা ও
মুধে শুক্ষতামুত্র। মুধের চারি দিকে মুক্রার ক্রায় বিন্দু বিন্দু উদ্ভেদ।
ওঠের বিদারণ ও ফ্রীতভা। থোৎমায় উদ্ভেদ।

ক্তা-প্রত লালা বা অঞ্জাব সহকারে দক্ষণ্ল! দক্তর সায়ৃশ্ল। শিশুদের দক্ষেত্র কালে লালাজাব। দক্ষ্লে কত। মাড়ীতে দেনা সহ দক্ষ্ল হইতে সহজে রক্তপাত। শিথিল দক্ত। লালাজাবী-গ্রন্থির প্রাতন প্রদাহ। রেপুলা। দক্ষ্লে ক্রেণ্টিক (gum-boil), তৎসহ দপ্দপ্কর অথবা রক্ত্রণের ভার বেদনা।

ক্তিহ্বা।— দিহবার উপর পরিষার, আঠা আঠা ও এলবং শ্রেম্যর লেপ এবং প্রান্তে লাশার বৃদ্ধান জিহবার অগ্রভাগে ফোফা। মৃত্ত জ্বের মুখ ও দিহবার শুষ্কভা এবং অগ্র হইতে জ্ববং মন্সাব। শিশুর কথাবলিতে শিথিতে বিশ্ব। স্বাদের বিলোপ। ভিহ্নাগ্রে দানা। মানচিত্রের স্থায় চিত্রিত জিহ্বা। স্ববশ ও আড়ষ্ট জিহ্বা। জিহ্বায় বেন চুল স্বাচ্ছে এরূপ অনুভব।

পালা নালা । কণ্ডের শ্লেমান্রাবী বিল্লীর প্রদাহ সহকারে এই উষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক জলবৎ প্রাব। প্রভূত লালান্রাব সহকারে আলিজহ্বার শিথিলতা (ক্যাল্ক-ফ্লোর প্রধান ঔষধ)। গল-গও (ক্যাল্ক-ফ্ল প্রধান ঔষধ)। মুথের অভিশয় শুদ্ধতা অথবা প্রভূত লালান্রাব সংযুক্ত গলকত। ডিফথিরিয়ায় নিজালুতা লক্ষণের বিশ্বমানতা; জলবৎ মলন্রাব; লালান্রাব অথবা জল বমন; মুথমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও ক্ষীতভা। ওক্ষাবিধি

(মঃম্পাস)। গণাভাতবের চাকচিকা। ফারিংসএ দানার উৎপত্তি সহ প্রদাহ, বিশেষতঃ ভাত্রকৃট দেবীদিশের। পুরাতন গলকত। গণাভাত্তবে পিও বা ছিপিরকায় অন্তব, তৎস্য অতিশয় শুদ্ধতা। গলার কত. আকৃষ্ণন ও চিড়িক্মারারকায় বেদনা। হন্থনিয়গ্রিষ্ট, গলগ্রন্থি ও নিসিলের স্ফীনতা। আলভিহ্বার বিবৃদ্ধি। মুথ হইতে হর্গন্ধ নিংসরণ। সক্ষ-গ্রীবা। ডিফ্থিরিয়ার পর ভুক্তদ্রব্য ঠিক পণে গণাভাত্তবে যায় না, কেবল মাত্র তর্ল দ্র্ব্য গিলিতে সমর্থ।

বিজ্ঞমান থাকিলে আমাশরের যে কোন রোগেই ইহা বাবহার্য। মুথের লবণাক্ত স্থাদ এবং জলবৎ পদার্থ বমন সহকারে অজীণ। বোগীর সময় সময় তিক্ত বা লবণাক্ত পদার্থ থাইবার আকাজ্যা। প্রবল কুধা; আহারাস্তে বুকজালা। আমাশরে বেদনা সহকারে অজীণতা। অধিক পরিমাণ জলপানের প্রবল পিপাসা। আহারের পর বেদনা সংযুক্ত অগ্নিমান্দা। স্বত্ত, জলবৎ, চট্চট্টে শ্লেমা অথবা ফেণা ফেণা ভলবৎ পদার্থ বমন। পাও, সহকারে শোণ। মুথে জল উঠা। হিকা, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনের পর। মুথ হইতে জগন নিঃসরণ। কুইতে অকুচি। তামাকে অকুচি। খাসে জগনি সহ পাক্সলীতে বেদনা।

তিদ্বা ও অবা !— অন্তের শিথিলতা সহকারে তরণ মণ্প্রা । পর্যায়ক্রমে অতিসার ও কোঠকাঠিয়। অন্তেব শ্রৈত্মিক-বিল্লীব শুক্তা জনিত কোঠকাঠিয়; তৎকালে অস্তান্ত স্থান হইতে জলবৎ প্রাব। প্রভূত অক্রপ্রাব বা ফেণিল জলবৎ পদার্থ বমন সহকারে নস্তকে গুক্ত অমুভ্রব সহ শিবঃপীড়া। শক্ত মল নিঃসরণ কালে মল্বাঞ্রে বিদারণ। ফেণিল মল এবং আঠা আঠা শ্লেমাপ্রাৰ সংযুক্ত অতিসার। শক্ত মল

নিঃসারণে মলগারের বিদারণ, চিড়িক, ক্ষতবৎ বেদনা ও টাটানি জন্ম।
কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত অর্ল। চোঁচ ফুটার স্থায় বেদনা সংযুক্ত অর্ল। গরম
জলের সহিত এই উষধ মিশাইয়া মলদারে পিচকারী দিলে এই রোগে
বিশেষ উপকার দর্শে। মলদারের চতৃদ্ধিক দক্রবক্রায় পীডকা। বন্ধন
জলেশে (কুচকি) বেদনা। বিদাহী, জলবৎ অতিসার। অসাড়ে
মগত্যাগ; মল, কি অপান নিঃস্থত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।
প্রীহা ও যক্ষপ্রদেশে বেদনা।

মুত্র।—স্বচ্ছ, জলবং মৃত্রাব সংযুক্ত মৃত্রাশরের প্রতিখ্যার।
অতিরিক্ত মৃত্রাব। মৃত্রতাগের পর জালা ও কর্তনবং বেদনা।
বহুমৃত্র। অতিশন্ধ পিপাসা সহকারে প্রভূত জলবং মৃত্রাব। শরীবের
শীর্ণতা ও মৃথ হইতে পুন: পুন: জল উঠা সহ অবারিত মৃত্র। অক্তের
সম্মুথে মৃত্রতাগ করিতে পারা যায় না। রক্তমৃত্র। মৃত্রনি:সর্বেব
পূর্বে কতকক্ষণ বিসিয়া থাকিতে হয়। অপ্তকোষে বেদনা ও কামড়ানি।
অপ্তকোষে তর্দিমা কণ্ডরন। মৃত্ত-প্রদেশের লোম পহন। অভ ও
বেতঃবাঠা শিরার দ্বীতিতা ও বেদনা। অভে জল সঞ্চ হাটিবার ও
কাসিবার সময় অজ্ঞাতসারে মৃত্র নি:সরণ। প্রমহ; মৃত্রপথে
ঝলসিয়া যাওয়ার ভারে জালা। স্বচ্ছ জলবং প্রাব। পুরাতন উপ্দংশ।

পুৎজ্বলভাতি হা।—পুরাতন প্রায়ে সহকারে স্বছ, জনলং, বিদাহী শ্লেমামর পদার্থ প্রায় । মাস্তবস্থাবী পুরাতন উপদংল। কুরও। মেচ্ ত্রকে (লিস) জলসঞ্চর (হাট-সল্ফ)। প্রাটেক বস করে। চ পদিলে মৃত্রপথে কর্তাং বেদনা। শুক্রপ্রাবের পর হ্রলেভা ও শীভামুভব। ধ্রকভঙ্গ। অত্যে বেদনা, অপ্রকোষে অভ্যন্ত চুলকানি। স্পার্শেটিক কর্ড ও অপ্রে বেদনা।

প্রাক্তিন কর্মান এই ঔষধের বিশেষর জ্ঞাপক আব সংযুক্ত প্রান্থ ও উপদংশ পাতলা, জলবৎ বজঃ আব। বিষয়ণ ও শিরঃ শীড়া সংযুক্ত বিলম্বিত ঋতু। ঋতুকালে শিবঃ শীড়া ও অঞ্জ্রাব প্রবণ্ঠা। প্রজ্ঞাব ত্যাগের পর যোনিতে টাটানি ও ক্ষতবং বেদনা। খেতপ্রদর সংযুক্ত ঋতু; আবের বিদাহিতা। বিদাহী আব েগিয়া বাহ্য-স্ত্রী অঙ্গের লোম পড়িয়া যায়। ঋতু আবের পুর্বের বিষয়তা এবং আবকালে ও তৎপর শিবঃ পীড়া। জলবৎ, আঠা আঠা ও ক্ষতব্য খেতপ্রদর। যোনির ক্ষতা, সঙ্গমকালে যোনিতে অত্যন্ত জ্ঞালা ও বেদনা। যোনিতে খেটামারার ভার ও জ্ঞালকর বেদনা। যোনিতে থেটামারার ভার ও জ্ঞালকর খেতপ্রদর। করায়ু নির্গমন, এতভা বিসয়া থাকিতে হয়। যোনির অত্যন্ত শুফ্লা। ক্লোরোপিস্। মুথম ওলের পাণ্ডুবণ; বালীসের উপর চিং ভইরা শুইলে জ্বায়ুর উপসর্গের জনেবটা লাঘব। প্রাত্তকালে জ্বায়ুর নিয়াতিমুখে নামিয়া পড়ার ভায় আবেগ। অবারিক মৃত্র, হাঁসিতে, কাসিতে ও হাঁচিদিলে মৃত্র পাত।

প্রতি।—গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালে জলবং, ফেণিল শ্রেম্মা বমন ও প্রাতঃকালীন বিবমিষা। স্থতিকাবস্থায় মণিপুরের (pubis) রোম পতন। স্তনের শীর্ণতা।

প্রাস্স-অন্ত ।—জলবৎ, ফেণিল শ্লেমান্সাব সংযুক্ত শ্বাস-কাস !
(শ্বাসের জন্ম পর্যায়ক্রমে কালী-ফস); ব্রশ্বাইটিস, শ্বাস-বন্ধের সকলে
রোগেই পুর্ব্বোক্ত প্রকার নিষ্ঠীবন লক্ষণ বিশ্বমান থাকিলে ইহা উপবোগী।
ফুসফুসে জলসঞ্চয় সহকারে সময় সময় লবণাক্ত জলবৎ নিষ্ঠীবন। কাসিবার
সময় অঞ্চ ও মৃত্র প্রাব (ফির-ফস)। জপিংকফ; বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শক্ষ
ও শিথিল শ্লেমা সংযুক্ত নিউমোনিয়া। জিহ্বা লক্ষণও দুইবা। প্রুরিসি;

স্থরভঙ্গ ; কাসিতে কাসিতে বুকে বেদনা। প্রতি শীতকালে কাসের প্রত্যাবৃত্তি। ফুসফুসে জলসঞ্চয়। শাস-কষ্ট।

ব্রক্ত সংশ্বনে হালা।—রক্ত থীন ব্যক্তিদিগের হৎপিঙের দপ
দপ, জলবৎ পাতলা রক্ত এবং শোগ। হৎপিঙের বিবৃদ্ধি; পুনঃ পুনঃ
শুইবার প্রয়োজন। শীতল ও অবশ হস্ত-পদ (ফির-ফস)। ক্রত,
সবিরাম নাড়ী, বামপার্শে শয়নে উহার বৃদ্ধি। সমগ্র শরীরেই
হৎপিঙের দপ দপানি অফুভব করা যায়। রক্ত সংযত হয় না। হদগ্রপ্রদেশে বেদনা। নড়িলে বা জোরে খাস গ্রহণকালে উহার বৃদ্ধি।
হৎপিঙে ধড়ফড় শক। হৎপিঙে আকুঞ্চন বা চাপিয়া ধরার স্থার
বেদনা অফুভব।

প্রষ্ঠ এবং হাতে এবং আঙ্গুলে জলপূর্ণ ফোন্ধা। পদের ক্রেনিভিক সঞ্চলন ; স্থির চইয়া বসিয়া পাকিতে পারা ষার না। বিশুদের সক্ষতীবা। ইটু-সন্ধির পরাহন বাত। পদের অনৈচিভ্ক কম্পন। সন্ধির শুরুতা। নিদ্রাকালে হস্তপদের উৎক্ষেপণ (ম্যাগ-ক্স) জলবং প্রাবের বিশ্বমানতা থাকিলে আমবাত এবং গ্রন্থিবাতেও উপকারী। সন্ধির বিদারণ। পৃষ্ঠ এবং হস্ত-পদে বেদনা। কোন কঠিন বস্তর উপর শন্ধন করিলে পৃষ্ঠ বেদনার উপশম। ইটুগ্রন্থির বাত; ইটুর শুরুতাও ক্ষীততা। পৃষ্ঠে শীতলতামুভব। মধ্যে মধ্যে বাতের বেদনার উপস্থিতি। উক্পাদেশে বেদনা। সামেটিকা। পদাক্লির মধ্যভাগে বিদারণ; পুন: পুন: পদে ঝাজিলাগে। কক্সিক্ম অন্তিতে বেদনা। নিজিতাবস্থায় পদের অনৈচিভ্ক উল্লেখন ও বেদনা। নিজিতাবস্থায় পদের অনৈচিভ্ক উল্লেখন ও বেদনা।

নুত্র বা নির্দিষ্ট সম্বে উপস্থিত মায়ুশুল (মাগি-ফাস)। রোগাক্রান্ত স্থানের অবশতা। মেরুল জে ১৪-স্পর্শ সহা করা বায় না। কটি দেশে পাক্ষাঘাতিক বেদনা। স্নায়ু-শ্লে সায়ু-পথে বেদনার গতি, অশ্রু বা লালাম্রাবের সহিত বেদনার উপস্থিতি। হিষ্টিমিয়া; প্রাতে বা শীতল ঋতুতে উপচর। গুরুবায় জনিত আক্ষেপ ও গ্র্কেলতা। পেশীর স্পানন। হিকা। হিষ্টিবিসা জনিত আক্ষেপ ও গ্র্কেলতা। মৃগী, মুখহইতে ফেণা নিংসরণ। তুবলতা সহ মাংসপেশীর শিখিলতা। সর্কুদা ক্লান্তি অনুভব, তজ্জ্য কাজ কর্মে অপ্রবৃত্তি। অক্লি-কোটরের নিয়দেশের সায়ু-শূল।

ত্রেনা— থকের অভিশয় শুষ্ঠায় অথবা উহার জলবং রসপ্রাবী বে কোন পীডার ইহা উপযোগী। শুল্র শক্তবিশিষ্ট কণ্ড়। বাহ্য প্রয়োগ ও উপকারী। ইটুতে দক্র। শরীরের থে কোন স্থানে দক্র। কোন রোগভোগকালেও ইহা উপস্থিত হইতে পারে। মন্তক-হকে শুল্র আইস (খুন্মি); হাতের তালুতে অর্কুদ। মন্তকে টাকপ্রা; চুল উঠা। গোপ দাছির লোম পত্রম। অভিভিক্ত লক্ষণ থাওয়ার ফলে উণ্টে একজিমা। ক্র, কর্ণের পশ্চাং অথবা কেশের প্রান্তভাগে একজিমা। নপের শুক্তা ও বিদারণ। নথ-শূল। কীটাদির ভ্লবেধ (যত্ত শীঘ্র সম্ভব স্থানিক প্রয়োগও কর্ত্তব্য)। নিদ্রাল্তা ও লালাম্রার সংখ্য বে কত উৎপত্র হয়) ও উহা হইতে কতকর র্মাণি প্রাব। ফার্লে টিফ্রার। চন্দ্র অথবা গ্রৈম্মিক বিল্লী হইতে প্রদাহের পরবর্তী ঘর্মের সার পদার্থ ক্ষরণ। হাতেক ভালুকে আঁচিল। অভিশয় কণ্ড্রন সংযুক্ত শীতপিত্র। অত্যধিক সংগ্রেজনিত কণ্ড। পুরাতন চন্দ্র

রোগ। বিষাক্ত কীটাদির দংশনে বা হুলবেধে অত্যস্ত উপকারী (এই ঔষধের বাহ্য প্রয়োগও কর্ত্তব্য)। হার্পিজ জোষ্টার। হার্পিজ সাসিনেটাস। একজিমা হইতে জলবৎ আব নিঃসরণ। শোণ। মলদ্বাবেব চারিদিকে দক্র।

ক্রবং পদার্থ ব্যন ও পেশীর স্পন্দন বা হস্ত-পদের উৎক্ষেপণাদি লক্ষণ বিজ্ঞান থাকিলে ইছা ব্যবহার্য়। মেরুদ্ভ, পাকস্থলী, হাত-পা প্রভৃতি নানা স্থানে শীতাত্ত্তব; একই সময় শীতাত্ত্তব সহপিপাসা। প্রভৃত ঘর্মনান থাকিলে ইছা ব্যবহার্য়। মেরুদ্ভ, পাকস্থলী, হাত-পা প্রভৃতি নানা স্থানে শীতাত্ত্তব; একই সময় শীতাত্ত্তব সহপিপাসা। প্রভৃত ঘর্মনান, বিশেষতঃ রাত্রে। কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্তী সবিরাম জর। সাধাবনাঃ পর্বাক্ত ১০ ঘটিকার সময় শীতের উপস্থিতি এবং গুপুর পর্যান্ত উহার অব্থিতি, প্রবল গাত্রোভাপ এবং ওঠে জরক্ষোট (জর ঠুটা); হাতৃড়ির আঘাত্তের ন্তায় শিরোবেদনা, প্রবল পিপাসা এবং দৌকল্যকর ও অম্বর্ঘ নাট-মিউরের জবের বিশ্লিপ্ত লক্ষণ। অভিশয় ক্রবলতা ও শীর্ণতা। প্রভৃত নৈশ-ঘর্ম। প্রতিদিন লবণ মিশ্রিত জল্বারা গা মৃচিয়া কেলা উপকারী। শীত শীত অনুভব, বিশেষতঃ পৃঠে। একই সময় শীত ও পিপাসা; সারিপাতিক লক্ষণ সহ হস্ত-পদাদির উৎক্ষেপণ, নিদ্যানুতা ও জলবং পদার্থ ব্যন।

নিদ্রো।— অতিশয় নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ মস্তিশে অত্যধিক জলসঞ্য় জনিত। পর্যাপ্তকাল নির্দ্রা গেলেও অপরিতৃপ্তি; সর্বদা নিদ্রায়াইবার প্রবাকি প্রোতে ক্লান্তি অভতব। গৃকে দম্যতম্বর প্রবেশবিষয়ক স্বপ্ন। নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ চমকিত হইয়া উঠা। অনিদ্রা।

নাজনা ।—শরীরের যে কোন স্থানের শোথ; গ্রৈপ্রিক ঝিল্লীর কোন স্থানের ক্ষতা, আবার কোন কোন স্থান চইতে জলবং পাতলা সাবনিঃসরণ; যে কোন টিগুতে রসক্ষরণ; জিহ্বার লক্ষণের বিভ্যানতা; প্রোতে, আর্দ্র শ্বাত্ত ও লোণা-প্রদেশে উপচয়; অপরাক্তে উপশ্য। কোন প্রকার নিধাক্ত ঔষধ সেবনের প্রবর্ত্তী অথবা বিয়াক্ত কটিদংশনের পরবর্ত্তী উপদর্শে এবং কোন নির্দিষ্টকাল অন্তে রোগের উপস্থিতি; নেট্রাম-মিউর নির্বাচনের বিশ্লিষ্ট লক্ষণ। এনিমিয়া ও ক্লোরোসিণ রোগের সর্ব্যপ্রধান উষধ (ক্যাল্ল ফস)। উত্তম গাল্ল গ্রহণ সত্তেও শরীবের শীর্ণতা, বিশেষতঃ গ্রীবার। ম্যালেরিয়া অবে কুইনাইন সেবনের ফলে যে ধাতু-দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা সংশোধনে ইহা স্বিশেষ উপ্রোগী। ইহার সর্বাহানের প্রাবই স্বচ্ছ ও সিদ্ধ শ্বেত-সারের স্থার (like boiled starch)।

ত্রপাদ্ধর ও ত্রপাশ্ধরণতঃ প্রাতঃকালে (বেলঃ
১০ ১১টার জরের প্রকাশ) নির্দারিত সময়ে, সমুদ্রের তীববর্তী ও নে
এবং আদ্র প্রতৃতে বুজি। কোন কঠিন বস্কর উপর শরনে পৃষ্ঠ বেদনার
শান্তি। মূত্রত্যাগের পর জালা বন্ধ্রণা ইত ন দিলভার নাইটেট
ব্যবহারের কুফল এবং কুইনাইনের কুফলে ইহা অভিশন্ন উপকারী।
ক্রমা—প্রলার এই ঔষধের ৬× ক্রম ব্যবহারের উপদেশ
দেন। কিন্তু হানিম্যান, এলেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান অভিজ্
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক্রের মতে ইহার বিংশ (৩০) বা তদ্দ্রক্রম
(২০০) জবিকতর ফলোপ্রারক। আমরাও সাধারণতঃ ইহার ৩০×
ক্রম ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়া থাকি। বোগ পুরাতন হইলে
২০০× ব্যবহা করা সঙ্গত। কীটাদির হলবেধে ইহার বাহ্যপ্রয়োগও
হইয়া থাকে। বৃশ্চিক, বোল্তা প্রভৃতি কীটের হল বেধে কিঞ্চিৎ উফ্
জলের সহিত থানিকটা ৬× ক্রমের চুর্ণ মিশ্রিত করিয়া স্থানিক
প্ররোগ করা মাত্র বেদনা দ্রীকৃত হইয়া থাকে (ইহা আমাদেব বিশেষ
পরীক্ষিত)। এই সব স্থলে আভ্যন্তরিক ঔষধ দেবন ও প্রয়োজন।

সম্প্রক্ষা । —ইষ্টেকিয়ান টিউব এবং টিম্পেনামের প্রতিশ্রামে কালী-ললফ ও কালী-মিউরের সহিত এবং আমাশ্যান্তের রোগে নেট্রাম সলফের পহিত তুলনীয়। প্রাপ্তহৌবনা কুমারীদিগের অতুকালীন শিরংপীড়ায় ক্,ক-ফ্স এবং ফিরম-ফদের সহিত; দ্বীলোকের অত্যধিক রজ্ঞাব সহ শিরংপীড়ায় কালী-সলফ; স্বল্ল রজ্ঞাহ শিরংপীড়ায় নেট্রাম-মিউর ফলপ্রদ। বিষাক্ত কীটাদির দংশন বা হুলবেধে নেট্রামমিউরের পর প্রয়োজন হইলে লিড্রম ব্যবহার্য। এই অবস্থায় ফিরম-ফল এবং কালী-ক্স সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইর: থাকে। নেট্রাম-মিউরের সহিত লাইকোপোডিয়মের অনেকটা সাদৃশ্র আছে। এছন্ত অনেক সময় ইহার পদ লাইকো অনুপ্রক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইরা থাকে। ধমনী হইতে জলীয় রস-ক্রন্তে (exudation) তাহা আশোষণার্থ নেট্রাম-মিউর এবং শিরা হইতে নিংক্ত জলীয় রস শোষণে নেট্রম-সলফ্ ভাধিকতর উপযোগী!

নেটাম-মিউরের পর প্রায়ই এপিস ও আর্জ্জনাইট অনুপূরক ওবদরপে ব্যবহৃত হইরা থাকে। পূরাতন রোগে অধিকাংশ সময় দিপিয়া ও সলফারের পূর্কো নেটাম-মিউব উপযোগী হইয়া থাকে। ধানারা থাজের সঙ্গে অধিক পরিমাণ লবণ ভক্ষণ করেন, তাহাদের পক্ষে ক্ষকরাস ও স্পিরিট-নাট্রিক ডঃলসিস (১ ফোটা মাদ্রায়) প্রযোজ্য। এই স্থলে নেটাম-মিউর ৩০ প্ররোগ করিলেও অভিলবিত কল লাভ হইতে পারে। সমুদ্রের পোণাজলে স্নানের ফলে কোন রোগ জ্বালিলে আর্মেনিক সেবনে সেই দোষ দূর হয়। স্নৈত্মিক-ঝিলীর কোনও স্থান সিলভার-নাইটেটি দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়ার কুফল নেটাম-মিউরে সংশোধিত হইয়া থাকে। স্নৈত্মিক-ঝিলীর শুক্ষণার গ্রাফাইটিস, এলুমিনা ও ব্রাইওনিয়ার সহিত এবং রেণ্লায় এম্বার সহিত গ্রীয়।

নেট্রাম ফসফরিকম।

Natrum Phosphoricum

ইহার অপর নাম ফসফেট অব সোডা। সংক্ষিপ্ত নাম ভাট-ফস। শারীরিক রসে (fluids of the body) অম (এসিড) এবং কার (এলকালি) উভয়ই বিভাষান আছে; দেহে কথনও যথোপযুক্ত অমের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেননা, ইহা অরগ্যানিক (জান্তব) পদার্থ। এলুমেনের ভায় সততই আহার্য্যরূপে লোকে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে। কসফেট অব লাইমের সহিত এলুমেনের যেরূপ সম্বরু, ক্সফেট অব্সোডার সহিত অন্নেরও সেইরূপ সম্ম। কোন কারণে শরীরে ফসফেট অব সোডার পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, কর্ম-কারকের (worker) অভাবে, অন্ন দেহে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং ব্যয়িত না হওয়ায় শরীরে নানাপ্রকার উপদ্রব ঘটাইতে থাকে। ইহাকেই লোকে অমাধিকা বা অন্লের পীড়া বলিয়। থাকে। বস্তুতঃ, এই অবস্থাকে অমাধিক্য না বলিয়া সোভিয়ম ফসফেটের নূন্যতা বলাই শঙ্গত। স্থবিবেচক চিকিৎসক এই সকল রোগীর অমের পরিমাণ হ্রাস করিতে চেষ্টা না করিয়া, অভাবেরই পুরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ উপযুক্ত পরিমাণে সোডিয়ম ফক্ষেটই ব্যবস্থা করিয়া ইহাতে রোগ'ও অতি সত্বর নিরাময় অথাৎ রোগমুক্ত হইয়া উঠেন। পুর্বোক্ত বিষয়টি আরও সহজ করিয়া বুঝান যাইছেছে। কোন আফিষের কার্য্য নির্বাহ করিতে > জন কর্মচারীর প্রয়োজন। অহুত্তা নিবন্ধন ও জন কর্মচারী অনুপস্থিত থাকায় বহু কাজ জমিয়া ৭ জন কর্মচারী আর উহা শেষ করিয়া উঠিতে পরিতেছেন না। একেত্রে কি আপনি বলিবেন যে, আফিষের কাজ অভ্যস্ত বাডিয়া গিয়াছে ? প্রকৃত পক্ষে, কাছতো বাড়ে নাই—কর্মচারীর অভাব ঘটিয়াছে।

মানবদেহে লাক্টিক এসিড নামক পদার্থ সর্বাদাই বিশ্বমান আছে।
ল্যাক্টিক-এসিডের সহিত নেট্রাম-ফস মিলিত হইয়া উহাকে কাকালিক
এসিড ও জল এই এই ভাগে বিভক্ত করিয়া কাকালিক এসিডকে ফুসফুসপথে বাহিল্ন করিয়া সেয়। রক্তমধ্যস্থ শর্করার (sugar) সহিত্ত নেট্রামফসেব বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কোনও কারণে রক্তে শর্করার ভাগ বৃদ্ধি
প্রাপ্ত হইলে নেট্রাম-ফসফেট রক্ত হইতে উহা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

আমাশরিক রসে (gastric juice) এই পদার্থের (নেট্রাম ফন)
আভাব হইলে, পাকস্থলীতে উৎসেচন (ফার্মেণ্টেশন) জন্ম ও তজ্জ্জ্জ
পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। ল্যান্টিক এসিডের উপর নেট্রামফসফরিকমের বিশেষ প্রভাব থাকাল দরণ ল্যান্টিক-এসিডের আধিক্য
ফ্রেডু যে সমস্ত পীড়া জন্মে, তাহাতেই নেট্রাম-ফস ব্যহ্বার করিয়া স্কুফল
পার্যা যায়।

আমহাক প্রেরাগ।—অন্ন উলার, মুখে অন্নজলোলাম, অন বমন, সবুজাভ অন্নগন্ধি অতি নার (ডায়েরিয়া), উদর বেদনা, আক্ষেপ এবং অর প্রভৃতি থে কোন রোগেই 'অন্ন লক্ষণ' বিভামান থাকে, এবং জিহ্নায় ও তালুতে সোণার ন্যায় পাতলা ছরিদ্রাবর্ণ ময়লা দৃষ্ট ছয় এবং ক্রিমির লক্ষণ বিভামান থাকে, তাছাতেই সাফলোর সহিত নেট্রাম-ফ্স বাহত হইয়া থাকে।

এলোপ্যাথের। অন্নরোগে যক্তের ক্রিয়া সংশোধনার্থ বাই-ক্লোরাইড অব মারকিউরি প্রভৃতি উষধ ব্যবস্থা করিয়া থ.কেন। যেখানে কেবল মাত্র সোডিয়ম ফ.ফটেরই অভাব, সেথানে বাইক্লোরাইড অব মারকিউরি প্রয়োগ করিয়া সমস্ত যক্তটোকে আলোডিভ করিয়া ভুলিবার প্রয়োজন কি

নাদিকা, চক্ষু, মৃত্রযন্ত্র প্রভৃতির প্রাবের হরিক্সাবর্ণ ও এই দ্রব্যের অভাক

জ্ঞাপক লক্ষণ। রক্তে ল্যান্টিক এসিডের আধিকা হেতু রিউমেটিজম বোগ হুনিয়া থাকে; এজন্য এই জিনিষ উক্ত রোগের প্রধান ঔষধ।

যে সকল শিশুর অধিক পরিমাণ ছগ্ধ ও শর্করা ভক্ষণের ফলে শরীরে ল্যা ক্টিক এসিডের আধিক্য হেতৃ নানারূপ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা অতীর প্রয়োজনীয় ঔষধ।

অমু ঢেকুর, অমুব্যন, সবুজাত মল বিশিষ্ট অতিসার, উদর বেদনা, আক্ষেপ (spasm), ও তৎসহ জ্বলক্ষণ বিভাষান থাকিলে এই ঔষধ স্থন্দর উপযোগী - অন্থির রোগ, গ্রন্থির রোগ (diseases of glands) ফুসফুদের রোগ এবং উদরের যত্ত্বের রোগে, লক্ষণের সাদৃভ্যে, ইহা ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ক্র্ফিউলা জনিত গ্রন্থির বিবদ্ধনে এবং টিউবারকিউলোপিস অর্থাং করে রোগের ইহা প্রধান ঔষধ। অল্লমাত্রায় নেটাম-ফদের অধংক-চ.প্রক্ষেপ (Subcutaneous injection) অর্থাং ত্বকের নিয়ে ইঞ্জেকশন দিলে আফিম সেবনের অভ্যাস দ্বকরা ধায়। ডাঃ স্পধার তাঁহার প্রস্তকের শেষ সংস্করণে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে প্রাংমহ রোগের ইহা প্রধান ঔষধ। এইরোগে কালী-মিউরও শ্রেষ্ঠ ঔষণ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয়ের লক্ষণের মধ্যে পার্থক্য আছে (উভয়েয় মুত্র-যন্ত্রের লক্ষণ দ্রপ্টব্য)। কলেরা রোগে এই ঔষধ প্রথম হইতে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে সহজেই মূত্রোংপন্ন হইয়া থাকে। রক্তে ল্যা ক্টিক এসিডের আধিক্য হেতু বাতরোগ জন্মে; এজন্ম এই রোগে ইহা উংকৃষ্ট ঔষধ ইহা সকলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। জিহ্বার পশ্চাড়াগে আর্দ্র, সরের ক্লায় পীতবর্ণের লেপ এই ঔষধের সর্বরপ্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—ভবিষ্যতে কোনও বিপদ ঘটবে এরপ আশকা বা ভয়।

প্রভাত এবং আশা ও উন্তমপরিশুক্তা। রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগ্রন্থ হইলে গৃহমধ্যক আসবার পত্রে মহুদ্য বলিয়া ল্রান্ত ধারণা; রোগী বলে সে পার্মন্থ গৃহাভ্যন্তরে লোকের পাদশন গুনিতে পাইয়াছে। সহজেই ক্রোণ বা বিরক্তি জন্মে। অতিশন্ন বিশ্বতি, কোন কথাই মনে থাকেনা। অতিরিক্ত মানসিক হুরবলতা।

মন্তক ও মন্তক বকা—মন্তক-শিথরে বেদনা (মাগা বরা)। গাঢ় অন্ন চগ্ধ পানের পরবন্তী শিরংপীড়া। মন্তকে পূর্ণতান্ত্রতব সহকারে সম্মুখ-কপালে বা মন্তকণশ্চাতে বেদনা। তরল অন্নপদাথ রমন সহকারে মাথাধরা (পর্যাশ্বক্রমে-ফিরফস)। প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবা মাত্রই মন্তক-শিথরে বেদনামূত্র। জিহ্বার বর্ণ বিশেষ দ্রষ্টবা। জিহ্বার পশ্চাদাগে সরের ন্তায় ময়লা সঞ্চিত দৃষ্ট হইলে এই উধধ অবগ্রই প্রয়োগ করিবে। অভিশয় প্রচাপন ও উত্তাপ সহকারে মন্তক-শিথরে প্রবল বেদনা (ফিরফস), মনে হয় মন্তক বিদীর্ণ হইবে। শিরংপীড়ার সহিত প্রায়ই আমাশয়ের (stomach) বিশ্ব্রুগা বর্তমান থাকে। শিরংপীড়া সহকারে আমাশয়ের বেদনা ও ফেণিল তরল অন্ন পদার্থ ব্যান। আমাশয়ের উপদ্রব সহকারে শিরোত্র্বন (পর্যায়ক্রমে ফির-কস)।

ভক্র ।— চক্রর প্রদাহ ও উহা হইতে সরের হার পীতবর্ণ প্রস্রাব। প্রাতে সরের হার রেয়া হারা চক্রর সংযোজন। চক্ষের যে কোন বোগেই সবের হার বর্ণবিশিপ্ত প্রাব থাকিলে ইহা প্রযোজা। উদরে ক্রমির বিশ্বমানতা বশত: তির্যাক্দৃষ্টি (ম্যাগ-ফস); ক্রমি বিনাশার্থ ইহা ব্যবহার্য। অক্রিব্রণ (Hypopyon)। জ্ঞালাকর ক্রম্প্রাব। চক্রর সম্মুথে ক্লিক্স দর্শন। শ্বেড মণ্ডলের প্রদাহ সহ ক্রেক্সিটে দানার উৎপত্তি (গ্র্যাণুলেশন), এই দানাসমূহ ফোকার হার

দেখার। জ্রুফিউলা জ্বনিত চকু উঠা। চকুর উপরে বেজনা । অস্পত্ত দৃষ্ট, মনে হয় চকুর সমূখে আবরণ বা পর্দা রহিয়াছে।

ক্রি ।—জন্ন ও আমাশরের নানারূপ বিশ্যালা সহকারে এক কর্ণের আরক্তহা, উত্তপ্ততা ও কণ্ডুরন। বাহ্যকর্পে সরের স্থায় মামড়ি সংযুক্ত ক্ষত। আমাশরের বিশৃদ্ধালা সহ কর্ণে উত্তাপ, জালা ও ক্ষুয়ন। কর্ণাদ।

নাজিনকা—নাক খুঁটন (সাধাবণতঃ ক্রিমি অথবা আমাশরের উপদ্র থাকিলে এই লক্ষণ প্রকাশ পায়)। মন্তকের প্রতিশ্রায় সহকারে নাসিকা হইতে পীতবর্ণ হরিতাত আব ও হুর্গন্ধ নিঃসরণ। ত'ল এবং ভিহ্যার বর্ণ দ্রষ্টব্য। নাসা কগুরুন।

ন্দ্র ভা শুকা—জর বাতীত মুখমওলের ফীততা ও আরক্তা।
ক্রমির বিভয়ানতা তাপক মুখ এবং নাসিকার নিকটবলী স্থানের
ভলতা। মুখমওলের সায়ুশ্ল। নিম মাড়ির দক্ষিণ পার্ফে বেদনা।
পাঞ্র বানীলাভ মুখমওল।

সুথ-সঞ্য।—উপর তালুর পদরান্তাগে সরের ন্তার পীতবর্ণ লেপ। টান্সল এবং গলকোষ (ফ্যারিংস্) হইতে পীতবর্ণ প্রাব ক্ষরণ। মুখে সম বা ভামার ন্তায় স্বাদ।

দেক্ত:—আমাশরের অথবা ক্রমির উপদ্রব সহ শিশুদিগের নিত্রাকালীন দাঁত কড়মড়ি। দাঁত উঠিবারকালে পেটের অস্থব।

তি হ্বা — ভিহ্বার পশ্চান্তাণে ভার সরের ন্যায় পীতবর্ণ লেপ এই উয়ধেব মর্বপ্রধান নিবাচক লক্ষণ । ভিহ্বার অগ্রভাগে ফোন্ধা না চুলের বিদ্যানানতা অমুক্তব । কথা বলিতে কষ্ট ।

গলে (জ্হার ভাগ) সরের ভার পীতবর্ণের লেপ। তালুতে এবং

জিহ্বার পশ্চান্তাণে পীতবর্ণ লেপ সহকারে রুত্রিম ডিফগিরিয়া (false diphtheria)। গলমধ্যের যে কোন স্থানের প্রদাহ সহ পূর্ববর্ণিত লেপ বিভামান থাকিলে এই ঔষধের একান্ত প্রয়োজন। গলার ভিনরে গিণ্ডের ক্রায় অনুভব। দ্রল দ্রব্য গিলতে বেশী কঠ। গলার পশ্চান্তাগ হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ প্রেমা পাতত হয়।

আমাশহা ।— জিহ্বার বিশেষ লক্ষণ সহকারে অন্ত্রে কারে কথবা আমাশ্যের যে কোন রোগ (পর্য্যায় ক্রমে ফিরফ্স : । আমাশ্যের বিশুআলা সহকারে শিরংপ জা ও শিরোঘূর্ন, পেটফাঁপা, গভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবিম্বা ও অন্তর ব্যন । বিবিম্বা সহকারে অন্তোলগার, ক্রম অথবা ক্রমিজনিত উদর বেদনা । যৎসামান্ত আহাগ্য গ্রহণে আমাশ্যের কোনও এক স্থানে বেদনা লক্ষণ সংগুক্ত আমাশ্য ক্ষত (gastric ul er) শিশুদিগের ছানার ন্তায় ক্রমাট তন্ধ ব্যন । অন্ত, জল অথবা মলিন পদার্থ ব্যন । অন্তোলগার এবং পাতবর্ণ জিহ্ব। সহ দিসপেপ্রিয়া; মথে অন্তর স্থাদ । আহাবের ওই ঘন্টা পর আমাশ্যের বেদনা । অন্তর ক্রমণ সহ মুথ হইতে জল উঠা । অন্তোদগার সহ পেটফাঁপা । সবুজ বর্ণ অন্তর্গন্ধি মল সহ শিশুর উদরবেদনা । পিত্রের স্বল্পতা জন্ত শিশু বসাময় দ্রব্য জীর্ণ করিতে অক্ষম । পেটে শূন্তভাত্তর সহ কড়ার নিয়ে বেদনা ।

তিবের প্রবং মলে।—সর্জবর্গ অমগন্ধি মল সংযুক্ত অতিসার বিশেষতঃ শিশুদিগের। উদরে বার্জনিত উদর বেদনা সহকারে সর্জবর্গ অমগন্ধি মলম্রাব অথবা সংষত হুগ্ধ বমন। পুনঃ পুনঃ মল-বেগ, অথবা অতিশন্ধ কুন্থন সংযুক্ত অতিসার সহ জেলির ভান্ন আম-আব (কালী-মিউর)। সর্বপ্রকার কমির লক্ষণের বিভ্যমানতা সহ উদর বেদনা। কুন্ত শিশুদের স্বাভাবিক কোঠকাঠিত সহ মধ্যে মধ্যে পাত্রলা

দাস্ত। শিশুব যক্তের শীর্ণকা। সব্জবর্গ, জেলির স্থায় অয়গন্ধি মলের মধ্যে সাদা ছানার টুকড়ার বিপ্তমানতা। হঠাৎ মলবেগ; মলবেগ ধারণ করা যায় না। দক্ষিণ কৃচকি-প্রাদেশে বেদনা। অয় লক্ষণ সহক্ষুদ্র কেঁচোর স্থায় ক্রিমি ও তৎসহ নাসা কণ্ড্রন। ক্রিমিজস্থ মলরারকণ্ডুয়ন, বিশেষতঃ রাত্রে শ্যায়। হৃদ্ম্য কোঠকাঠিস্ত। মলহারে শ্বতবং বেদনা ও কণ্ডুয়ন।

বিশেষতঃ শিশুদিগের (ফিরফস)। বাত রোগ সহকারে মলিন-লোহিত মুক্তাাগ (ফিরফস)। যকতের দোষ হততে উৎপন্ন বহুমূত্র রোগ। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ; মূত্রধারার সবিরামতা। মূত্র থানিকটা নির্গত হয়া ধারা বন্ধ হইয়া ধারা বন্ধ হইয়া ধারা বন্ধ হইয়া ধারা বন্ধ হইয়া ধারা ব্যারার মূত্র নির্গত হয়। মূত্রত্যাগকালে কুন্থন দিতে হয়। অন্ন লাকাল মূত্র নির্গত হয়। মূত্রত্যাগকালে কুন্থন দিতে হয়। অনু লাকাল মহ শিশুদের অবারিত মূত্র। সন্ধি প্রদাহ সহ মলিন-আরক্ত মূত্র। মূ্রাশয়ের পেশীর হ্র্মলতা (atony of bladder.)

পুৎ ক্রেনালের ।— স্থা বাজীত নিদ্রিতাবস্থায় শুক্রস্রাব।
আয়োপ্সর্গ সহ সঙ্গমেচ্ছার বিলোপ বা আধিকা। জলের ক্সায় পাতলা
শুক্র। লিক্ষাদ্রেক সহ প্রবল সঙ্গমেচ্ছা বা উহার বিরতি।
অন্ত এবং শুক্রবাহী-নলীতে (স্পার্শেটিক কর্ড) আকর্ষণবং বেদনা
(drawing pain)

প্রীজননৈ ক্রিয়া—জরায়ু বা যোনি হইতে পীতবর্ণ, জলবং বা অমগন্ধি প্রাব ; যোনি হইতে অমগন্ধি প্রাব ও তজ্জন্ম বন্ধাত্ব। জলবং, সরের ন্থায়, পীতবর্ণ ও অম প্রাব বিশিপ্ত খেতপ্রদর। এই প্রাব যে স্থানে লাগে তথায় কত ও কণ্ডুয়ন জন্মে। অনিয়মিত ঋতু

শহকারে অম বমন। নিয়মিত সময়ের পূর্বে প্রত্যাগত ঋতৃ তৎসহ আপরাজিক শিরঃপীড়া (চক্ষের উপরে), ঋতুর পর শরীর খারাপ বোগহয়; মনে হয় যেন হাঁটুর সায়ু হ্রম হইয়াছে। জ্রায়্-প্রদেশে ত্র্বলতা ও অম্বচ্ছন্দতা অমুভব। জরায়ু-নির্গমন (নামিয়া পড়া)। মলত্যাগের পর অতাস্ত দুর্বলতা ও অবসয়তা অনুভব। আমহাতের ভার বেদনা সহ জরায়ুর স্থান ভ্রষ্টতা। খেতপ্রদরে সরের ভার বা মধুরন্যায় অথবা জলবৎ অমু আব। জরায়ু ছইতে অমুগল্ধি আব নিঃসরণ। শুতুর পুর্বে নিদ্রা-হীনতা সহ প্রবল সঙ্গমেচ্ছা।

প্রাক্ত ।—অম বমন সহ প্রাতঃকালীন বিব্যামাণ অম্যোদ্যার।

স্থাসা-আন্ত্র-ক্ষয়কাস, নিষ্ঠীবন লাগিয়া ওঠে, মুখে বা জিহ্বায় ফতবৎ বেদনা। যুবতীদের কৌলিক ক্ষয়কাসে বারম্বার হাই তোলা. বিশেষতঃ ঋতুর পুর্বের। বক্ষান্থির নিমে ও পঞ্জরান্থির মধ্যস্থ পেশীতে ক্ষতবৎ বেদ্যা। বক্ষবেদ্না, বিশেষত চাপ্দিলে বা গভীন নিঃখাস গ্ৰহণে।

ব্রক্ত স্থতলন-যন্ত।—জীর্ণাক্তির ক্ষীণ্ডাবশতঃ ২ংপিডের ক্রিয়ার বিষমতা ও দপ্দপ্। হং-প্রদেশে কম্পন, আহারের পর উপচয়। শরীরের নান। স্থানে ধমনীর দপ্দপানি অনুভূত হয়।

প্রস্তা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সন্ধির সর্ব্যঞ্জার তরুণ বা পুরাতন বাতে এই ঔষধ অপর কোন ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। সন্ধির আমবাতিক বেদনা ও পায়ের অবশতা, অমগন্ধি ঘর্মবাব। সন্ধির বিদারণ, গাউট (ন্যাট্সল)। গল-গ্রন্থির ফীত্তা। য্যাগ। পৃষ্ঠ এবং হস্তপদাদিতে হর্ম্বলতা অন্নভষ। পদের শীতলতা। হাটিবার কালে পদে অত্যম্ভ হর্বলভানুভব, পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঠিক দিধা ভাবে হাঁটা যায় না। হাঁটু, গোড়ালি, পদের দীর্ঘান্থি, হাঁটু- গধ্বর ইত্যাদি সকল স্থানেই বেদনা। বাহুর ক্লান্তি। বাহুর প্রসারণী পেশীর সঙ্কোচন। মণিবন্ধে কামড়ানি। লিখিবার সময় হস্তে বেননা। প্রতি সন্ধ্রিস্থানেই ক্ষতবং বেদনা (sore feeling)। হস্ত স্থূলির সন্ধিতে আমবাতিক বেদনা। এই বেদনা ক্রতবেগে হৃৎপিঞ্জ্

প্রাক্ত্র না ক্রিনির তারের উপদাহ বশতঃ নির্মাক দৃষ্টি বা মৃথ-মণ্ডলের শেশীর ম্পন্দন। মানসিক শ্রম বা অতিরিক্ত ইন্দ্রির সেবার ফলে সারবীয়তা। পক্ষাঘাতবং দেহের গুরুত্ব। অতিশৃষ্ অবসরতা। চর্মলতা সহ পাকস্থলীতে থালি থালি অমূতব।

ক্রক।—গাত্রকণ্ড্, উহা হইতে পীতবর্ণ, অম প্রাব নিঃসরণ।
অরুণিমার (এরিথিমা) ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা। এর্ম-পামা
(শিশুদিগের মন্তকের একপ্রকার পামা বা একজিমা রোগ)। সর্বশরীরে
মিক্ষিকা দংশনের স্থায় উদ্ভেদ ও উহাতে অতিশয় চুলকানি।
কামলা বশতঃ ত্বকের পীতবর্ণ।

ক্রের। অম বমন ও অম ঘর্ম সংযুক্ত সরিরাম জ্বর। দিনে ঘরফেরগ্রায় পদের শীতগতা ও রাত্রে জাণা। প্রত্যহ জনরাক্তে তাপাবেশ ও নিরঃপীড়া।

নিদ্রা।—কমি জন্ম অন্তির নিদ্রা। নিদ্রিতাবস্থায় দাঁত কড়মড়ি '
ও চিংকার; মলদার ও নাদিকা কঞ্যুন। অতিশয় তন্ত্রালু ভাব।
উপবিষ্টাবস্থায় ঘুমাইয়া পড়া। গাত্রকগুয়ন বশতঃ নিদ্রাহীনতা। সহজেই জাগরিত হইয়া পড়ে। স্থুরতসংক্রান্ত অর্থাৎ রতি বিষয়ক
(sexual) স্থুপ্রেণা।

অন্তব্য।—সকল স্থানের শ্লৈমিক ঝিল্লী হইতে পীতবর্ণ, সরের ভাষ আব ও রোগীর সর্বাঙ্গীন অম লক্ষণ এই ঔষধের বিশ্লিষ্ট লক্ষণ। লিউকিমিয়া (রক্তে খেতকণার আধিকা ও লোহিতকণার হাস)।
লিক্টেকৈ ম্যাণ্ডের প্রথম ক্ষীততা ও পরে কঠিনাকার ধারণ করা।
লিক্তদের শরীরক্ষয় (ম্যারাস্মাস্)। পাণ্ডু (কামলা)। এইরোগে ২×
ক্রমের বিচূর্ণ অতীব ফলপ্রন। অস্থির রোগে হাড়ে ক্যান্ত-ফপের অভাব
হইলে সঙ্গে এই ঔধধ ব্যবহার করিলে (ক্যান্ত-ফসসহ) উৎরুপ্ত
ফল দর্শে। স্তুফিউলা রোগে এই ঔধধ ব্যবহার করিলে সঞ্চিত বিরুত
পদার্থ দ্রীকরণে বিশেষ সাহায্য হয়। বাত জনিত সন্ধির ক্ষীততা
এবং রক্তহীনতায়ও এই ঔধধ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

উপ্চত্র-উপশ্ব ।—ঝড়বৃষ্টি ও মেঘগজ্জন-কালে এই ঔষধের অনেকানেক বেদনার বৃদ্ধি জন্মে। ঋতুকালীন লক্ষণের আপরাহ্নিক ও সায়াহ্নিক উপচয়। খোলা বিমৃক্ত বায়ুর অনিচ্ছা।

ত্রহা।—সাধারণতঃ এই ঔষধের ৩×, ৪× এবং ৬× এন ব্যবস্থাত হয়। রক্তে যে পরিমাণে এই পদার্থ বিভাষান আছে সেই অমুপাতে ইহাব ৪× ক্রম ব্যবস্থা করিতে কোন কোন বিজ্ঞাচি কিৎসক উপদেশ দেন। ক্রমিউপসর্গে মলছারে ইহার ইজেকসন দিবারও বিধি আছে। কেহ কেহ এই ঔষধের ৩০× বা তদুদ্ধ ক্রম ব্যবহার করিয়াও উত্তম ফল পাইয়ছেন।

সহ হা ।— জ্রুফিউলা সহ রোগীর ''অয়'' লক্ষণ বিভ্যান থাকিলে ক্যান্ত-কার্মের সহিত ভূলনীয়। আমাশ্রের প্রাভিশায়িক লক্ষণের বিশ্বমানভার ক্যাল্কেরিয়া, কালা-কার্ম্ম, নক্স-ভ, ককিউলাস, কার্ম্বোভেজ ও কার্মালিক-এসিডের সহিত ভূলনীয়। শিশুদের রোগে ''অয়ু' লক্ষণের বিজ্যানভায় বিশেষতঃ মলে ও সর্বাশনীরে অনুগল্ধ থা কলে রিউমের সহিত হহার বিশেষ সাদশ্য দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় ইহার যে কোনভাট ব্যবহৃত হইতে পারে। গ্রন্থিবাত সহ ডিস্পেপশিয়া অর্থাৎ অগ্নিমান্যা

ন অম-লক্ষণের বিশ্বমানভার ইহা অভিশ্ব উপকারী ঔষধ। এইরপ অবস্থায় ইহার সহিত কলচিক্ম্, বেঞ্জারিক এসিড, গোরেক্ম, লাইকো এব সলফারের তুলনা হইতে পারে। সর্কাশরীরের কণ্ডুয়নে ডলিকোস্ ভার্টিকা এবং সলফার প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

নেট্রাম-সলফিউরিকম

Natrum Sulphuricum.

ক্রাথাকে।

সাধারণ ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ।

এই ইন্-অর্গ্যানিক সর্ল্ড অন্তঃকেবিক-বিধানে (ইন্টার সেলুমার চিন্তু) পরিদৃত্তি হয় এবং ইহা কর্জ্কই দেহস্তিত রস, রক্ত ও জলের সামপ্তপ্র পরিবল্ধিত হইরা থাকে। পোডিয়ম ফক্ষেট্ জল প্রস্তুত করিয়া থাকে, সোডিয়ম ক্রেন্টেড বা লবণের সাহায়ো জল সমস্ত বিধানে পরিব্যাপ্ত হয় এবং ইহাপ (কাট-সলফ) সাহায়ো দেহের উন্ত্র (অনাবশ্রুকীয়) জল দেহ হইতে নিঃমার্বিত হইয়া থাকে। রক্তে, এবং সম্ভবতঃ অন্তঃকৌর্কি বিধানে, স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষা জলের পরিমাণ বিদ্বিত হইয়া থাকে। ক্রেন্ত, কলেরা, পীতজ্বর প্রভৃতি উষ্ণ ঋতুঘটিত ব্যারাম সকলের স্বৃত্তি হইয়া থাকে। কেমন করিয়া এই সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ভাহা ক্র সকল রোগের বর্ণনা কালে উল্লেখ করা যাইবে।

পিতের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া বা প্রভাব নিবন্ধন পিতের সমজা বিক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু পিতে ইহার পরিমাণের ন্যুনতা হইলে পিত গাঢ় ও বিক্ষত হইয়া নানা রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। <u>নানা প্রকার</u> পিত্ত-বিকারের ইহা একটি প্রধান ঔষধ।

বে সকল পীড়ায় জিহ্বায় সবুজাভ ধুসর (Greenish grey) অথবা পাংগুটে সবুজ (Greenish brown) বর্ণের লেপ দেখা যায়, তাহাতেই ইহা বিশেষ উপকারী। অপর, পিত্তাধিকা জন্ম হস্ত-পদাদির জালা, সবুজবর্ণ পিত্তমিশ্রিত মল বিশিষ্ট উদরাময়, পাওু বা কামলা (জণ্ডিস), পাথরী, পিত্তবিকার জন্ম সশর্কর-মৃত্তা, যক্ততের পীড়া জন্ম শোপ, মাথাধরা পিত্ত বমন, মুখের তিক্রস্থাদ প্রভৃতি রোগে অতিশন্ন সফলতার সহিত হচা ব্যবহৃত হটয়া থাকে। মোট কথা পিত্তবিক্রতির জন্ম যে সকল বানহা উৎপন্ন হন্ত, তাহাতেই এবং যে কোন কারণেই কেন হউক না, বশনহ রক্তে বা অস্তঃকৌষিক-বিধানে (inter-cellular tissue) জল সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে, তথনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বেশ প্রবণ রাখিবে যে, পিত্রবিক্রতি জনিত দোষ দূর করিতে ও বিধানতন্ত্রের মধ্যন্তিত সঞ্চিত অনাবশ্রকীয় জল নিঃসারিত করিতে ইহা

দেহে নেট্রাম সলফের ক্রিয়া নেট্রাম-মিউরের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয়ের ভিতরেই জলকে আকর্ষণ করিবার শক্তি বা ধর্ম বিভাষান আছে সত্য, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্যের জগু। শরীরের অভ্যন্তরে দৈহিক কাজের জগু যে জলের প্রয়োজন নেট্রাম-মিউর সেই জলকে আকর্ষণ করিয়া কার্য্যে লাগাইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের কার্যে ব্যয়িত হইয়া যে জল অবশিষ্ট পাকে (অর্থাৎ যাহা আর কোন প্রয়োজনে লাগিবেনা) নেট্রাফ-সলফ সেই জলকে আকর্ষণ করিয়া উহাকে দেহ হইতে বাহিব করিয়া দেয় (eliminates)।

নেট্রাম-মিউরের জিগ্নায় অগুকোষ (cell) গুলির সংখ্যাধিক্য জন্ম । নেট্াম সলক আবার ক্ষপ্রপ্র বা জীর্ণ খেতকণা হইতে উহার জলভাগ পৃথক করিয়া লয়। এইজন্ম লিউকি মিয়া অর্থাৎ বক্তে শ্বেতকণার আধিক্যে ইছা উপযোগী ঔষ্ধ। নেট্রাম-সলফের ক্রিয়ায় এপিথিলিয়েল সেল এবং সায়ুর উপদাহ জন্ম। এই উপদাহের কলে বুরুকস্থ ইউরিনিফেরঃস টিউবের এপিথিলিয়েল সেল হইতে অতিরিক্ত জল মুত্রবাহীনল হার। বাহিত হইয়া মৃত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়। মৃত্রাশয়ের এই সঞ্চিত জলই মৃত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পিতৃবাহী গুণালী (bile-duct), ক্লোম্যন্ত (pancreas) এবং এপিথিলিয়েল সেলের উপর নেট্রাম-সলফের উত্তেজনার ফলে ঐ সকল যন্ত্র হইতে নিয়মিক আব ক্ষরিত হইয়া থাকে। ধনি যুত্রাশয়ের বোধক-স্নায়ু (sensory nerves) নেটাম-সলফ কড়ক উত্তেজিত না হয়, তবে মুত্র-ত্যাগেচছার জ্ঞান জন্মে না। ইছার কল স্বরূপ অবারিত (অনিচ্ছার) মূত্র রোগ জন্মে। ইহার ক্রিয়ার ফলে বুরুকের গতিজনক স্বাযুৱ উপদাহ না জিনালে মূত্রনাশ (suppression) উৎপন্ন इय ।

পিত্তকোষের (gall-bladder) স্বায়ুতে নেট্রাম-সলফের অনিয়মিত (irregular) ক্রিয়ার ফলে পিত্তপ্রাবের আধিকা বা উহার অভাব ঘটে।

যদি ক্লোমনসের (pancreatic fluid) স্বল্পতা জন্ত মধ্মেছ (ডারাবিটিস) রোগ উৎার চইয়া থাকে, তবে নেট্রাম-সলফ ভাছাব প্রকৃত ঔষধা নেট্রাম-সলফের ক্রিয়ার ফলে যদি স্থ্লান্তের (কোলন) মোটর-নার্ভের ক্রিরাং উত্তেজিত না হয় তবে তাহার ফলে কোঠকাঠিক অথবা আগ্রান শূল (flatulent colic) উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার অস্যমক ক্রিয়ার ফলে অস্তঃকৌষিক বিধান হইতে অনাবশুক জল অপসারিত না হইলে রক্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি পাপ্ত হয়। ইহাকেই হাইডিমিয়া বলে। এই হাইডিমিয়া এবং পিত্তকোষের ক্রিয়ার ব্যক্তিক্রিমা বলে। এই হাইডিমিয়া এবং পিত্তকোষের ক্রিয়ার ব্যক্তিক্রিমার ফলেই পৈত্তিক এবং সবিরাম জ্বর, ইনফুয়েজা, পিত্ত বমন শেতিক অতিসাশ, শোথ, ইরিসিপেলংস, পীতবর্ণ জলবং রস পূর্ণ উদ্ভেদ, জলবং আব সংযুক্ত একজিমা, দক্র, আঁচিল ও প্রক্তিশ্রায় উৎপন্ন হয় এবং তৎসহ পীতাত সব্জ বা সব্জ বর্ণের আব নিংস্ত হয়। ডাং গভোল যাহাকে হাইড্রোজিনয়েড কনষ্টিটিউশন বলেন এই নেট্রাম সলকের স্বল্লতার কলে ঠিক তদমুরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শেহাইড্রোজিনয়েড গাতৃর রোগীয়া আর্দ্রকালে (বর্ষাকালে) জলের নিকটবর্তীস্থানে সমন্তেপেকুলে বাসে, এবং আবদ্ধ সেতসেতে গৃহে বাসে খারাপ অকুত্রব করে এবং এই সকলের বিপরীতাবস্থায় ভাল থাকে। এই সকল বেগানীর পঞ্চে নেট্রাম-সল্ল অম্বলা উবন।

যেখানে সামান্য বিরেচক ঔষধের প্রয়োজন, সেথানে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইহার ক্রিয়ায় অন্ত্র, যকুৎ এবং ক্রোম্বয়েব ক্রিয়া উত্তেজিত হয় এবং তাহার ফলেই ঐ সকল বন্ধ ছইতে প্রাচুব রুস (secretion) নিঃস্কৃত হয়। এই জন্মই কোষ্ঠ-কাঠিন্তে ইহা ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া থাকে।

জিহবাব মৃলদেশে সব্জাভ ধুসর অথবা পাংশুটে সবুজ বর্ণেব লেপ (greenish grey or greenish-brown coating on the root of the tongue) এবং বামপার্শে শয়নে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবার পরিচালক লক্ষণ। ম্যালেরিয়া জ্বের হোমিও-

প্যাথিমতে যে স্থলে সল্ফার বা নেট্রাম-মিউর ব্যবস্থের হয় সেইস্থলে এই উষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। রক্তরোধক-ঔষধরূপেও ইহা একটী অমূল্য ঔষধ। ডাঃ রেভাডিনি ফ্রান্সের সাজ্জিকেল এসোসিরেশনেব এক সভায় নেট্রাম.সলফের রক্ত-রোধক গুণসম্বন্ধে এবং কি করিয়া ইহা রক্ত প্রাব বন্ধ করিয়া থাকে তৎসম্বন্ধে এশ বিস্তৃত ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার ফলে নেট্রাম-সলফের এই গুণ সর্ব্বাদীসমাতরূপে গৃহীত হয় ৷ ৩×ক্রম দেড়প্রোণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় এই উদ্দেশ্যে ইহা বাবস্ত চইয়া থাকে। একটা টিউমার অন্ত্রক্রিয়াদারা ওুলিয়া ফেলিবার পর প্রভূত রক্ত্রাব হইতে থাকে। প্রায় ৮ সপ্তাহকাল পর্যান্ত এই রক্তরাব বন্ধ কারবার জন্ম বহু ঔষধ ব্যবহার করা হটা 📿 🏲 কিন্তু কিছু কেই কিছু হয় নাই। পরিশেষে এই ঔষধ পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবহার করায় অতি সত্বর রক্তসাব বন্ধ হয়। জরায়ু হইতে প্রভৃত রক্তসাবের ও (মনোরেজিরা) ইহা একটা উৎক্লপ্ত ঔষধ। ঢাকার জনৈক সবজজের স্ত্রী বহুদিন যাবৎ মেনরেজিয়া রোগে ভূগিতে ছিলেন। সহরের প্রধান প্রধান এলোপ্যার্থ . চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু কিছুতেই কেছ এই রক্তস্রাব বন্ধ করিতে পারেন নাই। বছদিন যাবৎ প্রভৃত রক্তস্রাবের ফলে রোগিণী অত্যন্ত হর্ম্বল ও নীরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুখ-মণ্ডল পাঞ্র, গাত্র শীতল এবং নড়িবার সামর্থ্য পর্যান্ত ছিল না। ফৎপিত্তের ক্রিয়া লোপ হইবে আশস্কায় ডাক্টারেরা মধ্যে মধ্যে ইঞ্জেকসন দিতে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থায় চিকিৎসা-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়। গ্রন্থকারের হত্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করা হয়। রোগিণীর সর্ব্রাঙ্গীন লক্ষণ দৃষ্টে নেট্ৰাম-সলফ ৩×দেড়গ্ৰেণ মাত্ৰায় প্ৰতি জৰ্ম ঘন্টান্তর উষ্ণ জলে গুলিয়া ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পর হইতেই শিত্তি সম্বর রক্তপ্রাব বন্ধ হয় এবং রোগিণী সম্বর পূর্ণ আরোগ্য লাভ

করেন। সর্ব্যপ্রকার রক্তপ্রাবেই আমরা নেট্রাম-সলফ ৩× ছইটী করিমা ট্যাবলেট অর্দ্ধ ঘণ্টাস্তর ব্যবহার করিয়া আশ্চর্যাফল পাইয়াছি।

হিমোফাইলা রোগের এবং ফিতার ন্থায় ক্রিমির ও ইহা উৎক্বপ্ত ঔষধ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

হানার প্রকৃতি, বলপূর্বক উহা দমন কবিতে হয়। গীতবালে অপ্রকৃত্রতা প্রতি উহার আধিকা। অতিশয় নিরুৎসাহিতা। প্রতি এবং আদুগাতুতে বুদ্ধি। মনংক্ষুগতা ও বিষগ্গতা। প্রতিকার কর্মণের উপচয় বা বৃদ্ধি। পত্রন অথবা মন্তকে আঘাতাদি লাগাং ফলে মান্সিক লক্ষণের উৎপত্তি।

মান্তক ।— মন্তক শিথরে অতিশয় জালা ও দপ্দপ্কর শিরঃপাড়া (জিহ্বার বর্ণ দ্রন্ট্রা)। পিত্ত বমন-বিবেচন ও মুথের তিক্তসাদ সংযুক্ত মংপাধরা। শিরোঘূর্ণন বা নিদ্রালুতা সংযুক্ত শিরঃপীড়া। সাধারণতঃ পাঞ্জুরোগের পূর্কে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতিরিক্ত পিত্রাব ক্য শিরোঘূর্ণন। জিহ্বার পশ্চাদ্রাগে পরিশ্বার সবুজাভ ধুসর বা পাংগুটে বর্ণের লেপ। মুথের ভিক্তসাদ। মন্তিষ্কের ভূমিদেশে (base of brain) প্রবল বেদনা। মন্তকে রক্তের প্রধাবন সংযুক্ত স্পাইন্তাল মিনিঞ্:ইটিস। আক্ষেপ সংযুক্ত প্রলাপ (ফির-ফ্স, ম্যাগ-ফ্স)। দক্ষিণ কপালে ভেদনবং (রক্ত করণের স্তার্ম) বা জুবিদ্ধবং বেদনা। আবাত বা পত্রনাদির ফলে মন্তিষ্ক রোগের উৎপত্তি। মনে হয় মন্তিক শিথিল বা চিলা (loose) হইয়াছে।

ভক্ত ।— <u>বেতমগুলের পীতরর্ণ। অশুস্রার সহকারে চক্ত্র পাতার</u> প্রান্তভাগে জালা। অকিপুটে (পাতার) ফোন্ধার ন্তার বৃহৎ পীড়কা, তৎসহ জ্বালাকর অশ্রুপ্রাব । খেতমগুলের পুরাতন প্রদাহ সহকারে পাতায় দানার উৎপত্তি ও তৎসহ অভ্যন্ত আলোকাসহ্যতা।

ক্র । — কর্ণ । কর্ণে বিহাতের ন্থায় চিড়িকমারা বেদনা। আর্দ্র খতুতে উপচয়। কর্ণাভ্যন্তর হইতে কিছু যেন বলপুর্বক বাহি র হইতেছে এরূপ অমূভব। কর্ণে ঘণ্টার ন্থায় ধ্বনি।

নাসিকা—ঔপদংশিক পৃতিনশু (হুর্গন্ধি পৃষ্প্রাবী ক্ষত) আদু খতুতে বৃদ্ধি। ঋতুকালে নাসিকা হইতে রক্তপাত। নাসিকার অবক্ষতা কাসিয়া কাসিয়া লবণাক্ত শ্লেমা নিঃসারণ। নাসিকার প্রতিশ্রায়। নাকের ভিতরে উদ্বান্তব ও জ্ঞালা। আলোক-সংস্পর্শে নাসা হইতে নিঃস্ত পৃষের সব্জবর্ণ ধারণ। নাসা-পক্ষদ্বয়ে কণ্ডুয়ন; (কাসিয়া কাসিয়া) লবণাক্ত নিষ্ঠাবন তুলিয়া ফেলা।

মূখ মণ্ডলৈ—পিতাধিক্যবশতঃ মুখমণ্ডলের পাঞ্ বা পীতবন (জহবা দ্রষ্টবা)। মুখমণ্ডলের আরক্ত, মন্থন উজ্জল ও স্ফীত বিদর্প (ইরিসিপেলস)। বিদর্শের জরে ফির-ফ্স ব্যবহার্যা। মুখমণ্ডলে কুদ্র ক্রি পীড়কা।

সুথ-সঞ্জা ।— মুথের বিশ্বাদ সততই মুথে গাঢ় আঠা আঠা, গশ্ছেদ্য শ্লেমা সঞ্চয়। তিক্তাশ্বাদ। সর্বাদাই জ্বোর করিয়া কাসিয়া গলা হইতে আঠা আঠা, গ্রন্ছেদ্য শ্বেত শ্লেমা তুলিয়া ফেলিতে হয়। সাধারণত: পাকস্থলী হইতে এইরূপ তুর্গন্ধি শ্লেমা উঠিয়া থাকে। মুথের চতুদ্দিকে ও চিবুকে কৃত্র কৃত্র পীড়কা। তালু স্পর্শে বেদনা। শীতল দ্রবা পানাহারে উপশ্য। মুথ বিবরে জ্বালা।

দ্ভে।—জিহ্বার ভূমি-দেশে মলিন, সর্জাভ, ধ্সর বা পাংশুটে বর্ণের লেপ। তিক্তশাদ। জিহ্বার অগ্রভাগে জালাকর ফোন্ধা। জিহ্বার আরক্তা।

দ্ব ।—তাগ্রকুট সেবনে এবং শীতল বাতাসে দস্ত বেদনার উপশম
মুখে ঠাগু হল রাখিলেও দন্ত বেদনার উপশম বোধ (কফিয়া); মাড়িতে
ভালা ও ফোন্ধা।

সালে নিজ্যা।—ডিফথিরিয়ার সবুজ বর্ণ জল বমন কবিলে কালীমিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। গলাধঃকবণকালে
গলার পিঙের ন্যায় কোন বস্তুব বিজ্ঞমানভাত্মভব। গলক্ষত। ফ্যারিংসের
প্রভিশ্যায়, প্রভূত গাড় ছম্ছেন্ত হোমা নিঃসরণ। প্রাভঃকালে লবণাক্ত
স্লেশ্য কাসিয়া তোলা।

আমাশ হা — মুথে তিক্তারাদ সহকারে উদর বেদনা। সীখের বিধাক্ততা জনিত উদর বেদনায় নিম্নক্রমের (১×বা ২×) উব্ধ ১০।১৫ মিনিট অন্তর অন্তর ব'বহার্যা। মুখের তিক্তাম্বার, শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়া সহকারে পিত্তবমন। আমাশয়ের বিশৃথলাজনিত উদ্ধোদরে বেদনা ও শিবঃপী ।। যক্তংপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা। যক্কতের বিবৃদ্ধি, বামপার্যে শরনে উল্চয়। বাম কুকিদেশে বেদনা। আমাশয়ের রোগে জিহবা লক্ষণ বিশেষ জন্তব্য। মুখে তিক্তস্থাদ সহ পিত্তশুল। পাকস্থলাতে জালা। আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি। প্রত্যহ অপরাফে পিপাসা। লোণা সবুজাভ জগ ব্যন। পিতৃশ্ল; অয়োদগার, বুকজালা ও পেটফাঁপা; উদরে বায়ু সঞ্য় জনিত শ্ল বেদনা; প্রাতে থালিপেটে রুদ্দি, যক্ত্-প্রদেশে কর্তনবং ও কালক'রে নেওয়ার মত বেদনা; ষক্লতে পূর্ণতা, বামপার্শে শয়নে यक्र९ বেদনার বৃদ্ধি; একপ্রকার शাসি ও তৎসহ পুষারু নিষ্ঠাবন; বাম কুক্ষিণেশে বেদনা; পাক্তলা ক্ষাত বোধ হয়; কোমরে ক্ষিয়া কাপড় পরা সহ্য হয় না ; পিত্রশীর বদনা সহ কামলা ; বরুৎ হইতে বামদিকে ও নিয়াভি''থে বেদনার গতি; পিত্রশূল ও পিত্রশীলার বেদনায় এই ঔষধ ৬× বা ৬× ক্রন ১০০১৫ মিনিট পর পর গরম জল মহ (চার্টো ট্যাবলেট) থানতে দিলে অতিস্থনর ফল দশে; এই গুরধের সহিত পর্যায়ক্রমে ম্যাগফস ৬× এবং ক্রাক্র-ফন ১২ ×ব্যবহার ক্রিয়া আমরা পিত্তসূলের সকল রোগীতেই অতি উৎক্লপ্ট ফল পাইয়াছি।

তাদরে তা মানা — মলিন সবুজ, পিত্তময় মল জাণবা পিত্ত
বমন সংখুক অতিসার (জিহ্বা দ্রষ্টবা); প্রাভঃকালীন অতিসার, আর্দ্র,
নীতল প্রতুতে উপচয়; মলদারে এবং অয়ের নিয়াংশে উতাপ দহকারে
পিত্তময় মলস্রাব; আগ্নান সংযুক্ত উদর বেদনা; য়কতে তীর তিরবিদ্ধবণ
বেদনা সহকারে স্পার্শ-দ্বেষ; কোমরে কষা কাপড় সহাকরা ঘার না;
পৈত্তিক জরসহ উদরে বায়ু সঞ্চয়; আয়ানশূল; দক্ষিণ কুচকি-প্রদেশে
প্রথম বায়ু সঞ্চয় হয়, তৎপর সমতা উদরে উহা ছড়াহয়া পড়ে; সব্জ
মলসহ তলপেটে উষ্ণতাম্বভব; য়কতে রক্তসঞ্চয় (ক্রিরফস) উধরে
কর্তানবং বেদনা (ম্যাগ-ফস, ফ্রির-ফস); রদ্ধদিগের অতিসার; আর্দ্র ক্ষাত্রত সকল লক্ষণের বৃদ্ধি; রুদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের কেলিক অতিসার.
মলদার কণ্ডারন; সহজেই বক্ততের ক্রিয়ার বৈষম্য, বিশেশতঃ মানসিক
পরিশ্রমের পর; স্পার্শে বা সঞ্চলনে বক্ততে চিড়িকমারা বেদনা,
প্রাভঃকালে তরল দান্ত, বিশেষতঃ আর্দ্রকালে; মলদারে আচিলের
ভাায় উদ্বেদ; সাইকোসিম্।

সূত্র-শক্তা — বহুসূত্র (প্রধান ওঁয়ধ); বহুসূত্রের শর্করা কমাইতে ইহা অতিশয় মূলাবান ঔয়ধ; মূত্রে লিথিক এসিড সংযুক্ত অধঃক্ষেপ, এই অধঃক্ষেপ বা তলানি হস্তক চূর্ণের মত দেখায় (লাইকো) এবং পাত্রেয় তলে লাগিয়া পাকে; পিত্রপ্রধান লোক দিগেয় বাত ও মূত্রাম্মবী (stone) বহুসূত্রের রোগীদিগের প্রভূত মূত্রুআব; মূত্রে বালুকণার স্থায় অধঃক্ষেপ (জিহ্বা দেইবা); মূত্রে পিত্রের বিভ্রমানতা। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। লিগ মূঙ্রে বা অহুকোবে জল সঞ্চয়। প্রেষ্টে-গ্রন্থির বির্দ্ধি। মূক্রে পুষ ও শ্লেমানতা।

পুথ জেলালে ক্রাট-মিউর); পুরাতন উপদংশ; যোনি বা গুল্গারে উপবংশিক আঁচিলবং উপমাংস; পুরাতন প্রমেহ; প্রাষ্টেক গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি;
জননেন্দ্রিয় কণ্ডুয়ন; বিলুপ্ত প্রমেহ ও সাইকোসিন। শুমেহ রোগে
ইহা একটী প্রধান উষ্ধ।

কক্ষ-গ্রন্থির স্ফীততা ও পৃষসঞ্চয়; তপুলীর নথের গোড়ায় প্রদাহ ও পুষসঞ্চয়। উপবিপ্রবিস্থা হইতে উত্থান বা শ্যায় পার্থপরিবর্ত্তনকালে ক্টিবাতের অভান্ত বৃদ্ধি; কোন অবস্থায়ই শাস্তি পাওয়া যায় না; উরু হইতে ইণ্টুপর্যান্ত বেদনা; সন্ধিতে কড় কড় শ্দ; সন্ধিবাত্ত।

প্রেটিক ন নৈ ক্রিক করা ৷— প্রাতঃ কালীন অতিসার অথবা উদর বেননা এবং কোঠকারিস সহ প্রভূত ঋতুপ্রাব (জিহ্বা দ্রুইবা); বাহা ট্রীজননে দ্রিমের প্রদাহ ও ক্ষীওতা এবং তহুপরি বিস্তর আদ্র গুটিকার উৎপত্তি। উদর বেদনা সংযুক্ত প্রভূত বিদাহী রজপ্রাব; বিদাহী

প্রাক্ত ।—প্রাতঃকালীন বিবমিধা ও পিত্তবমন, মুথের তিক্তমাদ; বাহ্য-স্ত্রীমফ্লে দক্র ও তৎসহ বেদনা।

প্রাহ্ন-আন্তা । প্রাত্ত আবেশ সহ প্রভৃত হরিতাভ (সর্জ) প্রময় নিষ্ঠাবন ত্যাগ। প্রাত্তকালে পাতলা মলস্রাব এবং আরু ঋতুতে বৃদ্ধি লজণাপর খাস-কাস; বায়ুভুজনলীর প্রতিশ্রায়; হিস হিস্ শব্দ সংযুক্ত খাস এখাস; নিষ্ঠাবন এবং জিহ্বার বর্ণ অবশ্র জইব্য। কর রাস, জলবং পীত বা সর্জবর্ণ নিষ্ঠাবন; হিউমিড্ এজমা (প্রাবশীল) বৃক্কে শ্রেমার অভ্যত্তি; কাসিবার কালে বৃক্ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়; বাম বক্ষে ভিন্নকর বেদনা। বক্ষে পিতশিলার বিজ্যানতামূত্র ; গাঢ় রক্জ্বং সর্ভাজ পুষের স্থায় শ্রেমা নিঃসরণ।

বক্ষে ক্ষতবং বেদনা, এজন্ত রোগী কাসিবার সময় হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরে। আদ্রুপিতুতে খাস কষ্ট।

ব্যক্ত সঞ্চলন-অন্ত ।—হৎপ্রদেশে প্রচাপন এবং অমুস্তার্ তক্ত গান্তির নিমিত্ত খোলা বাডামে বাওয়ার আবশ্রকতা।

পৃষ্ঠ এবং অঞ্-প্রত্যক্ত —বাভরোগে পৈতিক লক্ষণের বিগ্রমানতা থাকিলে প্রধান ঔষধ ঝাট-ফ্সের সহিত পর্যায়ক্তমে ব্যবহার্য্য; তরুণ বা পুরাতন গেটে বাত (ফিরফ্স); পূর্চবংশীয় মজ্জাব ঝিল্লার প্রদাহে গ্রীবার পশ্চাদ্বক্রতার, পূর্চের আক্ষেপে এবং মন্তকে রক্তের প্রধাবনে ইহা ফ্লপ্রদ; তরুণ সন্ধিবাত; স্পাইন্তাল মিনিঞ্জাইটিস ক্ষ-গ্রহের ফ্লীততাও উহাতে পৃষ্ সঞ্চয়। বাম উক্তে চিড়িক, হস্তের কম্পর, পদের হর্ষলতাও জল সঞ্চয়, হস্ত পদের নথ-মুলের প্রদাহ ও পৃষ্ সঞ্চয়। পদতলে কণ্ডুয়ন। উঠিবার সময় বা শ্যায় পার্শ্ববির্ত্তনকালে সাঙ্গিকার বেদনা অনুভূত হয়;কোন অবহায়ই শান্তি জন্মে রা। হস্ত-পদে তামবাতিক বেদনায় অপরাপর লক্ষণের সাদ্র্য থাকিলে।

সাক্রমগুল ।—নিদ্রিতাবস্থায় হস্ত-পদের উৎক্ষেপণ; পৈত্রিক উপদ্রব সহকারে হর্মালতা ও ক্লান্তি; অত্যন্ত অবসরতা; বিশেষতঃ হাঁটুতে অবিরাম নিদ্রবার প্রারতি। সর্কাঙ্গের কম্পন; নিদ্রিতাবস্থায় হাত পায়ের উল্লন্দ্রন। লিথিবার সময় হন্তের কম্পন। উদ্র বেদনা সহ অবসঃতা।

ত্রক।—ত্তের সম্ববিধ রোগেই জলবং পীতাভ আব নি:সরণ,
পৈত্তিক লক্ষণ সহ ত্তেক আর্দ্র পীতাভ শক্ষরৎ উপত্রক; শিশুদিশের ত্ততের
ভূষ্টতা ; গাটিমি, স্থাট-ফন) পীতাভ জলবং আব সংযুক্ত বিষিকা।
ইরিসিপেলঃস; বস্তু ত্যাগকালে ত্তের কণ্ডুয়ন; দীর্ঘকাল স্থায়ী নালীঘা,
একজিমা, পেন্ফিগংস; দক্র; কামলারস্থায় ত্তের পীতর্বণ। চক্ষুব

টকুর্দিকে, মস্তক-ত্বকে, মুখমগুলে, বুকে এবং গুইন্দারে আচিলের উৎপত্তি প্রবর্ণকা।

ত্রত্বাদ সহকারে পিত্ত অথবা র্নফর্বর্ণ পদার্থ ব্যন; পীত জর (ফিন-ফ্স পর্যায়ক্রটেম); অরে জিহ্বা লক্ষণ বিশেষ দ্রষ্টব্য; আভ্যন্থরিক শীতলতা; শীত সহ সন্ধ্যার প্রাক্ষালে ব্রফেম্ব ক্যায় শীতলতা; যন্তক শিখরে উত্তপ্ততা পিপাসাহীন মর্ম্ম; যক্রৎপ্রদেশে স্পর্শে বেদনা; উদরে বায়ু নড়াচড়া করে। অতিশ্য় শীত ও কম্পুসংযুক্ত ম্যাহে বা জরে ও তংসত পিতৃব্যন লক্ষণ বিশুমান থাকিলে ৩× ক্রম স্বন ঘন ব্যবচারে চ্মৎকার ফলন্দেশ।

ন্দ্রা।— পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে নিদ্রাগৃত। ও ক্লান্ডি; (সাধারণতঃ পাতৃরোগের পুর্বে); প্রাতে, বিশেষতঃ জ্বায়ন করিবার কালে নিদ্রালুতা ও বিমূদতা; অপরাহেন ভাল থাকে। প্রাতে ও অধ্যয়নকালে বৃদ্ধি। অপ্রাক্রোধ। অপ্রেভয় পাইয়া জাগ্রত হওয়া।

আজালা — বায়তে জনীয় বাপের আগিকা হহলে এবং উক্ত জনীয় বাঙ্গা নি:শসিত বায়র সহিত ফুসফুসে প্রবেশ করিলে রক্তের জনায়াংশের বৃদ্ধি হয়। এই অনাবশুকীয় জল রক্ত প্রোতে প্রবেশ করিয়া শরীরে নানাপ্রকার উপদ্রব (disturbance) উপস্থিত করে এবং প্রকৃতির সাহায়ো দেহ ইইতে নিজ্ঞান্ত হইতে চেষ্টা করে। প্রকৃতির সাহায়ো উক্ত জলীয়াংশ মলদ্বার দিয়া বাহির হইলে ওলাউঠা, গ্রন্থিতে সঞ্চিত বা আনদ্ধ হইলে প্রেগ ও ফুক মধ্যে আবদ্ধ হইলে বেবিবেরি, বসস্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া খাকে। নেট্রাম-সলফ শরীর হহতে অভিরক্তি জল নিঃসারণে সাহায্য করে স্থতরাং এই সকল রোগে নেট্রাম-সলফ আরোগ্যকর এবং প্রভিষেধকরণে ব্যবহৃত ইইয়া থাকে। প্রীতে, আর্দ্ধ গ্রুতে এবং বে কোন প্রকারে

প্রশালনিয়ার আক্রমণ এবং শুদ্ধ উত্তথ্য প্রতৃত্তে সকল লকণের উপশ্ম এই ওমধের বিশেষ লকণ। জিবোলকণ এই ওমধ নির্বাচনে বিশেষ সাহায়া কবে। মংশু অথবা জলজ উদ্ভিজ্ঞাদি ভক্ষণে রোগোৎপত্তি হইলে ইহা অ্যাবস্থেয়। এই ওমধের রোগী বেদনার শান্তির জন্ম সর্বাণ এপাশ কবে (বস) সামপাশ্বেশিরনে বোগাল্পতি উ্যধের জাপন বোগাল্পতি বুদ্ধির জ্ঞান কবে (বস) সামপাশ্বেশিরনে বোগালকণের বুদ্ধি এই

ত্রতা।—শীসশৃলে : × বা ৩ × ক্রমের ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার্য।

স্থলার এই ঔষধের ৬ × ব্যবহারের উপদেশ দেন। ভাঃ ভনগ্রভাল

সাধারণতঃ ২ × হইতে ৬ × ক্রম পর্যান্ত ব্যবস্থা করিতেন। ডাঃ

হেরিং এবং অন্তান্ত স্থবিজ্ঞ চিসিকংসকর্গণ এই ঔষধের ৩০ এবং ২০০
ক্রম ও ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ ইহার ৩ × ও

৬ × ক্রম ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়া থাকি। ম্যালেরিয়া জরে

ইহার ৩ × ক্রম একটু বেশীমাত্রার ও পুনঃ পুনঃ (ফিরম-ফ্সের সহিত্ত
পর্যায়-ক্রমে) ব্যবহার করিতে সকলকে অন্তরোধ করি।

ক্রান্থান-সলক্ষের আর আর নেট্রামের সহিত এবং সলফারের সহিত নেট্রাম-সলক্ষের অনেকানেক লক্ষণেরই সাদৃশ্য আছে। চক্ষু লক্ষণে ইহার সহিত গ্রাফের তুলনা করুণ। পুরাতন চক্ষুরোগে এই এই ঔষধেই আলোতে অভ্যন্ত উপচয় কলো। কাসে ব্রাইওনিয়ার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কাসিবার কালে বক্ষে হাতদিয়া ধরিবার আবশ্যকতা উভয়েই আছে; নেট্রাম সলক্ষের শ্লেয়ার আরুতি ও প্রকৃতি অনেকটা প্যের কায় (গাঢ় রক্ষুবং পীতাভ সবুজবর্ণের); এজন্ম ইহা প্রায়ই রোগের প্রবিদ্যায় ব্যবহার্য্য; কিন্তু ব্রাইওনিয়া প্রায় রোগেরই প্রারম্ভাবহার (বথন উপদাহকর কাস থাকে) ব্যবহার্য্য। খাস কাসে সিলিশিয়ার

সহিত তুলনীয় পিলি এই রোগের প্রায় অমোঘ ঔষধ); প্রথমই রোগে থুজা ও মার্কের সহিত ইহার তুলনা হয়; নেট্রাম-সলফের প্রাব্রেদনাবিহান এবং উহার বর্ণ পীতাজ-সবুজ থাকে; রস-প্রধান ধাড়র (হাইডোজিনয়েড) রোগীর গভীরমূল মাযক দোষ দূরীকরণে থুজার পর প্রায়ই ইহা ব্যবহার্য্য; পুনঃ পুনঃ প্রভূত মূত্রত্যাগে কিরম-ফ্স ও এসিড-ক্সের পর প্রায়ই ইহা ব্যবহার্য হুলনা করিয়া দেখা সঙ্গত।

191

Silicea

ইহা কোরাটস (ফ্টিক) বা বালুকা-প্রস্তরের একটা উপাদান বিশেষ।
কিলিশিয়া মানবদেহ নির্মাণে কি কার্য্য করে তাহা অন্তাপিও সুস্পান্তরূপে
জানা যায় নাই; স্কতরাং বাইওকেমিক গ্রন্থকারগণ নানবদেহে ইহার সাধারণ
ক্রিয়া ও তহৎপন্ন কভিপন্ন লক্ষণের উল্লেখ করিয়াই স্থানিত রহিয়াছেন।
মানবদেহে চুল, নথ, ত্বক, অস্থি-বেষ্ট, সায়ুর আবরণ-ঝিল্লী এবং অস্থিতে
সাধারণতঃ ইহার বিশ্বমানতা লক্ষিত হয়। শরীরস্থ অঞ্জলাল এবং সৌত্রিক
প্রদর্শের উপর (ফাইব্রিণ) ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে।

আময়িক প্রয়োগ।

শরীর হইতে পুষ বাহির করিতে ও অতিরিক্ত পুষপ্রাব হ্রাস করিতে ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা। ক্ষোটক, ত্রণ, কার্কাঙ্গল প্রভৃতি চর্ম্মরোগে চর্ম বিদীর্ণ করিয়া পুষ বাহির করিতে ইহা ছুরিকার কার্য্য করে, এজন্ম হোমিওপ্যাথেরা ইহার lancet of Homoeopathy আখ্যা দিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণুগুলি হন্ম কোণ বিশিষ্ট। এজন্ত থকের নিমে সঞ্চিত হইয়া ত্বককে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয়।

ব্রণ ও ক্ষোটকাদির প্রাদাহিক অবস্থায় যখন জর ও অত্যন্ত বেদনা থাকে,তথন ফিরম-ফদ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার করিলে প্রদাহ হ্রাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথমাবস্থা (প্রাদাহিক অবস্থা বা inflamatory stage) উত্তীর্ণ হইবার পর অর্থাৎ বেদনাদি কমিবার পর যদি প্রদাহিত স্থানের স্থীততা না কমে এবং পূজ জন্মে নাই এরূপ মনে হয়, তবে ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ক্যালীমিউর ব্যবহার করিলে প্রায়ই পুযোৎপত্তি নিবারিত হইয়া বিক্বত সঞ্চিত রস পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহাতেও যদি ক্ষীততা হ্রাস প্রাপ্ত না হয় ও পুব জন্মিবে এরূপ অনুমান হয়, তবে সিলিশিয়াই একমাত্র অবলম্বনীয়। এই অবস্থায় সিলিশিয়া ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র পুযোৎপত্তি হইয়া ফোটকাদি বিদার্ণ চইরা থাকে। ইহা শরীরস্ত বিক্বত রসকে পুষরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া শরীর ২ইতে বাহির করিয়া দেয়। যে পর্যান্ত ক্ষোটকাদির চতুদ্দিকের কঠিনতা দূর না হয়, সে পর্যান্ত ইছা ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু এইবাপ কঠিনতা দুর হইয়াও যদি পৃথস্রাব হ্লাস প্রাপ্ত না হয় ও স্ফোটকাদি আর্নোগ্য না হয়, তবে ইহার পরিরর্ত্তে ক্যাকেরিয়া-সলফ (৩×বা ৬×) ব্যবহাৰ করিলে শীঘ্র পুযস্রাব হ্রাস হইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

গভার স্থানের ক্ষোটকাদির পৃষ্ঞাবে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অঞ্চনী, পুরাতন ঔপদংশিক কঠিন ফ্ষীততা, হার্ড-স্থাঙ্কারের পরবর্ত্তী বাগী (যাহাতে সহজে পুষ জন্মে না), কার্মকল, রাত্রিকালে ও পৃণিমার সময় উপস্থিত হয় বা বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হয় এরপ জ্বর বা মৃচ্ছারোগ, ঋতুকালে কোষ্ঠবৃদ্ধ, শ্রীরেশ

শীতলতা, তুর্গন্ধি পাদ-ঘর্ম এবং হস্তাঙ্গুলীর গ্রন্থির বাতজন্ম শীততায় ইহা অতিশ্য সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহাদের হস্ত ও পদতলে সর্বদা ঘর্ম উৎপন্ন হয় কিয়া উক্ত ঘর্ম রুদ্ধ হট্যা কোন পীড়া জন্ম তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ষক্ষাদি পীড়ান বাত্রিবালীন ঘর্ম দূর করিতে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। যে সকল শিশুর মন্তক-পৃষ্ঠ হইতে প্রভূত ঘর্মপ্রাব হটয়া বালিশ পর্যান্ত ভিজিয়া যায়, তাহাদের রোগে ইহা সবিশেষ উপযোগী।

যে সকল রোগীর রোগলক্ষণ রাত্রিকালে, পূর্ণিমার সময় ও খোলা বাতাদে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উত্তাপে উপশমিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। সমীকবনের অসদ্বাব জনিত কপোষণে ইহা অতীব ফলপ্রদ। পূর্ম্রাব সংশ্লিষ্ট সর্ব্বপ্রকার রোগে, গভীর মূল প্রাফিউলা-দোষ-চেষ্ট ব্যক্তিগণের রোগে এবং থারাপ বীজে টিকা দেওম'ব ফলে উৎপন্ন উপসর্গসমূহে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। মলদ্বারের প্যারালিসিস্; হৃৎপিত্তের বিবৃদ্ধি এবং অধিক দিন রোগ লোগ জনিত চক্ষণতার ইহার বিশেষ আবশুক। চক্ষ্র হানি এবং ঝাপ্রমা দৃষ্টিতেও ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

আন।—জীবনে বিভ্ঞা; শারীরিক ছর্কালতা, কিন্তু মানসিক শক্তির প্রথরতা, চিন্তা ও মনঃসংযোগে অসমর্থতা। দৃঢ় সঙ্কল। উৎকণ্ঠাসহ গোলমালে অভিশর জেষ। মন্তিক্ষের ছবলতা। বিভালয়েব বালিকা-দিগের আবৃত্তিকালে সমস্য বিষয়ে বিশ্বতি. এজন্ম কিচুই বলিতে না পারা।

আস্থান নাম ক্রিয়ের ক্রির আর আকার বিশিষ্ট গুটিকার প্রকাশ ও

ভৎকালে শিরংপীড়া। মন্তক-ছকে অভিশন্ন স্পর্শবেষ; মন্তকত্বকে পীতবর্ণ পুযদ্রাবী ও বেদনাকর পচ্যমান পীড়কা। কেশের পত্তন (কালী-সন্)। শিক্ষদিগের শিরো ঘর্ষ (ক্যাল্কফন)। সর্কাদা মন্তক স্মার্ভ রাধার আবশ্যকতা। মন্তকপৃষ্ঠ হইতে শিরংপীছার উৎপত্তি, তথা হইতে উহা ক্রমশঃ মন্তকশিথর পর্যান্ত ছড়াইয়া পড়েও মন্তকের দক্ষিণভাগ পর্যান্ত বায়। আলো, শন্দ, অধ্যয়ন ও পরিশ্রমে এই বেদনা বাড়েও উম্ফতার উপশমিত হয়। সেরিব্রাল এপোপ্লেক্সি প্রকাশের পূর্ব্বে মন্তকের দক্ষিণ পার্মে গভীরস্থান পর্যান্ত চিড়িকমারা বেদনা। শিশুর বৃহৎ অসংবেণ্ডিভ

ভিক্র ।— মঞ্জনী (আভ্যস্তরিক ও বাহ্যিক); অতিশন্ন বেদনা ও
শনীততা থাকিলে ফির-ফস সহ পর্যান্নক্রমে। অশুস্তানী গ্রন্থির পীড়ার
ইহা একটা অতিশন্ন মূল্যবান ঔষধ। চক্ষুর নালী ক্ষত। তুর প্রদাচ
সহকাবে গাড় পীতবর্গ পৃথস্তাব। চক্ষুর পাতার ফোড়া ও বার্তির
(টিউমার)। চক্ষ্র পাতার প্রদাহ (blepharitis); কিরেটাইটিন্।
পায়ের ঘর্ম বা উদ্ভেদ (গুটকাদি চম্মরোগ) বিজ্ঞাপের ফলে ছানি।
চক্ষুর ও উহার পাতার চতুদ্দিকে সিষ্টিক চিউমার; কণিয়ায় কৃদ শুদ গোলাকার ক্ষত; এই ক্ষত থাইয়া নীচ পর্যান্ত প্রদারিত হইয়া পড়ে।
ছানি বোগে ক্যান্ত-ফোরের সহিত পর্যান্তক্রমে বাবহার করিলে ক্রফ্রস দর্শে। পাদ ঘ্রা বিলোপের ফলে দৃষ্টিশাক্তর ফ্রীণতায় (এামুপ্রণিয়া)
ইহা বিশেষ কলপ্রদ। বসন্ত গোগের পরবর্তী কর্ণিয়ার দাগ ও অম্বছ্নতার সফলতার সহিত ব্যবহৃত ইয়া থাকে। চক্ষুর সায়ুশুল, বিশেষত দক্ষিণ ২ইতেছে একপ মনে হয়। চকুর-গহ্বরের অস্থির বিনাশ (কেরিজ)। চকুর সায়ু-শৃগ।

কর্না—বাহা কর্ণের প্রাদাহিক ফীততা। কর্ণ-নল এবং উম্পেনিক কেভিটির ফীততা ও প্রতিশ্রার জনিত শ্রুতিক্ষীণতা। সময় সময় কট্ করিয়া উচ্চশক হইয়া কান খুলিয়া য়য়। কর্ণের চতুর্দিকে কুদ্র ফুদ্র ফোটক। কর্ণের প্রদাহ ও উহা হইতে গাঢ় পীতবর্ণ পূষ্ প্রাব। কান পাকা। এই উষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন পিচকারী দেওয়া বিধেয়। কর্ণে নানারূপ শক্ষ শ্রুত হয়। ম্যাইয়েড অন্থির ক্ষত সহ কানপাকা। স্নানের পর কর্ণ প্রদাহ।

নাসিকা—মন্তকের প্রতিশায় সহকারে প্রবল হাঁচি এবং পরে গাড় তুর্গন্ধি শ্রেয়া নিঃসংল। পচা তুর্গন্ধি প্রাব সংযুক্ত পৃতিনশু। নাসাগথের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডুয়নকর পীড়কাসহ নাস। ক্ষত। নাসিকার
ক্ষিত্র ক্ষাক ও উহা হইকে তুর্গন্ধি প্রাব নিঃসংল (কালী-ফ্রন)।
নাসাপথের শুদ্ধতা, উহাতে ক্ষত ও শহুবৎ চিপিটকা। নাসাগ্রভ গেব
আরক্তহা ও চর্দমা কণ্ডুয়ন। ওঠ এবং নাসারক্ষের চতুর্দিকে দক্র।
উপদংশ দোবের ফলে নাসান্থির ক্ষত। নাসাভাস্করে হর্দমনীয় বিদাধী
প্রবশীল ক্ষত।

সুথসাজ্জন।—মুখমগুলের সায়-শূল। গাঢ় পূ্যপ্রাব; বৃক।
মুখমগুলের যে কোন প্রকার উদ্ভেদ হইতে এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট
ভাব নিঃদরণ। হত্বর (Jaw-bone) অস্থির ক্ষত ও বিনাশ। ব্য়োত্রণ;
মুখমগুলের অকের বিদারণ। ওঠের অকীদ। মুখমগুলের পাজুর ও মৃহণ্।

সুখ্ সঞ্য ।—সুথের গ্রন্থিত পুষ দঞ্চর ও উহা হইতে এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট আব ক্ষরণ। সুথমধ্যের পচাক্ষত, ঐ ক্ষত ক্রমশঃ প্রসারিত ছওয়ার তালু ছিদ্র হইষা যাওয়া। কোঠকাঠিক সহ পুরাতন ফ্যারিঞ্জাই-টিস। মুখের কোণের ক্ষত।

স্কেটক। যংগামান্ত প্রচাপনে মাড়িতে বেদনায়ক্ত এবং উদ্ভাপ বা শীতশতার অনুস্পন্য প্রাপ্ত দক্ষশ্ল। প্রচুর ঘর্মফাব জন্ত পদের হঠাৎ শীতলতা বশতঃ দম্ভ-শূল। মাড়ীর ক্ষত জন্ত দঙ্গুল। দম্ভোৱেদ কট্ট। মাড়ির ক্ষেটক। যংগামান্ত প্রচাপনে মাড়িতে বেদনা; শিথিল দম্ভ।

জ্বিহা — জিহ্বার কঠিনতা। জিহ্বার ক্ষত। জিহ্বার যেন চুল রহিয়াছে এরূপ অন্নতব।

সলেম্বা।—গণকত ও উহা হইতে এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রাব নিঃসরণ। উলিলাইটিস (পূয সঞ্চিত হইবার পর)। ইহাতে বিশেষ উপকার না হইলে ক্যান্ত-সলফ দিবে। গণগও (ব্যাগ); পুনঃপুনঃ প্রতাবর্ত্তনশীল কুইঞ্জি (quinsy) অর্থাৎ তালুমূল বা বলাব প্রদাই। Paralysis of velum pendulum palati.

তামিশিহা।—সনোদার, হৃৎপ্রদেশে জালাও শীতলভাত্তব সংযুক্ত পুরাতন অগ্নিমান্য (স্থাট-ফ্ন, ক্যান্ত ফ্রন)। সক্তপান কবিবামাত্রই শিশুব ব্যন এই ব্যন অস্ত্র নহে (ফির-ফ্ন ক্যান্ত-ফ্ন)। বুক জালাও অন্নোদ্যার সংযুক্ত পুরাতন অগ্নিমান্য। উল্লেখ্য দ্বোও মাংলে অক্রি; অত্যস্ত ক্রুধা; উদ্বে বায়ু নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। অর্শে অত্যন্ত বেদনা। ক্রমি জনিত উদ্ব বেদনা। মল্বাবের বিদারণ। শিশুদের বৃহৎ উদ্বঃ Induration of the pylorus.

তিদের এবং অবে।—যক্তের ফোটক ও কঠিনতা। শিশু দিগের উদরের বৃহত্তা এবং অতিশয় হর্গনি মল্লাব সংযুক্ত শিরোহার। গাঢ় পীতবর্ণ পদার্থ প্রাবী অতিশয় বেদনাকর অর্শ। উপরোক্ত প্রাব সহকারে মলহারের নালী-যা (ভগন্দর) মণ্ছ'রের পারোলিশ্ব জন্ম কোষ্ঠবদ ; মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে যায় (shy stool)। টিকা লইবার পর শিশুর অভিশুম ছুর্গান্ধ মল্যুক্ত ভ তিসার। কুমি জন্ম উদর বেদনা।

নু বি নাম — ব্ ককে পূ্য সঞ্চয়, শ্লেমা এবং পূযযুক্ত মূত্র।
প্রেইটীক গ্রন্থির প্রদাহ। মুত্রে লোহিত বালুকণার ভার অধঃক্ষেপ।
মূত্রে ইউরিক এসিড। কোরিয়া অথবা ক্রমি জনিত অবারিত মূত্র।
পূরাতন উপদংশ সহ মূত্রে পূ্যের বিশ্বমানতা। পূরাতন প্রমেহ, তংসহ
গাঢ়, পূ্যের ভার হুর্গন্ধি আব।

পুথজনে ক্রিছা ।—বিধানের (টিয়) কটিনতা ও পৃথসঞ্চর বিশিষ্ট পুরাতন উপদংশ। প্রাষ্টেটিস (পুষ সঞ্চরের পর)। কুরও হোটড়ে সিলা। গাড় পীতবর্ণ আবে বিশিষ্ট পুরাতন প্রমেহ! অতের স্থিতিশয় কণ্ডায়ন ও উহাতে অতিশয় হর্মা। কাম-ভাবের প্রাবলা বনতঃ স্কাদা কামচিন্থা ও তৎসহ রাত্তে নিজিতাবভায় গুক্ত আব। ধ্রজভঙ্গ। রাতক্রিয়ার পর অত্যন্ত ক্রম্বলতামূভব।

ক্রীজনে নিজের বরফের ন্তায় শীতলতা। এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রাণ্ড পর্বাঙ্গের বরফের ন্তায় শীতলতা। এই ঔষধের প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রাণ্ড শেতপ্রদর। শীতল জলে দাড়াইয়া থাকার দরণ অতিরক্তঃ। নিগেটের ম্ফোটক ও উহা নালী ঘায়ে পরিণ্ড হটবার সন্মাবনা। বাহ্য-শ্রী-অঙ্গের কণ্ডুরন ও আলা। শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যারত স্বর্ম ঝতু; কদাচিৎ প্রভূত ঝতু। প্রভূত আলাকর খেতথদর। ঝতুদরের অন্তর্মের রক্তের ক্রায় প্রাব; যোনিতে কোমল কর্ম serous cysts) বন্ধাত্ব। ভগাধরে ক্রোটক, উহা নালীঘায়ে পরিণ্ড হটবার আলামা। কামভারের অত্যন্ধ আধিকা, কামোয়াদ)।

প্রতি ।—গুন-প্রদাহ। গুনের ফীততা, কাঠিত ও অভ্যন্ত বেদনা।
বিস্কৃতি পুরস্রাবের হ্রাস জন্মাইবার নিমিন্ত প্রাক্ত, বহার কাণী-মিউর
ও তৎসহ এই ঔষধ ব্যবহার্যা; গাঢ় পীতবর্ণ প্রস্রাব স্থানের নালীকত;
গুনের গ্রন্থির কঠিনতা ও উহাতে পূয জন্মিবাব আশহা। স্থানর বোঁটায়
ক্ষত বা উহার বিদারণ। গর্জাবস্থার শাঁটিতে কটা।

প্রাত্য-ইন্ত্র—প্রভূত, গাচ্ পীত বা সবুজাত গরিদ্রাবর্ণ প্রেমা ও জর সংযুক্ত শাস যাত্রের রোগ; অভিশয় তর্বলতা ও নৈশ বর্ম (কার্য-ক্ষম তাট-ামউর); উল্লেখিত লক্ষণ বিশিষ্ট শ্লেমাপ্রাবী গম কাম; কুসফুসের প্রণশোপ (পৃষ্প্রাবের সহায়তা ও বা শুকাইবার নি'মত); নিউনোনিয়ার পৃষস্করাবস্থায়; ব্রকাইটিস ইত্যাদি; প্রভূত, হর্মিরের্য তরল প্রেমা; দুকে ঘড় ঘড়ি; পুরাত্রন ব্রমাইটিস ও যকা গ্রহত্ম; শীর্ণ শিশুদের কাসি ও তৎসহ নৈশবর্ম। স্বর্ম্ম কণ্ডুমিত তইয়া কাসের উদ্রেক। মনে হয় কিহ্বায় একটা চুল আছে; শীত্রল পানীয়ে ও শর্মন কাসের বৃদ্ধি; পুরার্ন্য স্বাচ্ছিনত ক্র্মাতা ও বৃক্রের অভ্যন্তরে গভীরত্বন প্রদেশ বেদনা। যক্ষাজ্বনিত কুসক্সের অভ্যন্তরে ক্ষেট্রক। গলক্ষত ও কাস তৎসহ কুল কুল কুল কুলি নিষ্ঠাবন পরিত্যক্ত হয়।

রক্ত স্থতন্দ হক্তা—প্রবল স্কানের পর জংশিংগর দ্পদ্পানি। পুরাতন ছদ্রোগ।

পুষ্ঠ এবং অক্প্রত্যক্ত — উপেক্ষিত কত বা কাটা কতে পৃষ জন্মিবার সম্ভাবনা। হস্ত-পদের পভার কত কটতে গাঢ় পীতবৰ্ণ প্রাব নিংসরশা উক্ত-সন্ধির রোগে পৃষ্প্রাব নিবারশার্থ। আঙ্গুলাভাড়ার (৩দ ক্রম) সর্বাশ্রেষ্ঠ ঔষব। কার্কহল। নালী ঘা সংযুক্ত অন্থি-ক্ষত; নালী-ঘা হইতে আন্থিব টুকড়া নিংস্ক হইলে কাল্ল-ফ্রোব সহিত পর্যায়ক্রমে ইহা প্রয়োগ করিবে; মেক্দণ্ডের বক্রতা, রেকাই-

টিস্ ও মেরুদণ্ডের উপদাহ (spinal irritation); বোড়ায় টড়িকে
কোকিলচফু আহতে বেদনা; মেরুদণ্ডের উপর কার্বজ্ঞল: সোয়াস্
এবসেস্; স্পাইনা বাইফিডা; পটস্ ডিজিঞ্চ। ঘারে মাংসায়ুরের
উৎপত্তি; পরাতন সন্ধি-প্রদাহ; বেদনা, বিশেষতঃ জঙ্ঘান্তির; এই
বেদনা চাপদিলে বাড়ে না; কুলি; গুর্গজ্ঞি পাদ-ঘর্মা; এই ঘর্মা
বিলোপের ফলে অপর কঠিন রোগের উৎপত্তি; গুর্গান্ধ কক্ষমর্মা;
নথের স্থুলম্ব ও ভুলুরভা; মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্তির ফলে উৎপত্ত সাম্বরীয় বোপ; লিথিবার কালে হন্তের অধিকক্ষণস্থায়ী আক্ষেশ (Tonic spasm); হস্ত এবং বাস্তর গুরুম্ব ও পক্ষাঘাতিতবৎ
অমুভব; ক্ষম এবং বাস্তর বেদনা রাজিতে আবৃত করিয়া রাশিলে
উপশত্তি হয়; হস্ত ও পদের পক্ষাঘাতের ক্সার গুরুম্ব ও অবশতা; (বিচরণকালে) হাঁটু ভালিয়া পড়ে; দীর্ঘ রান্তা চলিনার সময় পদ এবং প্রাপ্তলীর অধিকক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ; পৃষ্ঠে ঠাণ্ডা বাতাস
লাগিবার ফলে উৎপন্ন রেগা।

স্থাত্ব সংগ্রহণ '- প্রদিমা স্নায়ুশুলের রাতিতে উপস্থিতি। এই বেদনা উত্তাপ বা ঠাণ্ডা কিছুতেই কমে না। রাত্রিতে বা যৎসামান্ত উত্তেজনায় মুগী এবং আক্রানের (স্পাক্তিম) উপস্থিতি; solar plexus হইটে সরস্থানি আরম্ভ হয়। রোগের অভিশয় প্রদিমনীয়তা (ম্যাগ-ফ্স, ক্যাল্ড ফ্রন, কালী-মিউর)। শ্রীরের নানা স্থানে বেদনা। মেরুদণ্ডেব উপদেশ্য ও স্পর্শ-ছেষ। প্রদিমা ভিষ্টিরিয়া ও স্নায়ুশূল। রোগাক্রাক্ত স্থানের শীত্রতা ও ঠাণ্ডায় অস্থাতা। প্রদিশতার জন্ম সর্বদা ওইয়া থাণিবাব প্রার্তি। হস্ত-পদের কম্পন সংযুক্ত পেশীর অবশতা।

স্থানের বা যন্ত্রের অস্বাভাবিক উত্তেজনা। মলবারাদির ম্থরোধক-পেশীর আক্ষেপিক অবরোধ (spasmodic closure of the sphincters).

ক্রক :—তকের যে কোনও প্রকার প্রদাহ বা ক্ষতে পীতবর্ণ প্রাব লক্ষণে ইহা বাবহার্যা। তকের ক্ষত বিলম্বে শুকার ও সহজে উহাতে পূযোৎপর হয়। শরীবের যে কোন স্থানেই ফোটক জন্মিবার সন্থাবনা, বিশেষতঃ বসন্তকালে। কার্বান্ধল, ফোটক, ক্ষত, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি, কুষ্ঠ। একজিমা। শিশুদের শিরোদজ হইতে তুর্গন্ধি প্রাব নিঃসরণ। ব্যোত্রপ। অত্যন্ত বেদনা পূর্ণ কুদ্র কুন্ধুড়ে।

সন্ধির বার্সার (bursa) বিবর্জন। বসস্ত রোগে পুযোৎপত্তিকালে। গ্রন্থির (gland) ক্ষীততা। টিকার বীজের দোষে উৎপন্ন চর্ম্মরোগ (পুজাও ব্যবস্থাত হইরা থাকে। কুঠে পুযোৎপত্তি হইলে এবং স্থানে স্থানে ফুলিয়া শক্ত হইরা উঠিলে; অকের ভাত্রের স্থার বর্ণ জন্মিলে এবং নাসারন্ধে, ক্ষত উৎপন্ন হইলে। শরীরে কোথাও শন্যাদি বিদ্ধ হইলে (কাঁটা ইত্যাদি) এই ঔষধ সেবনে ভাহা বাহির হইরা থাকে।

ক্রের।—যন্ত্রা রোগে অতিশয় তুর্বলতা এবং নৈশবর্ম সংযুক্ত জব।

শিশুদিগের মস্তকে ঘর্ম। পদতলে অতিশয় জালা সংযুক্ত বিলেপী জর।
পদবরে তুর্দম্য ঘর্ম সংযুক্ত জব। সারাদিন ও নড়িলে চড়িলে শীত শীত অমুভব। শানীরিক উদ্ধাপের অভাব। সায়াক্তে তাপের বৃদ্ধি ও পার জালা। পৃযুস্থয় বা পৃষ্ঠাবকালীন নৈশ-ঘর্ম।

ব্দ্ধিন বৃদ্ধি নির ষশ্মার রাতিকালে নির হীনতা। নিরাকালে হস্ত-পদের উৎক্ষেপণ, জ্রুত নাড়ী ও উচ্চগাতোত্তাপ সহ হৃৎপিত্তের দশ দ্পানি। ঘুমের মধ্য কথা বলা। কু-স্থা দর্শন। মন্তকে রক্তসঞ্য ভক্ত অনিদ্রা।

বিলোপ বা পদের শীতগভার রৃদ্ধি। শিহঃপীডার মাথার কাপড় কডাইয়া বানিলে সেই উফ্লাঃ শিহঃপীডার শান্তি করে। উদর বেদনা, কাদি, ও বাতের বেদনা উফ্লাঃ উপশ্মিত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডালাগিলে রোগীর বাবতীয় লক্ষণেরই বৃদ্ধি এই শুষধের বিশেষ লক্ষণ।

রাত্রিতে এবং পূর্ণিমার প্রাক্তালে রোগ লক্ষণের রুদ্ধি; উত্তাপে উষ্ণগৃহে এবং গ্রীম্মকালে এই ঔষধের লক্ষণ সমূহের উপশম বা তিরোভাব।

ত্রেন্দান স্পলার এই ওবধের ৬ × ও ১২ × ক্রম ব্যবহারের বিধি বেন। কিন্তু ৩০ × ও ২০ ারার অতি আশ্রহী ফল পাওয়া গিয়ছে। হোমিওপ্যাথি মতে এই ঔষধের ৩০, ২০০, ১০০০ এবং সি, এম (লক্ষ্ণ) শক্তি দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ লইয়া থাকে। কার্মান্তল, ক্ষত্র, ক্ষেত্র উলর বাহ্য প্রয়োগও ইয়া থাকে। এই সব স্থলে নিয়ক্রনের বিচুণ্ ক্ষতের উপর ছ ছাইয়া দিতে হয়। প্রাক্তিলা জনিত গ্রন্থির স্ফীতভার (পুষোৎপত্তি না হইয়া থাকিলে) ভারিক নাক্রার ওপ্রঃ পুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রান্ধিত হয়া থাকে। কিন্তু পুযোৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু পুযোৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু পুযোৎপত্তি হইয়া থাকিল বা উভার সম্ভাবনায় ক্রিংশক্রম (৩০) দিনে একবার অথবা ১ দিন পর ১ দিন ১ বার করিয়া ব্যবহার্য্য। জনতি তরুণ রোগো প্রত্যাহ প্রাত্তে ও বৈকালে জ্থবা ২।০ ঘণ্টাস্তর্মন্ত প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

অব্দ্র হা। —পুযোৎপত্তি হইয়া থাকিলৈ ক্যাল্ব-সলফের সহিত ইহার শ্রহেদ বিচার ইয়া থাকে। সিলিশিয়া পূষ্মাব বন্ধিত করে। এজপ্ত ফোটকাদি পাকাইবার বা ফাটাবার জ্ঞা ইহা ব্যবস্ত হইয়া থাকে। का। (कविश-मनक शृश्याव क्षाम करत) এজ श्र (क्षा है का कि मौर्ख ना कि कहिएन ঐ পুষ হ্রাস কবিবার নিমিত্ত ইছা ব্যবস্থের হইনা থাকে। নালী কতে সিলিশিয়া ব্যবহারে (২০০ বা তদুর্দ্ধ ক্রমবায়া) আশালুরূপ ফল না পাইলে, তৎপর, বিশেষতঃ সরু ছিজের ক্সায় মুখ্যারা পূয় নিঃস্ত হুইলে ক্যান্ত-স্কু ৩× বা ৬× বাবহা করিবে। ইহাতে ক্ষত শীল্প শীল্প শুকাইয়া নৃতন ম'ংসাকুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ বীজ দ্বারা টীকা দেওয়ার কুফলে সিলি ও থুজাম্বারা আশাসুরূপ ফল না পাইলে কালী-মিউর ব্যবহার্যাঃ নির:পীড়ায় স্পাইজিলিয়া, পেরিস, পিজিক এসিড, ক্কিউলাস, জেলস ও সাঙ্গুটনেরিয়ার সহিত সিলির তুলনা হয়। নেত্রনালী রোগে নেট্রাফ্ মিউর ও পেট্রালিয়মের সহিত। আঙ্গুল হাড়া ও কুণী রোগে সিলি বিফল হইলে ইহার পর অনেক সময় গ্রাফাইটাস ছারা উৎফুই ফল দর্শে। অস্থির ক্ষতে (caries) এবং অস্থিবেইপ্রদাহে (পেরিম্টাইটিস্) এসাফিটিডা, প্রাফ, কোনায়াম এবং প্লাটনা-মিউরের সহিত তুলনীয়। ক্ষর বা শীর্ণতা (tabes) রোগে এলুমিনা, ও রুটার সহিত তুলনা করুন। ষে সকল তরুণ রোগে পলসেটিলায় উপকার ইয়, সেই সকল রোগ পুরাতন হুইলে পিলিতে উপকার দর্শে (Silicea is a chronic Pulsatilla) বালুমর ভূমিতেই পলসেটিল। উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্ভবভঃ পলসেটিলার ভিতর সিলিশিয়া আছে। অন্থির রোগে ইহার লক্ষণ অনেকটা মারকিউ বিয়াসের স্থায়। কিন্তু মার্কের পর ইছা কথনও ব্যবস্থা করিবেনা।

কেননা, ভাহাতে রোগারোগো বাঘাত ঘটে (রোগ অত্যম্ভ জটিশ ছট্যা পড়ে)।

ইকুইনিউমের ভিতর দিলি আছে। সম্ভবতঃ এই জন্মই মূত্র রোগে ইকুইনিউমে ফলদর্শে। কতিপর ঝরণার জলে দিলিশিরা পাওয়া ষায়। মূত্রযন্ত্রের বোগে ঐ সকল জল বাৰস্থের ও উপকারী হইয়া থাকে। পুব সম্বতঃ উহার ভিতরকার দিলিশিয়ার দর্রণই এই স্ফল দশিয়া প্রাকে। নথের চতুর্দিকের ক্ষতে সোরিপম অমৃল্য ঔষধ।

ক্লোরিক-এনিড, পি'ক্রক এনিড, হাইপারিকম, রুটা ও মার্ক ইহাব লমগুণ ঔষধ।

বিভীব্র অপ্যাব্য । চিকিৎসা-প্রকরণ। Abscess—এবসেস—ক্ষেটিক

ক্রান্তনা ।—কোন কারণ বশংঃ রক্ত ও রক্তস্থ সিংমে (রক্তের হলবং পাতলা অংশ; মস্ত) স্থাবদ্ধার যে পরিমাণ ইন্-অরগ্যানিক সণ্ট থাকে, তাহার নুনাতা ঘটিলে উক্ত রক্ত বা সিরঃমন্তিত অরগ্যানিক পদার্থ সমূহ (যাহার সহিত এই ইন-অরগ্যানিক সণ্টের রাসানিক সম্বর্ধ আছে) স্বীর পোষণ ও নির্মাণের পক্ষে অকাহ্যকরী হইয়া উঠে এবং শরীর হইতে বাছির হইতে চেষ্টা করে। এই অকার্যাকরী দৃষিত পদার্থ শরীরের অভান্তরে কোনস্থানে সঞ্চিত হইলে উহাকে ক্টোটক কহে। তরুণ ও পুরাহন ভেদে ক্টোটক তুই প্রকার।

ক্রেক্রকা।—তরুণ ফোটকের প্রারন্তে বোগাক্রাম্ব ম্থানে ব্যথা ও উত্তপ্রতা জান্যারা পরে ফ্রাততা জন্ম। ফোটক উৎকট আকারের হইলে উহার সহিত অল্লাধিক জরও বিশ্বমান থাকিতে পারে। এই প্রাদাহিক অবস্থা ল্লাস প্রাপ্ত হইবার পর পূর্যজনক (সংপ্রেটিভ প্রেজ) অবস্থা আরন্ত হয়। পূরোৎপত্তি হইতে স্কুক হইতেই বেদনা নূর্ব্বাপেক্ষা ল্লাস প্রাপ্ত হর ও পূয় সঞ্চন্তের পরিচয় স্কুর্মণ ফ্রাততা বুদ্ধি পাইতে থাকে। এই অবস্থার ভীব্র বেদনার পরিবর্ত্তে এক প্রকার মৃত্র দেশ্লাকের প্রারন্থায় তরুণ প্রাত্তন ফ্রোটকে পার্থকা এই বে, পুরাত্তন ফ্রোটকের প্রারন্থায় তরুণ ফ্রোটকের ক্রায় প্রাদাহিক অবস্থা (বেদনাদি) বিভ্যমান থাকে না। ত্চনার কিছুই বুঝা যায় না। এরপ খোটকে প্র করি নার পর কথন কথন কলা দিয়া জ্বি, অথনা পুর জানিত হে ক্রিক দিভাব এই লাগতে। পুরাতন খোটক সাধারণতঃ শরীরের কোন ধর, যথা—মান্তক, যকুৎ ইত্যাদি অথবা কোনও পেশী, যথা ইলিয়ক বা সোন্তাস পেশী অবলধন করিরা উৎপন্ন ইইরা থাকে।

(চিকিৎসা)

ফিল্ল-ফ্রান্স ১২ ।— দ্যোটক, কার্ককল প্রভৃতির প্রারম্ভ যা প্রারম্ভিক অবস্থার জ্বর এবং বেদনার উপশ্যার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। রোগ প্রবৃদ্ধিত না হইতেই কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে পূ্যেংপেতির সন্তাবনা থাকেন, দ্যাধারণতঃ এই উংধের ১২ % ব্যবহার্যা। রক্তলাবে নিয়ক্রম (৩×) অধিকতর ফ্লপ্রদ।

কালী-মিউর ০× ।—ক্টোট্কাদির দিতীয় অবস্থার ধ্বন বৈদনা থাকেনা, কেবল মাত্রশ্বীততা অবশিষ্ট থাকে, তথ্য ইহা প্রপ্রযোজ্য। ০× ক্রম আত্যন্তবিক এবং ০× ক্রমের বিচুর্ণ কিঞ্চিৎ জনের সহিত্রিশাইয়া উহাতে নেকড়া খণ্ড ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগণ্ড বিশেষ ফলপ্রদ। স্তন-ক্টোটকে অভিশন্ন ক্ষীততা থাকিলে প পূম সঞ্চিত না ইইয়া থাকিলে ইহা প্রবাবস্থেয়।

সিলিশিকা ৩০ × :—কালী-মিউর ব্যবহারের পর যদি পূর্
ভারিতে থাকে, তবে ইহা ব্যবহার করিলে শীঘ্র শীঘ্র শ্যোটক পাকিরা
উঠেও আপনা আপনি ফাটিরা যার। শ্যোটকাদি ফাটিরা যাইবার
পরেও ইহা আভ্যম্করিক ও বাহ্যিক প্রেষোভ্য। শ্যোটক ফাটাইবার
উদ্দেশ্যে ঔষর সেবনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধের লোশনে নেকড়া থও
ভিজাইরা শ্যোটকের উপর দিয়া রাখিবে। ফাটিয়া গেলে ইহার িচুর্ব
ক্ষতের উপর ছড়াইরা দিতে হম।

ক্রাক্র-সলক্ষত সান্ধ্রি লালাবা বার্ছাবের পর ক্ষত ক্রাইড়ে বিলম্ব হইলে ও তথ্ন ও আন ক্রিড ছইছে থাকিছে ইয়া ব্রেল্গায়। সি'লশিয়া পুযোপের করে কাল্ক সদক প্রস্রাব হাস করে; উভ্যের মধ্যে ইয়াই প্রভেদ। আঙ্গুলহাড়া, স্তন-স্ফোটক প্রভৃতিতে ইয়ার প্রয়োজন। সক দিল্ল পিয়া প্র নির্দিত চইতে থাকিলে ইয়া প্রয়োজন। মললাবের নিক্টবত্তা বেদনাজনক ক্ষোটকে ইয়া অভিশয় উপরে গী হিপার-স্বা অপেক্ষা ইযার;ক্রেয়া অধিকভর গঞ্জীব মুলা।

বাহা বিদ্যালয় ৬ স — ক্ষত অস্থি আক্রমন করিলে বা হাড়ে লাগ লাগিলে। কঠিন-প্রাপ্ত বিশিষ্ট ঘা; অস্থির নাশ্র। কোনও অহি আক্রাপ্ত হইয়া তলপেটে খেনাইক জনিলে ইহা অনুলা গ্রেষ্

স্থাতি-জ্নতন ০ × ।— দ র্ঘকাশখারী নালীক্ষত, রিশেষতঃ নিরাক্ষের।
নীলাভ-মালন প্রান্ত বিশিষ্ট ক্ষত হুইতে অলবৎ পূজ্যার। পুরাতন নালী
ক্ষতে মূথ শুকাইরা শেশে ৩ × কুম ব্যবহার্য। ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র
রোগ আরোগ্য হইরা থাকে।

কালী-ফাস ৩ x ৬ x ।—অতিশয় চর্গন্ধি প্রাব বিশিষ্ট কত। ক্ষত চইতে গাল, নজাক্ত পূথ নিঃসরন। কার্ককল ও আঙ্গুল হাড়ায়, বিশেষতঃ প্রাবে অত্যন্ত চর্গন্ধ থাকিলে ইহা ৰাম্বহার্যা।

ক্রাক্তব্য।—লক্ষণ দৃষ্টে প্রয়োজ্য ঔষধ আভ্যম্ভরিক দেবনের সঙ্গে গরম জল বা ভেলিলিনের সাইত মিশাইরা স্থানিক প্রয়োগও কর্ত্বয়। গর্ম জলের সহিত ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ। ক্যেটিক পাকিবার মত হইরা উঠিলে এবখানি নেকড়া গরমজলে ভিজাইরা উহাতে সিলিশিরা চুর্ণ ছড়াইরা স্থানিক প্রয়োগ করিলে শীল্ল শীল্ল ফাটীরা যায়। ক্ষত বারে ৩× ক্রমের সিলিশিরা হিচুর্ণ ছড়াইয়া দিলে শীল্ল শীল্ল ঘা শুকাইরা থাকে।

চিকিৎসিত রোগী।

- (১) ১৬ বংসর বয়য়া ড়লৈক য়োগিণীর বাম কর্ণের মধাভাগে ভয়য়র বেদনা ও প্রদাহের লক্ষণ বিশ্বমান দেখা যায়। ক্যাছ-সংফ পূ্যোৎপত্তির প্রতিষেধক ঔষণ অর্থাৎ পূ্যোৎপত্তির পূর্বের ইহা ব্যবহার করিলে আর পূষ্ উৎপন্ন হইতে পারেনা ইহা স্মরণ করিয়া ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিবার ভয়্য এই ঔষধের ৩× ক্রমের ২ পুরিয়া মাত্র (১ দিনের জয়) দেওয়া হয়। বিতীয় দিন জানা যায়, রোগিণিত সকল উপদ্রবেরই শান্তি ইইয়াছে। ইহার পর তাহার আর কোন লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই ও আর ঔষধও সেবন করিতে হয় নাই। (এথানে স্মরণ রাথা কর্ত্বিয় হে ক্যাল্ব-সলফ অতিরিক্ত পূয্ন্তাব হ্রাস করিবারও প্রধান ঔষধ)।
- (২) জনৈক যুবক ১ বৎসর ধরিয়া সায়েটিকা (গ্রামী, কটিবাত) রোগে ভূগিতেছিল। এজন্ত এলোপ্যাথিকমতে মধ্যে মধ্যে মর্ফিয়া ইপ্লেকসন করা হইত। ফলে, রোগাক্রান্ত স্থানে ১টা ফোটকের উৎপত্তি হয়।ইহা হইতে প্রচুর পৃথস্রাব হইত ও সহজে ঘা ওজ হয় নাই। অবনেষে যখন ঘা ওজ হইবার মত ব্রাণ গেল ও রোগী ক্রমশঃ ভাল বোধ করিতে লাগিল, তথন তাহার সন্ধিলাণা। এখন ফোটক হইতে প্রবাপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণ লাব নিংস্ত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রোগীর মাতা অত্যন্ত চিষ্কিতা হইয়া পড়িলেন, যেহেতু রোগা এই সময় বড়ই হর্কাল হইয়া পড়িয়াছিল ও তাহার কিছু মাত্র কুধা হইতনা। তাহার ভাল বুম হইতনা ও প্রতিনিয়ত গিপাসা ছিল। এই রোগীকে প্রত্যাহ প্রাতে খালি পেটে ১ মাত্রা করিয়া গিলিনিয়া দেওয়া হয়। ১ সপ্তাহ পর দেখা গেল প্যস্থাব এত হাল হইয়াছে যে একেবারে নাই বলিলেও অত্যক্তি হয় না। পিপাসা একেবারে নিবারিত ও কুধার পুনঃ উত্রেক্ হইয়াছে। এখন রীতিমত স্থনিজা হয় ও ভাহার যে

কম্পনশীল শীত শীত বোধ হইড, তাহাও একেবারে বিদুরীত হইয়াছে। এ কেত্রে সিণিষিয়ায় পৃষ্পাব হ্রাস করিবার ক্ষমতা বিল্ফাণ প্রমাণিত হইয়াছে

- (৩) ১৬ বংশর বয়য়া জনৈক রম্ণী কয়েকমাস ধরিয়া দক্ষিণ পায়ের রোগে ভূগিভেছিলেন। যে সকল চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিতে ছিলেন, তাঁহারা প্রকাশ করেন যে পা-থানি একেবারে কাটিয়া ফেলিজে হইবে। পায়ের শ্টীততা অত্যম্ভ বিভিত্ত হইয়াছিল, প্রাবেরও অত্যম্ভ আধিকা ছিল, হাঁটুর নিকট পা-খানি বক্র হইয়া সমকোণের (right angle) আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহা একটু মাত্রও সিধা কবিতে পারা যাইতনা । এলোপ্যাথিক মতে যে সকল আভ্যম্ভরিক ও বাহ্য উষধ প্রদান করা হইত তাহা বন্ধ করিয়া দিনে ১ মাত্রা করিয়া সিলিশিয়া ৩০ প্রেরাণ করা হইত তাহা বন্ধ করিয়া দিনে ১ মাত্রা করিয়া সিলিশিয়া ৩০ প্রয়োণ করা হয়। ৩ মাস পর রোগিলী সম্পূর্ণ স্বস্থ হইয়া কোন প্রকার আশ্রেয় ব্যতীত হাঁটিতে হাঁটিতে চিকিৎসকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন।
- (৪) জনৈক রোগীয় কর্ণ হইতে পৃষ্ঞাব হইত। অনেক দিন যাবৎ ইহার নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। রোগীর কণে দিন রাভ বেদনা ছিল। সিলিশিয়া ৩০ × সেবনে সে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করে।
- (৫) একজন পোষাক নিশ্বাভার হাতে আঙ্গুলহাড়া (Irelon) হর।
 ফিরম-ফল ১২× ক্রম ৩ ঘণ্টা অন্তর জলের সহিত মিশাইটা থাইতে
 দেওরা যায়; ইহাতে রোগীর বিষ বেদনার অতি সম্বর উপশম জন্ম;
 রোগী দৃঢ়তার সহিত বার বায় এই ঔরধ সেবন করিতে থাকেন; ইহাতে
 ত দিন পর পুনরায় ঐ রোগের প্রত্যাবৃত্তি ঘটে ও রোগলক্ষণ সকল
 প্রবলতরক্ষণে দেখা দেয়; এইক্ষণ বেদনা অত্যধিকক্ষণে বর্দ্ধিত ও কঠিন
 ক্ষীততা পরিলক্ষিত হয়; হহা দেখিয়া কাণী-মিউর ১২× দেওরার হারী
 ও ক্রত আরোগ্য জন্ম।

- (৬) একবাক্তির ঠাণ্ডালাগার ফলে উপরের কর্ত্রনন্তের পশ্চ দুর্গর একটা ফোটকের উৎপত্তি হয়। ফির-ফ্রস ১২ × ব্যবস্থা করা যার।
 ইহাতে বেদনার অনেকটা উপশ্রম জন্মে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বুঝাগেল ফোড়াটা নিশ্চয়ই পাকিবে। ফীততা ও বেদনা পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাড়ির ফোটকের (gum boil) ক্য জ্ব-সলফ ০× স্কোত্রেই ঔষধ ইহা মনে পড়ার দিনে ৩।৪ বার করিয়া (৫ গ্রেণ ম আর)
 এই ঔষধ দেওয়া হয়। অনতিবিল্পেই ইহার উৎক্রই ফল প্রতাক্ষ হয়।
 ক্রেক মাঝা ঔষধ বাবহারের প্রই ফীততা ও বেদনা ক্রিয়া
 ফোটকটা বিলীন কইয়া যায়।
- (৭) জনৈক মদণীর হাঁটুর নিম্নভাগ ফুলিয়া যায়। জনৈক ডাক্তার করেক মাদ পর্যান্ত পোলিট্র ব্যবহার করিয়া পরে অন্ত করেন। কিছ অস্ত্রকরার পর কোনপ্রকার আব নির্গত হর না। রোগিণী ইংটিতে অসমর্থ ছিলেন। ইহার পর রোগাক্রান্ত স্থান আই ওডিন ছারা পেইণ্ট করা যায়। ইহাতেও কোন ফুল না হওয়ায় উক্ত ফ্টিত স্থান কাষ্যা ব্যান্তেজ করিয়া উভার উপর দিনে ও বার করিয়া অনেকক্ষণ পর্যান্ত শীতল কলের ধারার বাবস্থা করা হয়। ব্যান্তেজ পুলিবার পর কোন দেন স্থান ব্যান্ত করি বাব্যা বাব্যা করা হয়। ব্যান্তেজ পুলিবার পর কোন দেন স্থান ব্যান্ত দৃষ্ট হয়। এখন এই রোগাক্রান্ত স্থান খুব শক্ত ও শীতল বোধ হয়। দেখিলে মনে হইত ধেন শীম্রই ফাটিয়া যাইবে।

এই শবস্থয়ে রোগাক্রাপ্ত স্থানে উষ্ণয়েক প্রদান ও কালী-মিউর ৩ × সৈবনের ও বাহ্য প্রয়োগের ও ব্যবস্থা করা হয়। ৩ সপ্তাহ কাল মধ্যেই রোগিণী সম্পূর্ণ অংরোগা লাভ করেন।

(৮) এক বালিকার দন্তের ক্ষত (ulcerated tooth) ও তৎসহ দন্তমূলে ক্ষ্যেটক উৎপন্ন হয়। বহু প্রকার হোমিওপ্যাথিক শুষধ প্রয়োগ করা সম্বেও বহুদিনেও ক্ষোটকটা আরোগ্য না হওয়ার বাইওকেমিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। ১২৫ ট্যাবলেট পূর্ণ ক্যান্ত সলফ ৩ × এর একটা শিশি (প্রায় ১২ দিনের উপযোগী ঔষধ ভাহাকে দেওয়া হয়। ঔষধ খাইতে মিষ্ট, এবং রোগীও বালিকা, স্ফুরাং তিন দিনেই সে উহা শেষ করিয়া কেলে। ফলে, এই তিন দিনের মধ্যেই ভাহাব রোগেরও শেষ হয়।

- (२) कटेनक ভज्रालारकत रखानूनीत श्रामार करता। छेरा कृतिया উঠে, পাকে ও অত্যন্ত বেদনা জন্মে। এজন্ত পোল্টিপ, মফি রা ইঞ্জেকশন ও অস্ত্রোপচার করা হয়। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায়, অসুণীর হাড়টা ভূলিয়া ফেলিবার জন্ত সহরে আনাহর। কিছুবে ডাক্তার হারা হাড় তুলিয়া ফেলিতে হইবে মনে করিয়া আদিয়াছিলেন, তিনি তথন সহরে না থাকায়. বাইওকেমিকমতে উহার কোন প্রতিকার হইতে পারে কিনা, জানিবার **উপদেশ** 奇列 যদিও রোগীর ভিতর চাহেন। দিককার পেশা গুলি (flexor muscles) সম্পূর্ণ রূপে খাইয়া নষ্ট হইখা গিয়াছিল, তথাপি তাখাকে বলা কর যে হাড় ফেলিতে হইবেনা। এই রোগীকে ইউকালিপ্টেশ্ স্নিক ইনঞ্জেক্সন করা হয় ও সিলিশিয়া ৩× প্রতি ৩ ঘণ্টাম্ভর আভাস্করিক সেবনের ব্যবস্থা দেওরা যায়। প্রতাহ ইউক্যাণিপ্টঃস্ দারাখা পরিষ্কার করিয়া বান্ধা হইত। চারি मशार वा मम्पूर्व एका देशा यात्र । मह्याहनी (भनी खाँग भूर्व्य दे नहे बहेश য ওয়ায় রোগী হাত মুষ্টিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না বটে. কিছ এই ঔষধের আরোগ্যকর শক্তি দেখিরা সকলেই চমৎকুত হইরা ছিলেন।
- (>•) ঢাকার জনৈক প্রফেসারের পুংজননেন্দ্রিরের এক পার্শে একটা ক্ষুদ্র ক্ষীততা জন্মে, কিন্তু তথার কোনরূপ বেদনা ছিলনা। বেদনা না জন্মিয়া ক্ষীততা ক্রমেই কিছু বর্ষিত হইতে থাকে। বাপার

কি, তাহা জানিবার জন্ম ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত ও লকপ্রতিন্তি সার্ক্ষন ডাঃ জে, এন মিত্রকে ডাকা হয়। তিনি ভালরপ পরীক্ষা করিরা দেখিরা ইহা কোল্ড এ.সেস্ (cold abscess) বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং বলেন, সত্তর অল্রোপচার করিয়া ছা ভকাইরা কেলা করিবা। কেননা, এবসেদ্টা যদি এইভাবে ক্রমেই বাড়িতে থাকে, ও শেবে মৃত্র-নলী (urethra) পর্যান্ত প্রস্কারিত হয়, তবে মৃত্রের সংস্পর্শে আসার ফলে এই ছা ভকান এক কঠিছ ব্যাপার হইবে। তাই তিনি অতিসত্তর করে করাইবার জন্ত উপদেশ দেন। কিন্তু অল্ল করিলে ছা ভকাইতে কিছু বিলম্ম হইবে, এই আশক্ষার সহরের জনৈক লক্ষণেতিন্ত লোমিওপ্যাথকে ডাকান। তিনি প্রায় ৩ সপ্রাহ কাল ঔবধ দিতে থাকেন; কিছু কোনও ফলই হয় নাই। অগত্যা ডাঃ মিত্রকে পুনরার আঃ ান করা হয়, তিনি আসিয়া অল্রোপ্রার্থ (Operation) করেন। এই ছা ভকাইতে ৩ মাদ লাগে।

ইহার ঠিক এক বংগর পর, ঐ ভদ্রলোকের পুরুষান্ধের ঠিক অপর দিকে, পূর্ববারের স্থায় বেদনাহীন স্ফীততা জ্বো। ইহা দেখিয়া উক্ত ভদ্রলোক জনৈক উকীর বন্ধ্র পরামর্শে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাকালের ফোনীস্তন হাউস্ সার্জ্জন লকপ্রতিষ্ঠ ডাঃ এন, সি বেস্কে আহ্বান করেন। তিনি রেশার পূর্বে বৃত্তাস্ত প্রবণ করিয়া, আগামীকলাই অপারেশন্ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিছু রোগীর পূর্ববারের অভিজ্ঞতা হইতে (তিনি যে ০ মাদ কাল শ্যাশারী ছিলেন) তিনি ডাঃ বস্তুকে বলেন,—"আমি ২৷০ দিন হোমিওপ্যাথি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি কি ? যদি আপনার মত হয়, তবে এখনই একজন হোমিওপ্যাথ ডাকি। যদি ২৷০ দিনে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোন ফল না হয়, তবে জগত্যা অপারেশন করাইতেই হইবে।" এই বলিয়া গ্রন্থকারকে আহ্বান

ফরিবার জন্ম তৎক্ষণাৎ একজন লোক পাঠাইয়া দেন। গ্রন্থ চার তথার উপস্থিত হইলে, ডাঃ বস্থ গ্রন্থ বার্তিক বলিলেন,— "আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; আমার মনে হয় ২।১ দ্রুপ পূব জিলায়াছে।" এই বলৈয়া ডাঃ বস্থ গ্রন্থকারকে বলিলেন,—আপন দের এমন ঔষণ আছে কি, যাহাতে পত্র এই পুয শুকাইরা যাইতে পারে ?" ইহা শুনিয়া গ্রন্থকার বলিলেন — 'হাঁ।''। তথন ডাঃ বন্ধ গ্রন্থকারকে রোগাক্রান্ত স্থানটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অমুরোধ করিয়া বলিলেন,—আমি আপনাকে ২৪ ঘন্টা সময় দিলুম, কাল ঠিক এই সময় উভয়ে আসিয়া দেখিব। যদি দেখি এই পুৰ কমিয়াছে, তবে ভালই; আর যদি দেখি পুষ না বাড়িয়া ঠিক একই ভাবে আছে, তবে আপনাকে আরও ২৪ ঘণ্ট। সময় দিব। কিন্তু আগামীকাল আসিয়া যদি দেখি, পূষ ব্রত্যা গিয়াছে, ভবে আগামীকল্যই অপারেশন করিব এবং এজন্ত আমি প্রস্তুত হছরাই আসিব।" ড.: বমুর কথার পর, রোগী (প্রফেশার ভত্তলোক) গ্রন্থকারকে সংখ্যান করিয়া ব্লিলেন,—"নুপেন্ বাবু! যদি আপনি আনাকে আরোগ্য কবিষা দিতে পারেন, ও অপারেশন করিতে না হয়, তবে আমি আপনাকে ১০০২ টাকা পুরস্কার স্থরপ দিব।" যাহা হউক, রোগীর যাবতীয় লক্ষণ পর্য্যবেকণ করিয়া মার্ক-দল ২০০ এক ডোজ তথনই (প্রাতে) খাইতে দেওয়া হয় এবং রাত্রিকার জন্ত ক্যাল্ব-সল্ফ ৩×, ৪টা ট্যাবলেট দিয়া আসা হয়। পর দিন প্রাতে ডা: বস্থ (ডা: নৃপেন্ বোস) আদিবার কালে গ্রন্থকারকে তাঁহার গাড়ীতেই লইয়া আদেন। উভরে রোগীর সমূথে আসিয়া বসিলে পর ডা: বায় প্রফোরার বাবুকে জিজামা করিলেন,—"কেমন আছেন 🕶 তিনি উত্তর করিলেন,—'আপনারা দেখিয়া বলুন।' তথন ডাঃ বস্থ বোগাক্রান্ত স্থান অনেককণ যাবৎ প্রীক্ষা করিতে ও মুহ মৃহ হাঁসিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রোগীর জনৈক উকীল বন্ধ যিনি নিকটেই উপবিষ্ট

ছিলেন, তিনি ড': বহুকে সংখাধন করিয়া বলিলেন,—''কি, ডাক্তার্ব বাবৃ! হাঁস:ছন্ কেন ।" ডাক্তার বহু উত্তর করিলেন —"হাঁা, হাঁস্বার কারণ হরেছে; পৃথ বা ফীততার কোন চিক্তই আমি পাছি না।" এই বলিয়া তিনি গ্রন্থকারকে দেখিবার হল্য অহুরোধ জানাইলেন। গ্রন্থকার পরীক্ষা করিয়া ফীততার কোন চিক্তই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ডা: বহু তথন ও হুকারকে বলিলেন,—আগ্রামীকলা ট্রিক এই সময়ে উভরে আদিয়া আবার দেখিয়া যাইব। গ্রন্থকার ও সম্মতি জানাইলেন। আর উষধ দেওয়া হইবে কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে, গ্রন্থকার বলিলেন— আর উষধের আহেশ্রকতা নাই।" পর দিন উভরে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে ফীততার কোন চিক্তই নাই। তথন সকলে শক্তমুখে হোমিওপাাথি এবং বাইওকেমিক ঔষধেয় আশ্রেণিন। অল্লোপচার করিলে আবার হাও মাস শ্রামানী হইয়া থাকিতে হইবে, ইহাই ছিল রোগীয় একাছ্ ভরের কারণ।

Addision's Disease.

(এডিসনস্ ডিজিজ) (চিকিৎসা)

নেট্রাম মিউর ৩০ 1— এই রোগের প্রধান ঔষধ। ভুক্তরেরা সমীকরণে ব্যাঘাত (when nutrition is greatly impaired), রুক্ক-প্রদেশে উত্তরতা ও আবর্ষণরৎ বেদনা এবং মূহৎ মুথাকৃতি; ইজের পশ্চান্তাবে কপিশ বর্ণের ভিক্ত (Brown spots on the back of hands); অত্যন্ত মানসিক অবসাদ সহ শারীরিক হর্মনতা; পদের কম্পান, ঝাপ্রা বা অপরিচ্ছর দৃষ্টি, কুধার অভাব, বিবামষ্ট ও বমন, মাংসে বিভ্ষণা বা অক্লচি, কোঠকাঠিঞ্জ; নড়িতে চাড়তে বা কাজকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি; ঘন ঘন হাই তোলা ও আড়া মোড়া ভালা (stretching); হন্ত পদের শীতলতা; মানসিক অবসাদ সহ ক্রোধ প্রবণতা এবং প্রাতে শ্যা হইতে উঠিবার কালে বা হাঁটবার চেইট করিলে শিরোঘূর্ণন; এই সকল শক্ষণে এই ঔষধ সকলতার সহিত্য শ্যাবহৃত হইয়া থাকে।

Amenorrhoea—এমেনোরিয়া।

(Suppession of the Menses)

(নফরকে—প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব, রজলোপ, রজরোধ)

এদেশীয় বালিকাদের সাধারণতঃ ১০ বংসর বয়সে প্রথম ঋতু প্রকাশ

পায় ও ৪০ বংসর পর্যান্ত থাকে; কাহারও কাহারও ফৌবনকাল উপস্থিত

হইলেও ঋতু প্রকাশ পার না। স্নায়্মূলের তর্কলভাবশতঃ ডিঘাশয়ের (ওভেরি)

অমুভেজনা ইহার মুখ্য কারণ। শারীরিক ত্র্কলভা বা প্রাচীন রোগ, যথা

ফলা ইত্যাদি ইহার গৌণ কারণ; আক্মিক কোনও ঘটনা, যথা হঠাৎ

মনন্তাপাদি প্রাপ্ত হওয়া, ঠাণ্ডালাগা, পা ভিজিয়া শীতল হওয়া, আহারাদিব

জনিয়ম প্রভৃতি কারণেও অভ্যন্ত ঋতুপ্রাব বয় হইয়া থাকে; অনেক সময়

অপৃষ্টিকর আহার্য্যাদি গ্রহণ জন্তও আত্তে আত্তে ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং গর্ভ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম জন্মে; এরপাবস্থায়, কারণ দূর করিলে ক্রমশৃঃ স্থাস্থ্যের উৎকর্য জন্মিয়া ঋতু পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ক্যান্ত-ফাস ৬× ।— রক্ত হীনা যুবতী দিগের রাজোদর্শনে বিশন্ধ হইলে; অপুষ্টিকর আহার্য্য গ্রহণ জন্ত রজরোধ; ক্রমশঃ প্রাবের স্বর্গ হাটিয়াং শেষে একেবারে বন্ধ হওয়া। পাত্ত্বর্ণ মুথ্মগুল।

কালৌ-ফাসা ৩×।— হর্কলতা, নিকৎসাহিতা, এবং ক্লান্তি সহকারে শতুন্ত বা মাসিক শতুস্রাবে বিলম্ব; কোন প্রকার মনস্তাপ প্রাপ্তি জক্ত রজলোপ; বাসি সরিষা বাটার লেপের ন্তান্ত লিহ্বা; খতু-বিলোলার ফলে বক্ষং লক্ষণের প্রকাশ; সর্বহা মাথার ভার বোধ। সহজেই ক্রোধের উদ্রেক; আত্মসংযমে অপারগতা।

কালী-নিউর ৩× ।—রস প্রধান ধাড়; খেত লেপারত জিহ্বা; গ্রন্থিল যন্ত্রাদির ক্রিয়া ক্ষীণতা; সদিলাগা বা পা ভিজিবার ফলে রজলোপ; বক্তের ক্রিয়াক্ষীণতা।

কালী-সলফ ৬×।—সম বা বিলুপ্ত রজঃ, তংসহ উদরের পূর্ণতা ও গুরুত্ব।

নেট্রাম-মিউর ৩০ × ।— ঋতুর অপ্রকাশ অথবা স্বল্ল ও বহু বিলম্বে বিলম্বে প্রকাশ।

কলের সহিত ম্যাগ-ফল ৬× ৪।৫ গ্রেণ মাতার ১৫।২০ মিনিট পর পর সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শে; মাথাধরা থাকিলে তৎসহ ফিরম-ফল এবং কালী-ফলও ব্যবহার্য্য। স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকার রোগেই মালিক ঋতুপ্রাবের কথা চিকিৎসকের অবগত হওয়া একান্ত আবগ্রক।

চিকিৎসিত রোগী

- (>) २० वर्णत वयः अधिनक त्रमीत तुकः रिवयमा हिल। (कान उ শাসে রক্তঃ আব একেবারেই হইতনা, আবার কোনও মাসে নিয়মিত সময়ের দীর্ঘ কাল পর পর অতি অল পরিমাণ আব হইত। রোগিণীর গৌর বর্ণ. সাম্বিক প্রকৃতি, মমেরন্তায় বর্ণবিশিষ্ট গাত্রথক, থিট্ থিটে স্বভাব, সহজেই ক্লান্তি অহতব, মাথাধরা, দিবাভাগে নিদ্রালৃতা, নিমাঙ্গে (পদে) অল অল শোথের ভাব, খাস-প্রখাসে কষ্ট, সায়বিক অস্থিরতা, সময়ে সময়ে তাহাকে ধরিয়া রাথিবার প্রয়োজনীয়তা, নিরুৎসাহ. লোকালয়ে থাকিতে অনিচ্ছা (বিশেষতঃ পুরুষের নিকট থাকিতে) প্রভৃতি লক্ষণ বিভ্যমান ছিল। পরীক্ষায় রজলোপ ও তাওব (কোরিয়া) বলিয়া রোগ নির্দ্ধারিত হয়। আরও জানা যায় বে ১৮ বৎসর বয়ক্রম প্যান্ত রোগিণীর আদে রজহাব হয় নাই ; এই সময় হইতে যে আব হইত তাহাও অতিশয় অল্ল অল্ল হইত। এই প্রকার প্রথম রজ্জাবের ২ বংগর পূর্বে মাঝে মাঝে হিষ্টিরিয়ার আনেশ হইত। এই সব লক্ষণ দৃষ্টে রোগিণীকে প্রত্যহ প্রাংশে ও রাত্রিতে এক এক মাত্রা ক্যাল্ল-ফল ৬× এবং ক্যালী ফল ৩× দেওয়া হয়। সপ্তাহ কাল ঔষধ প্রয়োগের পর রোগিণীর যাবতীয় উপসর্গের উপশম লক্ষিত হয়। এইকণ হইতে তাহার আব নিয়মিত সময়ে ও উপযুক্ত পরিমাণে হটতে থাকে 1
- (২) ২০ বংসর বয়য়া জনৈক বিধবা রমণীর ১৫ মাসের একটা শিশু
 সন্তান ছিল। শিশুটীর ১০ মাস বয়স পর্যান্ত মাতার ঝতু প্রাব স্বাভাবিকই
 ছিল। শিশুর ১৪ মাস বয়ঃক্রম কালে ন্তন্ত রয় ছাড়ান হয়। এই সময়
 ছইতেই ঝতু একেবারে বন্ধ ছয়। ক্যালী সলফ ৩×ট্যাবলেট্ ২৭টা
 অন্তর ছইদিন মাত্র ব্যবহার করায় ঝতু প্রত্যাবৃত্ত হয় ও পূর্বের ঝতুকালে
 যে বিষম বেদনা জন্মিত তাহাও সম্পূর্ণক্রপে নিবারিত হয়।

- (৩) ১৯ বৎসর বয়স্বা স্থলকায়া পূর্ণরক্তা জনৈকা যুবতীর রজলোপ হয়। কালী-সলফ ৩×প্রতি ২ ঘণ্টাস্তর ব্যবহার করায় ৩ দিবসের মধ্যেই ঋতু প্রত্যাগত হয়। (এই রোগিণী পূর্বেবছ প্রকারের ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই ফল পাইয়াছিল না)।
- (৪) ১৮।১৯ বংশর বয়স্বা জনৈক যুবতীর মৃত্ত্বর ও বক্ষোলকণ প্রকাশিত হয়। কাসির সঙ্গে সময় সময় রক্তও পড়িত। নৈশ ঘর্ম এবং ক্রমবর্দ্ধমান শরীরক্ষয় (শীর্ণতা) বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ঢাকার অভিজ্ঞ এলোপ্যাথেরা রোগিণীর ক্ষম্ব রোগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং তদমুঘানী চিকিৎসাও চলে। চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায়, সহরের অভিজ্ঞ কবিরাজগণও ক্ষয় রোগ পিদ্ধান্ত করিয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায়. শেষে কলিকাতা নিয়া তথাকার সর্বাইট ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের হস্তে চিকিৎসায় ভার অর্পণ করা হয়। রোগিণীর মল, মূত্র, রক্ত ও নিষ্ঠাবন (Sputum) পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু নিশ্চিতরপে রোগ সাব্যস্ত হয় না। রোগিণীর যাবতীয় লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া টিউবারকিউলোসিস বা ক্ষয়রোগ মনে করিয়াই চিকিৎসকগণ এই রোগিণীর চিকিৎসা করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ ফল দর্শে না। অতঃপর কলিকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজের হল্কে চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু উহাতেও কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই। রোগিণীর গাতোপ ৯৮ই হইতে ৯৯।১০০ ডিগ্রী পর্যান্ত একই ভাবে চলিতে থাকে এবং শরীরের শীর্ণতাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হুইতেই থাকে। অবশেষে কলিকাতার চিকিৎসকগণ কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গমনের প্রামর্শ দেন। তদ্মুষায়ী প্রায় ১৮ মাস কাল একথানি পিঞ্চিস নৌকায় ঢাকার লক্ষ্যা নদীতে রাথা হয়। ইহাতেও কোনরূপ উপকার লক্ষিত না হওয়ায় পুনরায় ঢাকা সহরে স্বীর বাসায় রোগিণীকে আনা হয় এবং গ্রন্থকারকে

চিকিৎসার আহ্বান করা হয়। রোগিণীর कना এহণকালে প্রকাশ পায় যে, প্রথম রঞ্জাদর্শনের পর ৬ মাস কাল পণ্যন্ত রজঃআব বন্ধ থাকে। তৎপর একবার মাত্র রজঃআব হইরাছিল, তাহাও পরিমাণে ষৎসামান্ত। তৎপর এপর্যান্ত রোগিণীর আর রজঃস্রাবই হয় নাই। এই কথা শুনিয়া Suppression of menses অর্থাৎ রজঃরাধই রোগিণীর মুখ্য রোগ বলিয়া ধারণা জন্মে এবং তদহ্যাস্থী রোগিণীর সর্বাপীন লক্ষণ দু ষ্ট পলসেটিলা ২০০ এক মাক্রা মাত্র দেওয়া হয় এবং রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ম বাইওকে মিক পাঁচটা ফক্টে प्यशं फ्रियम-क्षम >२×, काली-क्षम ७×, कार्कितिशं-क्षम >२, म्रांशक क्षम ৬× এবং নেট্রাম-ফদ ৩× প্রত্যেকের ৪ ট্যাবলেট করিয়া মোট ২• है। विषय क्षेत्र क्षेत्र के के विषय क्षेत्र क्षेत् করা হয়। পর দিন প্রাতে বে?ক আসিয়া খবর জ্বায় যে অগ্ন প্রাতে গাতোতাপ ১৭° ডিগ্রীতে নামিয়াছে। ৫1৬ বংসর পর এই প্রথম গাতোত্তাপ এত নিমে নামিয়াছে; ইত:পূর্ব্বে তাপ ঐ একভাবেই ছিল। অতঃপর, ৭ দিন পর পুনরায় আর এক মাত্রা মাত্র প্লস্টেলা ২০০ দেওয়া হয় এবং বাইওকেমিক ঔষধগুলি পুর্কের ব্যবস্থা মত দিনে ২ বার করিয়া চলিতে থাকে। ইহাতেই এক মাস মধ্যে রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকে এবং ১ মাস প্র স্বাভাবিকের ভার ঋতু আব হয়। ইহার পর আরও ২ মাস কাল পুর্বোক্ত ৫টা বাইওকেমিক ঔষধ চলিতে থাকে; ফলে রোগিণীর সর্বপ্রকার রোগ-লক্ষণ বিদ্রিত হয় এঞ্ তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করেন।

(৫) ৩৫ বংসর বয়স্কা আর এক রমণীর মৃত্ জ্বর, নৈশঘর্ম ও শরীরের ক্রমবর্জমান ক্লশতা দৃষ্টে এলোপ্যাথগণ ক্ষয় রোগ সিদ্ধান্ত করিয়া ২।০ বংসর কাল পর্যান্ত বহু রক্ষের চিকিৎসা করেন। পরে

১৭০ বাইওকেমিক চিকিৎসা-প্রদর্শিক।।

কবিরাজী চিকিৎসায়ও কোন ফল হয় নাই। এই রোগিণীকে কলিকাতায় নিয়া এলোপ্যাথি ও কবিরাজী মতে ও চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার দশে নাই। তৎপর রোগিণীকে ঢাকায় আনিয়া গ্রন্থকারের হন্তে চিকিৎসায় ভার অর্পণ করা হয়। রজঃ বিলোপ রোগের মূল কারণ সিদ্ধান্ত করিয়া পূর্কোক্ত টৌ ফফেট দিনে ২ বার করিয়া দেওয়ায় (পূর্কোক্ত মাত্রায়) রোগিণী সম্পূর্ণরূপে জারোগ্য লাভ করেন।

Anæmia—এনিমিয়া।

রক্তহীনতা।

রক্তের পরিমাণের হল্পতা বা উপাদানের অপক্ষণ্ডাকে (যণা রক্তের লোহিত কণার হল্পতা ও খেত কণার আধিক্য) এনিমিয়া বা রক্তাল্পতা বলে। ক্যাল্ক-ফ্স এবং নেট্রাম-ফ্স রক্তের প্রধান উপাদান। ডাঃ স্থালার পুর্বেষ মনে করিতেন যে রক্তের লোহিত কণা নির্মাণ করিতে ফিরম-ফ্স বিশেষ উপযোগী। কিন্তু পরিশেষে তিনি জানিতে পারেন যে রক্তের লোহিত কণার অভাব, ক্যান্তেরিয়া-ফ্সের অভাব জনিত গৌণলক্ষণ মাত্র। রক্তহীনতার আরও বহু কারণ আছে। যথা অপুষ্টিকর আহার্য্য গ্রহণ, মানসিক ছুর্ব্রেলতা, ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণতা, অনেকক্ষণ স্কুল-কলেজে পাকা, প্রভূত শুভুসাব এবং শ্রীর হইতে অধিক পরিমাণ রক্ত্বপাত ইত্যাদি।

(চিকিৎসা)

ক্রাব-ক্রান ১২ × ।— মুথমণ্ডলের পাঞ্রভা, এবং মোমেরস্থার বা মুঘর্ণ; অসম্যক পরিপোষণ জনিত রক্তহীনতা; রক্তে খেতকণার প্রাচ্যার্য (লিউকিমিয়া), ক্রয় বা দৌর্বল্যকর রোগের পর; এই ঔষধ সেবনে রক্তের অর্কোষ (সেল) প্রবৃদ্ধিত হয়; ক্লোরোসিস্ রোগের ইহাই একমাত্র প্রধান ঔষধ; পার্ণিসাস্ এনিমিয়া; উঠিবার কালে মাথা ঘুরা, চক্ষে ঘোর দেখা, নাসিকা হইতে রক্তপাত, নাসাগ্রের শীতলতা, বিস্বাদ, খেত জিহ্বা, মুখমগুলে শীতল ঘর্ম, শ্রীরের শীতলতা; বিব্যমিষা ও বমন; পাকস্থলীতে শৃস্ততা অন্তত্ত্ব, পাতলা মলস্রাব, আহারের পরই মলবেগ, প্রস্রাবে স্তার স্থায় তলানি, প্রভৃত রক্তঃস্রাব, রক্তের উজ্জ্বদ লোহিতবর্ণ অথবা মলিনতা, হৃৎপিণ্ডের দৃপ্ দৃপানি, ত্র্বলতা বশতঃ শরীরের কম্পন, অবসম্বতা ও ক্লান্থি।

ফির-ফস ১২ × ।—ক্যান্ধ-ফস প্রয়োগের পর যদি য়ক্তে লোহিড কণা সমাকরণে পরিপুরিত না হয়।

শাতি-নিউ ৩০। মৃৎপাণ্ড গ্রন্থাদিগের জলবৎ পাতলা রক্ত লক্ষবে। ঘৌবনোলুথ বালিকাদিগের মৃৎপাণ্ড কহ পৃষ্ঠদেশে শীতারুভব; ইহাদের রজঃস্রাব না হইলে বা অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ব্যবহার্যা। জিহ্বার লক্ষণ দ্রষ্ঠিয়া এবং অভিশয় বিষয়তা; ম্যালেরিয়া; কুইনাইন সেবনের কৃফলে উৎপন্ন রক্তহীনতা বা ধাতুদোষ। ঘকের মন্নাচহনতা, কৃৎপিণ্ডের দপ্দপানি, ৰক্ষোবেদনা; প্রাতঃকালীন কাল, সহজেই ক্রান্তি অনুভব।

কালী-ফাল ৩ × ।—দীর্ঘকালস্থারী মানসিক শক্তির চালনা বশতঃ মনের অপ্রকৃত্মতা নিবন্ধন রক্তহীনতা; ক্ষয়কর রোগের পরবর্তী রক্তহীনতা। মফিক্ষের রক্তহীনতা; স্পাইস্থাল এনিমিয়া, লিউকিমিয়া। কালী-মিউর ৩× ।—রক্ত হানতার শহিত কোন প্রকার চর্ম বোগ (যথা, একজিমা প্রভৃতি) বিভ্যমান ধাকিলে প্রধান ঔবধের লহিত ইহা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা।

শ্যাতি-সালাহাত ৬×।—আর্দ্র খাতু বা বাস-গৃহের আদ্রতা জনিত জলবং পাতলা বক্ত লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য। 'মাসকধাতু ও রক্তে জলীয়াংশের আধিক্য" (লিলিয়েস্থল)। রলপ্রধান ধাতু (হাইড্রোজেনয়েড কনষ্টিন্টিউসন)।

স্থাতি হাস ৩ × 1—রক্ত হীনতা সহকারে অন্তীণতা, অমোদার ইত্যাদি। স্পাইম্বাল এনিমিয়া। সর্বাদীন চর্বলতা, হাঁটিতে অভিশয় ক্লান্তি অমুক্তব, বিশেষতঃ সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে। পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

সিলি শিক্ষা ৩০ স। — শিশুদিগের অসম্যক পরিণে খণ জনিত রক্তহীনতা। ঋতুর পরিবর্জে প্রদর্শ্রাধ। দৃষ্টশক্তির ক্ষণিক লোপ। কুদ্র, রিকেটস্ গ্রন্থ শিশুদের রক্তহীনতা।

(চিকিৎসিত রোগা)

(১) ১৯ ও ২১ বংসর বয়য়া ২ জন য়বতীর রক্ত ইনতায় পাত্র, রক্ত ইনম্থাকৃতি, অবসয়তা, উত্তমহীনতা ও প্রচণ্ড শিশ্পীড়া লক্ষণ বর্তমান ছিল। এই বেদনা সম্মুথকপাল হইতে মন্তক-পৃষ্ঠ পর্যায় সম্প্রদারিত হইত। ইহার মধ্যে ছোটটী প্রায় ৬।৭ বংসর যাবং এবং বড়টী কয়েকদিন যাবং ভূগিতে ছিল। ছোটটীর এই কাল পর্যায় হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক উভয় প্রকার চিকিৎসাই হইয়া আনিতেছিল। এলোপ্যাথেরা তাঁহার চিকিৎসায় পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়য়ণ (লোহ) প্রেরাগ করিয়াও কোন স্মুফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। উভয় রোগিণীকেই প্রথমে ক্যাক্ত কান স্মুফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। উভয় রোগিণীকেই

রপ্তাহ দেওয়া হয়। তৎপর আবার ক্যান্ত্র-ফ্স ১২ %, এইরূপে পর্যায়ক্রমে মাস কাল উভয় ঔষধ ব্যর্হার করায় এই রোগিণীই স্থায়ী আরোগ্য লাভ ক্রেন্।

- (২) ১৭ বৎসর বয়য়া জানৈক য়ুবতী মেয়ে দীর্ঘকাল বিস্থালয়ে মাধ্যয়ন করার ফলে এত বেশী নীয়জা ও পাভুর হইয়াছিলেন যে, তার জয় তিনি বিহালয়ে য়াওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হন। ওাহার একেবারেই কুধা হইত না, কেবল মরে শুইয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইত। কোপাও মাইতে বাকোন কায়কর্ম করিতের শরুত্তি হইত না। পড়িতে পড়িতে তাহার মাথা ধরিত, এজয় তিনি পড়া একেবারে কাস্ত করিতে বাধ্য হন। তাহার ঋতৃও ফতাস্ত অনিয়মিত ছিল। কয়েক মাল হয়তো একেবারেই হইত না, তৎপর য়ে আব হইত, তাহা হয়তো কোনও মালে কম বা কোনও মালে অত্যন্ত অনিক হইত। এই রোগিণীকে প্রথমতঃ ক্যান্ত-ফল ৬৯ দেওয়া হয়। তৎপর আবার সময় সময় ফিরম-ফল ১২ দেওয়া হয়ত। ইহাতে তাহার সম্বয়্ম উপসর্গ ব্রে হয় ও তিনি আবার মিয়মিত ক্রণে কুলে মাইতে থাকেন।
- (৩) অপর এক রোগিণীর আহার্য্যের সহিত অত্যধিক পরিমাণ ববণ ভক্ষণের ফলে রক্তহীনতা, চর্ব্বলতা, রুশতা, ঋতুর অনিয়মিততা ও কোর্চবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। নেট্রাম-মিউর ২০০ ব্যবহারে তাহার সকল উপসর্গ দূরীভূত হয়।
- (৪) ঢাকার তদানীস্তন ডেপুটী ম্যাজিট্রেট্ মি: বনমালী বাগিটি মুচাশরের স্ত্রী (স্থতং এর মহারাজার কল্পা) প্রায় ১১।১২ বংসর যাবং জরায়ুব রোগে ভূগিতে ছিলেন। মালদহ, কলিকাতা এবং ঢাকার অভিজ্ঞ এলোপ্যাথ ও কবিরাজগণ রোগিণীর চিকিৎসা করেন। গ্রন্থকারের উপর হখন এই রোগিণীর চিকিৎসার ভার অপিত হয়, ভথন

রোগিণীর প্রতিনিয়ত শোহিতাত জলবৎ আৰু হইতেছিল; রক্তসাব হইতৈ ছইতে রোগিণী এত তুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বালিশ হইতে মাথা তুলিবার বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি মাত্রও ছিলনা। রোগিণীর গৌরবর্ণ কেঁকাশে হইয়া গিয়াছিল। প্রতিমৃহূর্ত্তেই হাদ্যম্বের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিবার আশকা ছিল, এজন্ত প্রত্যেছ ইঞ্কেশন দেওয়া হুইত। শত চেষ্টাতেও এলোপ্যাথ এবং কবিরাজগণ এই রোগিণীর রক্ত প্রাব বন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। গ্রন্থকার আহত হওয়ার পর, রোগিণীকে ভালরপে দেখিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, বহুদিন যাবৎ রোগভোগ ও রক্তপ্রাব বশতঃ রোগীণীর টিশু সকল এরূপ এর্বল ও শিথিল ছইয়া পড়িয়াছে যে রোগিণার সাধারণ স্বাস্থ্যের (লৈহিক) উল্লভি না **इहेरण किছুতেই এই** রক্তপ্রাব বন্ধ করা যাইবেনা। মাংস-পেশীর শঙ্কোচন-শক্তি একেবারেট নাই, তাই রক্ত-রোধক শ্রেষ্ঠ ঔষধেও এতদিন রক্তপ্রাব বন্ধ হয় নাই। গ্রন্থরে বনমালী বাবকে পরিকায় ভাবে ব্দানাইয়া দেন যে, ৩.৪ সপ্তাহের পূর্বের রক্তপ্রাব বন্ধ হইবার কোনই লম্ভাবনা নাই, এবং গ্রন্থকার কোনও miracle দেখাইয়া এখনই রক্ত আৰ বন্ধ করিতে পারিবেন না। যদি তিনি (বনমালী বাবু) অনুমতি করেন, তবে গ্রন্থকার রোগিণীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষের জন্ত ইয়ধ ব্যবস্থা করিতে পারেন। যদি রোগিণীর আয়ু থাকে, তবে দৈহিক উন্নতির লঙ্গে সঙ্গে রক্তপ্রাবও কমিয়া আসিতে থাকিবে। বনমালী বার্ বলিলেন—'ব্রথানকার যাবতীয় অভিজ্ঞ এলোপ্যাথ এবং কবিরাজ कां हारक अवान वाकी ताथि नाहे; नक तारे अवाव मित्रा हिना है। গিয়াছেন —তাই জনৈক বন্ধুর পরামর্শে বাইওকেমিক সিষ্টেম মতে শেষ চেষ্ঠা করিয়া দেখিবার জন্ম আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আপনাকে ছাড়িয়া অতঃপর আর কাহাকে ডাকিব ? অতএব, মরে বাচে আপনার হাতেই হবে।' এই কথা শুনিরা রোগিণীর সাধারণ বাহ্যোরতির জন্ত ফিরম-ফস ১২ × কালক ফস ১২ × নেট্রাম-ফস ৩ × কালা-ফস ৩ × , এবং ম্যাগ-ফস ৩ × প্রত্যেকের ৪টী করিয়া একত্রে ২০ ট্যাবলেট দিনে ৩ বার এবং রক্তন্তাব বন্ধ করিবার জন্ত নেট্রাম-সলফ ৩ × প্রতি অন্ধ ঘণ্টান্তর ২ ট্যাবলেট গরম জলে গুলিয়া সেবন করিবার ব্যবস্থা করা যায়। ৭ ৮ দিন ঔষধ সেবন করিবার পর হইতে রোগিণার সাধারণ স্বাস্থের উন্নতি পরি লক্ষিত হইতে থাকে এবং চক্ষে এবং হাত পায়ের আসুলেও রক্তের লোহিত কণার বৃদ্ধি পরিষ্ফট হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে অকর পাংশুটে ভাবও দূর হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে সাধারণ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবিত রক্তের পরিমাণ ও ক্রমণঃ কমিতে থাকে। এইরূপে প্রায় ১ মালের মধ্যেই রক্তন্তাব একেবারে বন্ধ হইরা যায় এবং বোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেম।

Aneurism—এনিউরিজম।

ধনশ্বর্দ।

(সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)

কালা ।—ধননীর জাবরণে ক্যালকেরিয়ান্ ডিজেনারেশন হওয়ার ফলে ধননীর প্রাচীর (wall of artery) বিদীর্ণ হওয়ার দরুণ একটা থলির ভার অবস্থা জন্ম। ইহাস্টে ধনভার্বিদ কছে। লাধারণতঃ বৃহৎ ধননীতেই এইরূপ অবস্থা জ্যে। অর্কৃদ বৃদ্ হইলে ব্রস্থাই, ট্রেকিয়া, লেরিংস্ ও ফ্সফ্স প্রভৃতি অর্ব্রেদ দারা নিপীড়িত হয় এবং উহার ফলে খাসকট উপস্থিত হয় এবং খাসে মর্মর (murmur) শব্দের হ্রাশ হয়। ত্বকে জন্মিলে হস্ত দারা সামাত চাপদিলে উহা অমুভূত হয়।

(চিকিৎসা)

ক্রিব্রক্স ১২ × ।—হৎপিণ্ডের জত ক্রিয়ায় উৎপন্ন উপসর্গ সকল দ্রীভূত করিয়া উহার স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিষ্ঠার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্যান্ত-ফ্লোর সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

ক্যান্দ্রে ভ × ।—প্রধান তিহাল। প্রারম্ভাবস্থার ফিরফসসহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে রোগ আর বাড়িতে পারে না।
আইওডাইড অব পটাস্মায়া চিকিৎসিত হইয়া না থাকিলে ইহাতে উত্তম
ফলই পাওয়া যায়।

Angina Pectoris-এঞ্জাইনা পেক্টোরিস

হৃদ্ শূল

নেক্সালা।—হংপিণ্ডের আকম্মিক তীব্র আক্ষেপিক বেদনাকে হংশ্ল বলে। হংপিণ্ড-প্রদেশে সহসা ভয়স্বর বেদনা এবং বক্ষ:স্থলের সম্প্রভাগে, স্কল্ধে ও বাম বাহতে সেই বেদনার প্রসারণ, উৎকণ্ঠা, মুর্চ্ছা জনিবার আশক্ষা, হংকম্প, শাসকপ্র এবং হস্ত পদের শীতলতা ইহার প্রধান লক্ষণ। এই রোগের আবেশ কাল কল্পেক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা থাকে, ক্রমশঃ অধিকতর বেগে প্রকাশ পায় এবং কোনও এক আবেশকালে বোগীর মৃত্যু হয়।

ইহার কালে নারীরিক রক্তে ইন্অরগ্যানিক সণ্টের অভাব হইলে, উহার ফলে, করোণারী আটারির স্থিরোটিক অবস্থা (ঘনীভূততা বশতঃ প্রতঃ ; দৃঢ়তা) জন্মে । ইহারই ফলে, ধমনীর ছিদ্র সম্কৃতিত বা রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং এই জন্মই রক্ত সঞ্চলনের ব্যাঘাত জন্মিবার দরুণ হুৎপিত্তের পেনী সমূহের পোষণাভাব ঘটিয়া থাকে । এইরূপ অবস্থায় কোনরূপ মানসিক উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা, উদরাগ্রান, শ্রমজনক কার্য্য বা তঃস্বপ্র দর্শনি প্রভৃতি কারণে হঠাৎ হুৎপিত্তে আক্ষেপিক বেদনা উপস্থিত হয় এবং ঐ বেদনা বাম বাত্ পর্যন্ত সঞ্চারিত হুইয়া থাকে । পুক্ষদেরই এই রোগ বেশী হুইয়া থাকে । স্লায়বিক প্রকৃতির অথবা হিন্তিরিয়া গ্রুন্ত ইয়া থাকে । প্রথম দেখিলে ইহা স্থান্ত বলিয়াই শ্রম জন্মে । কিন্তু ইহা ওাক্তে হুংশ্ল নহে । ইহাকে সিউডো এঞ্ছিনা (রুত্রিমা বিল্তু ইহা ওাক্তে হুংশ্ল নহে । ইহাকে সিউডো এঞ্ছিনা (রুত্রেমা) বলে। রজঃ রোধের ফলেই ইহা জন্মিয়া থাকে এবং লক্ষণাত্র্যায়ী উপযুক্ত ও্রম প্রয়োগ করিলেই ইহা আরোগ্য হুইয়া থাকে।

চিকিৎসা

ম্যাপা-শ্রহ্ উ ।—ভীত্র বেদনা, আক্ষেপিক স্নায়ুশ্ল। থানিকটা ঔষধ গরম জলের সহিত মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিবে। ইহাতে অতি শীঘ্র উপকাব পাওয়া যায়। ক্বত্রিম এঞ্চাইনারও ইহা প্রধান ঔধষ। হস্ত দারা সামান্ত চাপ দিলে উহা অম্বভূত হইয়া থাকে।

ব্দানী হাস ৬×।—দৌর্মন্য বশতঃ শুৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ত্র্বলভা ও স্বিরাম্ভা। মূর্চ্ছা-প্রবণ্ডায় ম্যাগ ফস সহকারে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য; জালাকর উত্তাপ। ফিল্লফেল ১২× ।—মন্তকে রক্তের প্রধাবন সহকারে সুধমগুলের আবক্ততা ও জালাকর উত্তাপে ম্যাগফ্য সহ পর্যায়ক্রমে।

নত্তব্য ।—এই পীড়া আক্ষেপিক রোগ; স্থতরাং ম্যাগ-ফস ইছার একটি এধান ঔষণ। যে পর্যান্ত বেদনা হ্রাস না পড়ে সে পর্যান্ত ম্যাগ-ফস ৬ × এবং ক্যালী-ফস ৬ × ১০।১৫ মিনিট পর পর পর্যাান্তমে ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাইবে। ইহার ফল আমরা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছি!

(চিকিৎসিত রোগী)।

শনক রমণীর বক্ষে ভয়ন্থর কর্ত্তনবৎ ও ছুরিকা-বিদ্ধবৎ (Stabbing ann) বেদনা জন্মে। খাস গ্রহণ করিতে বা সামান্ত একটু নজিতে গেগ্রা কবিলেই বেদনা পূর্ণমাত্রায় বোধ হহত। তাহার নাড়া প্রায় বিলুপ্ত ছিল (Pulse almost imperceptible)। বোগিণীর আত্রীয় বছন সকসেই তাঁহার বাঁচিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। রোগিণীর হৃৎপিও অভ্যন্ত তুর্বল দেখিয়া পর্যায়ত্রাম পুনঃ পুনঃ কালী-ফস ১৯ ও মাগ-ফদ ৬ ম বাবহার করায় অভিশান্তই বেদনা দুরীভূত ও হৃৎপিত্তের ক্রিয়া খাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। আর একজন বৃদ্ধ প্র জ্বজের এই রোগ এই তুই ঔধ্যেই আরোগ্য হইয়াছে।

এফোনিয়া; এপথি।

Aphonia-এফোনিয়া।

স্বর-নাশ, স্বর-লোপ। (চিকিৎদা)

হিন্দ্র হন্স।—বক্তা বা গায়কদিগের অতিরিক্ত স্বর-চালনা জ্ঞ ত্বব-ভঙ্গ, ঠাণ্ডা বা আর্দ্র হইবার পর বেদনা বিশিষ্ঠ স্বরনাশ। সন্ধার গ্রোকালে স্বরলোপ। গলায় ক্ষতবং বেদনা (স্বরভঙ্গ দ্রস্তব্য)।

Aphthae—এপথি।

উপক্ষত, মুখ-ক্ষত, মুখের জারী-ঘা।

স্কান্ত্র পি কান্ত্র নি নিও দিগের জিলা, ও নুধ-মন্ত্রের স্থাক বিল্লীর খেত লেগারত ক্ষতকে এপথি বা মুথ-ক্ষত কছে। মাতৃস্করপায়ী শিশুদিগের অপেক্ষা বাছারা অন্ত হ্র পান করে তাছাদের এই রোগ বেশী দে । বায়। মাতৃস্করের দোষেও এই রোগ উর্বন্ধ ছইয়া থাকে। বেশী দিন কোন রোগ ভোগের পরও হুর্মলাবহার এই রোগ জন্মিয়া থাকে। এই ক্ষত প্রথমে ওচ ও নথে জ্যিরা গরিশেথে বিস্তৃত হইয়া তালু, গলা এবং এমন কি মলহার প্র্যাত্তির গল্পাদারিত হইতে গারে। রোগ প্রবৃদ্ধিত হইয়া পড়িলে সর্ম্বর্ধা মথ ছইতে লালা আব ও পণ্যাদি গিলিতে কন্ত বোধ হইয়া থাকে। ক্ষত উদ্ব পর্যান্ত ক্ষতাশারিত হটা পজ্যান্ত হটা প্রান্ত ক্ষতাশার জিলিতে কন্ত বোধ ইয়া পাকে। ক্ষত উদ্ব পর্যান্ত ক্ষতাশারিত হটা প্রান্ত ক্ষতাশার জিলিতে কন্ত বোধ হইয়া পাকে। ক্ষতে উদ্ব পর্যান্ত ক্ষতাশারিত হটা ক্যামান্ত্রা ও উদ্বাময় জ্যামান্ত্র ও অপ্রিক্ষার বোত্তল ও রবারের ননে হুঞাদি পান ক্রান এই

বোগের একটা কারণ বটে। অনুপযুক্ত আহারের ফলে এবং মাভৃস্তন্যের দোষেও এই রোগ জনিয়া থাকে।

এই রোগে তলপানের পর শিশুর মুধ উত্তমরূপে পরিষ্ণার করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য । মুথ প্রিদ্ধার করিবার পর, সোহাগার থই চুর্ণ করিয়া মধুর সহিত্ত মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিলে ক্ষত দীঘ্র দীঘ্র আরোগ্য হয়। যাহাদের বোতলে বা নলে হগ্ধ পান করান হয়, তাহা পুনরায় ব্যবহার করিবার পূর্বে গ্রম জলে উত্তমরূপে ধ্যতি করিয়া পরে ব্যবহার ক্রা কর্ত্তব্য ।

চিকিৎসা

বিল্**র-ফেস্স।—শিশুদি**গের বা *ত*ন্তদাত্রীদিগের মুথক্ষত। শিশুর বুথ ক্ষত সহ জ্বর এবং ভিহ্বা**র অ**তান্ত আরক্ততা।

কালী-ভিটের।—প্রভূত লালা প্রাব বিশিষ্ট মুথক্ষত; ইহা এই বোরের প্রধান উ্ধর।

ন্যান্ত-ন্দি ভিল্ল।—ইহা এই বোগের শ্রেষ্ট না একমাত্র ঔষণ।
মাভ,স্থরিক ও বাহ্য ন্যবহার্য। প্রভূত লালা স্রাবে ইহা সবিশেষ উপযোগী । (মুখের রোগ দ্রষ্টব্য)।

Apoplexy—এপোপ্লেক্সি, সংস্থাস।

এই রোগ তিন প্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে। যগাঃ—
(১) মন্তিক্ষের রক্তবহা নাড়ী সকলের (blood vessel) রক্তাদিকা
ভবিত সংখ্যাস; (২) মন্তিক্ষের রক্তবহানাড়ীর বিদারণ নশতঃ

মন্তিক্ষে রক্ত ক্ষরণজনিত সংস্থাস; (৩) মন্তিক্ষে অকম্মাৎ অধিক পরিমাণ স্কু বা রক্তামু (সিরঃম) সঞ্চয় জনিত সংস্থাস।

ত্যক্ষণ।—এই রোগে রোগী প্রথমতঃ হঠাৎ ভূমিতলে পতিত হয়। তাহার সংজ্ঞা বা সঞ্চরণ শক্তি থাকে না। সে নিদ্রান্তিভূতের সার পড়িয়া থাকে। তাহার মুখমওল আরক্ত, খাস আয়াসিত এবং নাড়ী পূর্ব ও মন্দ গতি বিশিষ্ট থাকে। চক্ষুর তারা (pupil) প্রসারিত অথবা একতার। প্রসারিত ও একতারা সম্ভুচিত থাকে। মুখ একদিকে আরুষ্ট এবং অর্দ্ধাঙ্গে বা সর্ব্তাঙ্গে আক্ষেপ থাকে। রোগার সমাক বাক্রোধ বা বাক্যের ভড়তা নিবন্ধন অম্পষ্টভাষণ বিভাষান থাকিতে পারে। মন্তক্ষের যে পার্ষে রক্তস্রাব হয় তাহার বিপরীত দিক অবশ হয়। কথন কথন রোগের আক্রমণ কালে অভাতদারে বা ব্যন্কালে মলমূত্র প্রাব্হইয়া থাকে ও গলার ঘড় ঘড়ি জন্মে। মুখ একদিকে বাঁকিয়া বার। এতহাতীত এই রোগের আরও বহু লক্ষণ আছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমূহ ৰারাই এই রোগ বুঝা যায়। এই রোগ হাতিশয় সাংঘাতিক। পুরু স্থচনা ব্যতীতই রোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে, এজন্ত পূর্বের সতর্কতা অবলম্বন করিবার কোনও স্থযোগ পাওয়া বায় না। যাহা হউক, এই রোগে, রোগ চিনিবামাত্রই বিচক্ষণ চিকিৎসক ডাকা কর্তবাঃ ষে কোনও কারণেই হউক না কেন, মস্তিঞ্চের রক্তাধিক্য জন্ম অথবা মন্তিকের অভ্যন্তরস্থ ধমনী (artery) ছিন্ন হইয়া মন্তিকের মধ্যে রক্তনাব অথবা মন্তিকের রক্তাধিক্যের পর (after congestion) অধিক শাত্রায় রস (serum) আব হওয়ার ফলে মন্তিক্ষের উপর চাপ পড়ার দক্ষণ রোগীর সংজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান হৈতন্তের লোপ এবং নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা হ্রাস বা লুপ্ত হওয়ার ফলে নিজিতের ভায় পড়িয়া

থাকে, কিন্তু এই সময় তাহার হৃদপিও ও ফুসফ্সের ক্রিয়া পূর্বকং চলিতে থাকে।

কারণ।—নিম্নিথিত কারণ সমূহের ফলে সাধারণতঃ এই বোগ জনিয়া থাকে। যথা,—মন্তিষ্কের অভ্যন্তরন্থ ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ীর (small arteries or capillaries) মধ্যে গমেটা (অন্থিবেপ্টার্ক্ দ) মন্তর্ক্ দ অথবা ক্যালকেরিয়াস্ পদার্থ সঞ্চয় বা মেদাপর্ক্ষণ জন্ত তিহা বিদীর্ণ হওয়া, অথবা স্ক্র্মা রক্তবহা ধমনীর মধ্যে সংঘত রক্তের ওও (clotted blood বা রক্তের চাকা) বদ্ধ হওয়ার ফলে তথায় বক্তালতা জনিয়া পরিপোষণাভাবে স্থানিক কামলতা জন্মে এবং কোমল অংশের চতুর্দিকে রক্তানিক্য হইয়া থাকে এবং সামান্য কারণেই উক্ত ধমনী বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

তিক্তক কার্ল।—অতিরিক্ত মন্তাদিপান, মান্দিক কট্ট মন্থকে কোনরূপ আঘাত লাগা, অতিরিক্ত অধারনের ফলে মন্তকে কক্ত সঞ্চয়, আঁটা সাঁটা বস্তাদি পরিধান, অহিফেন সেবন, অত্যধিক বোলের উত্তাপ লাগান, অত্যধিক আলহা, ভারি বস্তু উত্তোলন, কুন্তন, অত্যধিক উষ্ণজলে স্থান, স্বাভাবিক বা অভ্যক্তরক্তরার কক্ত হওয়া, হঠাৎ ক্রোধের উদ্রেক বা উচ্চ চেচামেচির ফলে এই রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। বুদ্ধ বয়স, রক্ত প্রধান ধাতু ও গজন্বন্ধ অর্থাৎ থাট গ্রীবার লোকদেরই এই পীড়া অধিক হইয়া থাকে।

সচরাচর এই রোগ মূর্জা, মদিরা ও অহিফেনের বিঘাক্তার সহিত ভ্রম হইতে পারে। পার্থকা এই,—মূর্জা, হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত শ্রীলোকদের যৌবনাবস্থায়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সংগ্রাস বৃদ্ধ ব্য়মে হয় এবং পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতিরিক্ত মন্ত্র

পানের ফলে মুর্চ্ছা উপস্থিত হইলে,—রোগীর পুর্ক ইতিহাস, স্বাসে মদের গন্ধ এবং তাঁছার চকুর তারকা হুইটীই সমান দৃষ্ট হয়, একটী ছোট আর একটা বড় থাকে না। অহিফেন দারা বিষাক্ত রোগীর তারকা ছইটীই সঙ্কুচিত দৃষ্ট হয়, অনেক ডাকিলে কণ্টে গে উত্তর দেয় এবং ভাহার মুখ দিয়া ফেণা উঠে না। মুর্চ্ছা রোগীর মুখ দিয়া খাস প্রখাস চলে না। এই রোগাক্রমণের পূর্বে অত্যন্ত আলগু ও সর্বাদা নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি, নাফ ভাকাইয়া গাঢ় নিদ্রা, নিদ্রিতা-বস্থায় চমকিয়া উঠা, দাঁত কড়মড়ি, অনবরত হাই তোলা, অত্যন্ত ছর্বলতা অমুভব, মস্তকের বিভিন্ন স্থানে ভার বোধ, মস্তকে গুক্তানূভব, মস্তকের শিরা সকলের স্ফীতভা, উৎসাহশূন্যভা, ক্রন্দনের প্রযুক্তি, শরীর ভার বোধ, শ্রীরের নানাস্থানে হল ফুটানের ন্যায় বেদনা ও কথা কহিবার শক্তি কমিয়া আইসে। এইকপ অবস্থায় সত্র লক্ষ্ণার্যায়ী ঔষধ মেবল করা একান্ত প্রয়োজন। সময় মত উপযুক্ত ঔষণ সেবন করিলে রোগাক্রমণের ভয় বিদ্বিত হইয়া থাকে। আমরা বাইওকেমির ওম্প প্রয়োগ করিয়া ব**ছ আশাশূন্য রোগীকে আবো**গ্য করিয়াছি দ রাড প্রেশারের বোগাদের লঘু, স্বলাহার ও নিয়মিত আহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। ৪৫ বংসর বয়সের পর স্কলেরই রাত্রে গ্রু সন্নাহার কর। কর্ত্ব্য । পীড়ার আক্রমণ বুঝিবা মাত্র মস্তক উভোলিত ও পদাদি অধঃশাথা নিম্ন করিয়া শাম্বিত করিবে। চিৎ করিয়া না শোমাইয়া এক পার্শ্বে কাৎ করিয়া শোয়াইবে। মস্তকে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিবে। বর্ফ দেওয়ায় অনেক সময় কুফল ফলে। এইরোগে পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেখন কর্ত্তব্য। গিলিতে পারিলে জলসহ ঔষধ আর গিলিতে অক্ষম হইলে ঔষধের চুর্ণ জিহ্বায় লাগাইয়া দিবে। গ্রোগীকে অস্করণর ও বায়ুদেবিত গৃহে রাখিবে। ঘরে যেন কোন শক না

হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে। ঘরে বেণী লোক থাকিতে দিবেনা। রোগীর গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিবে।

চিকিৎসা।

হিল্পা নিক্ত নিক্ত তি ২ ।—মন্তিক্ষে রক্ত সঞ্চয় বা রক্ত বহানাড়ীর ছিয়তা জনিত রক্ত থাবের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মুখমগুলের আরক্ত তা বা পাঞ্রতা, ধমনীর প্রবল দপ্পানি, গ্রীবার এবং মন্তকের নিরার ক্ষীততা। বোগের আবেশ কালে এবং বিরাম কালেও রোগের প্রতিষ্ধাথ ব্যবহৃত হয়। ফিরম-ফ্সের ন্যানতা ঘটিলেই নিরাও ধমনীর প্রাচীরের নিথিলতা (relaxation) জন্ম। এজন্ত উহা প্রসারিত হইয়া থাকে। ইহার কলে নিরা বা ধমনীতে প্রচুর রক্ত প্রবেশ করিয়া উহার উপর চাপ প্রদান করে। ইহাকেই ব্রাড-প্রেশার বলে। এজন্ত ব্রাড-প্রেশারের রোগীকে কিরম-ক্স থাইতে নিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

ক্যাব্দ্র স্থে ।—ফিরম-ফদের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। ইহা ব্যবহারে রক্তবহানাড়ীর রন্তাকার পেশীর সঙ্কোচন জন্মির। উপকার পর্শে। এই জিনিবের ন্যানতা ঘটিলে নিরা বা ধমনী বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এজন্ম এই রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ব্লাড-প্রেশারের রোগীদের ইহা ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে রোগের আক্রমণ বন্ধ হয়।

আগের প্রধান ঔষধ ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

কালী-ফ্রান ৬×।—্রোগের আবেশকালে বা রোগাক্রমণের পুর্বের নিদ্রাহীনতা ও পক্ষাঘাতের লক্ষণ ব্ঝিতে পারিলৈ এই ঔষণ প্রয়োগ করা কর্তব্য। ফিরম-ফ্র সহ প্র্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্রা আ-স্কান্স ০ × ।—রোগের আবৈশের পূর্বের মন্তকে প্রবল রক্ত-সঞ্চয় বা পৈত্তিক লক্ষণের বিশ্বমানতা দৃষ্ট হইলে। এই ঔষধ রক্তের জলীয়াংশের হ্রাস জন্মাইয়া উপকার দর্শ হিয়া থাকে।

সি কিশিক্সা ৩০ × 1—ডাঃ ভণ্ডার গলজ এই রোগে ইছা ব্যবহরি করিয়া স্ফল পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ধমনীর ফিলুরোটিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার ফলে যথন এই রোগ জলা তথনই ইছা দ্বারা স্ফল প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

মাজ্বা।—রোগের আবেশকালে রোগীকে থোলা, শীতলবার সেবিত গৃছে লইরা গিরা বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিবে ও মন্তক উন্নত কবিয়া উষ্ণ শ্ব্যায় শ্বান করাইবে। হস্ত, পদ এবং কুক্ষিদেশে উষ্ণসেক এবং মন্তকে বরফ বা শীতল জলের পটি দিবে। আন্তে আন্তে রোগীর গাত্র মার্জনা করা কর্ত্ব্য। হগ্ধাদি পুষ্টিকর লঘুপথ্য ব্যবস্থের। রোগীর চক্ষে আলো লাগিতে দিবে না ও ঘরে কোন প্রকার শন্দ হইতে দিবে না

(চিকিৎসিত রোগী)

ঢাকার স্থবিখ্যাত কবি এবং স্বায়ন্ত-শাসন পত্তিকার সম্পাদক শীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ভগিনীর আহার কালে হঠাৎ এই রোগের আক্রমণ উপস্থিত হয়। রোগের আবেশ উপস্থিত হওয়া মাত্রই রোগিনী সংজ্ঞাশৃত্যভাবে পড়িয়া যান। একটী কথা বলিবার ও আর শক্তি ছিল না। তৎক্ষণাৎ ঢাকার প্রধান প্রধান এলোপ্যাথিক চিকিৎসককে ডাকান হয়। রোগিণীর সুলকায় এবং বয়স (৫৪)ও অত্যাত্য অবস্থা দৃষ্টে চিকিৎসকগণ সকলেই আরোগ্যের আশা একেবারে পরিত্যাগ করেন এবং আর ৪া৫ ঘন্টার বেশী রোগিনী জীবিত থাকির্বেন না বলিয়া নিশ্তিত মত প্রকাশ করেন। কালীবাব্র জনৈক ডাকার

রদু বাইওকেফিক মতে চিকিৎসা করাইয়া দেখিবার জন্ম গ্রন্থকারকে আহ্বান করিবার জন্ম উপদেশ দেন। তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকা হয়। আমি গিয়া প্রথমেই ১ ডোজ আর্শিকাত প্রয়োগ করি। রোগিণীর বম্পূর্ব অট্যেত্র অবস্থা এবং মুখ ডান দিকে বাঁকা দেখিয়া আর্ণিকা প্রদানের অর্দ্ধ ঘণ্টা পর ফেরম-ফ্স ১২ x ৪টী ট্যাবলেট, কালী-ফ্স ৩×, ৪ ট্যাবলেট এবং ম্যাগ-ফস ৬× ৪ ট্যাবলেট এক সঙ্গে গ্রম জলে গুলিয়া থাইতে দেই। ইহার অর্থ ঘণ্টা পর পুনরায় ক্যাল্ব-ফ্লোর ৬× ও ট্যাবলেট পুর্বের ভার গরম জলে গুলিয়া খাইতে দেওয়া হয়। এই তুই দফা বাইওকেমিক ঔষধ অর্ক ঘণ্টান্তর পর্য্যায়ক্রথে থাইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যুহ প্রাতে, বৈকালে ও রাত্রে আর্থিকা ৩০ দেওয়ার ভ উপদেশ দেওয়। যায়। বিতীয় দিন রোগিণীর উচ্চ নাসারব দুটে ২।১ ডোজ ওপিয়ম ৩০ দেওয়া হটয়াছিল। এই **এব ঔষধ নিয়মিত ভাবে ব্যবহারের হলে যোগিণী সম্পূর্ণ আ**রোগ্য গাভ করিয়াছিলেন। বাম পার্ণের প্যারালিসিস্ দৃষ্টে, মধ্যে भर्धा लारकिमिम ७० (एउम्रा इरेम्राधिन। रेरात श्व द्वाशिनी যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই রোগের আক্রমণ আর উপস্থিত হয় নাই। ইহার ৮।১ বংশর গর নিউমোনিয়া রে,গে মফঃস্বলে এই রোগিণীর মৃত্যু ঘটে।

আরও ৯।৫টা রোগীও লক্ষণ দৃষ্টে পূর্ব্বাক্ত ঔষধ সকল ব্যবহার করায় সম্পূর্ণ নিরামন হইয়াছেন। এই সব রোগীর প্রারম্ভাবস্থায় লক্ষণ দৃষ্টে আর্ণিকা ৩০, গ্লন্থেন ৩০, ওপিন্নম ৩০ এবং ল্যাকেসিদ্ ৩০ এবং রেলেডোনা ৩০ ও দেওয়া হইয়াছিল।

Appendicitis—এপেণ্ডিসাইটিস্। ভপাঙ্গ-প্রদাহ

অন্তের তার্দ্ধিকরন্ এপেণ্ডিক্স (Vermiform appendix)
নামক উপাঙ্গের প্রদাহকে এপেণ্ডিদাইটিস্বলা। নিয়াদরের দক্ষিণ
প্রো'ণ্যহ্বরে (right iliac-fossa) এই ভার্মিকর্ম-এপেণ্ডিয় অবস্থিত।
এই রোগের স্ক্রনায় (১) তলপেটে, বিশেষতঃ দক্ষিণ প্রোণিগহ্বরে হঠাৎ
বেদনা জন্মে। (২) দক্ষিণ শ্রোণিগহ্বরে হস্ত দ্বারা স্পর্শে অভ্যন্ত বেদনা
অন্তুত্ত হয়, কোন প্রকার চাপ সহ্য হয় না। (৩) দক্ষিণ রেক্টান্ পেশীর
(Rectus muscle) অভ্যন্ত দূঢ়ভা বা কাঠিল্ল (rigidity) জন্মে
এজন্ত বোগী পা মেলিতে পারে না। (৪) প্রদাহ সহ অল্লাধিক জ্বর
উৎপত্র হয়। (৫) ভিহ্নার-লেপ ও কোন্ঠ কাঠিল্ল উৎপত্র হয়। কদাচিৎ
অভিসারও ভিনিয়া থাকে। (২) রোগের প্রারন্ডাবন্তার প্রচাপনে প্রথাম
নিয়োদরের গনীতভা ও পরে টিউনার বা জ্বোটকের লার কঠিন স্থান

অনুভূত হয়।

প্রথম হইতে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে ফীততা প্রায়ই বিদান হইয়া রোগ আরোগা হইয়া থাকে, নতুবা পৃষ ক্রিয়া পাকিয়া থাকে। উপযুক্ত বাইওকেকিন বা হোমিওপাাথিক চিকিৎসায় এই রোগ প্রায়ই আরোগা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

রোগের প্রারম্ভাবস্থায় ফিরম-ফদ ১২ × ও কালী-মিউর ৩ ×,
পর্বায় ক্রমে ঘন ঘন উষ্ণ অল সহ ব্যবহার করিলে সহজেই ক্ষীততা বিলীন,
ও বেদনা হ্রাম প্রাপ্ত হইরা রোগ আরোগ্য হইরা থাকে ৷ উদরের ক্ষীততার
'গু বেদনার আধিকো ম্যাগ-ফম ৬× এবং ক্যাল্প-ফম ১২ × একত্ত্বে

নিলাইয়া গরম জলদহ থাইজে দিলে সহর বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত টিয় ও

ত্বিভাল কমিয়া থাকে। পূব সঞ্চিত হইয়া পাকিবার উপক্রম হইকে

অথবা পাকিয়া বাকিলে দিলিশিয়া ৬× বা ৩০ × ব্যবহার করিলে জোটক
ফাটিয়া বার। এই অবস্থায় লক্ষণের সাদৃগ্র থাকিলে দিলির পর ক্যাল্বসলম্ব ৬× বাবহাত হইতে পাবে। এই রোগে হোমিওপার্গি মতে

ক্রেডেনা ১× শ্রেষ্ঠ ওরধ। প্রারম্ভাবস্থায় ইহা বাবহার করিলে

তন্ত উবধের বড় প্রধোজন হয় না! পূযোৎপত্তিতে ও অভান্ত বেদনায়
হিপার দলফ ৬× বা ২০০ অথবা দিলিশিয়া ২০০ বাবহাবেও বেদ ফল
গাওয়া বায়। আমরা এই রোগের যতগুলি রোগী দেনিয়াছি সকলেই

আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বাছদা ভয়ে নামোন্নের করিলাম না।

তেই রোগে রোগীকে জল, ভাবের জল জিমনেড্ অথব। প্রগার অব্ মিল্ল ললে গুলিয়া গ্রান ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার শক্ত থাস্ত (Solid food) ব্যবস্থা করিবেনা। প্রারম্ভাবস্থায় ঠাণ্ডা বাহা প্রয়োগ (Ice.bag) অভিশয় উপকারী। স্নোগীকে নড়িতে চড়িতে দিবে না। প্রথমানস্থায় ভূশবারা অন্ত পরিকার করিয়া ফেলা উচিত।

Appetite—এপিটাইট—ক্ষুধা।

কুণার বৈলক্ষণা শরীরের আভাস্তরিক কোনও রোগের জ্ঞাপক।
কোনও বস্তবিশেষ বা সকল প্রকার খান্ত দ্রব্যেই অফচি-লক্ষণ থাকিলে
নিশ্চর জানিবে 'প্রকৃতি' উহা চার না। অফুচি সহকারে কোনও বিশেষ
দ্রব্যের প্রতি আকাজ্ফা থাকিলে উহা থাইতে দেওয়া মন্দ নহে। প্রকৃতি
বে জিনিষ চার, আকাজ্ফা ঘারা উহাই প্রকাশ পার। কোনও রোগের

জেগিকালে অনেক সময় ছণ্ট ক্ষুণা (false: appetite) দেখা যায়। এবিশণে সঙক থাকা দরকাব। যে জিনিয়ে ক্ষচি গাকে, ভাহা বুব বেনী ক্রিয়া দিবে নুং, স্থা রাখিয়া খাইতে দিয়ে।

(চিকিৎসা)

ফিল্ল অ-ফ্রন্স।—জরভাব সহ ক্ষধানীনতা।

काकि-का ।-- वमरुका भा वक्कीनला महकारत क्षाहीनला।

লে ট্রামা-ফ্রানা — আমাশরের (ইমাক্) অম ককণ সহ সুথা মালা, বুক জালা।

কালী-ফালা — টাইফরেড্ ফিবার বা অপর কোনও ক্ষরকারী বোগের গর তুদ্দা কুধা। থাইশেও কুধার নিবৃত্তি জন্মে না। না ধাইরে অতিশগ্ন কষ্ট বোধ হয়।

Arthritis—আর্থ্রাইটিস।

সন্ধিবাত, সন্ধিপ্ৰদাহ

(সংক্ষিপ্ত চিক্-স।)।

হিন্দ্র-হক্ষেন। তরণাবস্থায় জয়, উত্তাপ ও বেদনা কমাইবার পক্ষেইতা বিশেষ উপকারী। পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা কর্ত্তবা; জর ছাড়িয়া গেলে অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের স্থিত পর্যায়ক্রমে নিবে।

ন্যাক্তি-সালা—তরুণ রোগে ফির-ফদের সহিত পর্যায়ক্রমে। পুরাতন রোগে শুরূ এই ঔষধই বিশেষ ফলপ্রদ। সন্ধিবাত ও কটিবাতে, বিশেষতঃ রোগীর পৈত্রিক ধাতু প্রস্কৃতি এবং গুরু ভোজন বিলাদের ফলে রোগোৎপন্ন হইরা থাকিলে ইহা সবিশেষ উপযোগী। জিহ্বার বর্ণপ্র দ্রষ্টব্য।

স্থা উ-ফ্রন:—সন্ধির সকল প্রকার বাতেই, বিশেষতঃ রোগীর অমরোগ থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। জিহ্বার মূল-দেশে মর্ণের ন্তার পীতবর্ণের লেপ ইহার বিশেষ পরিচালক লক্ষণ।

Ascites—শৈথ

(জুপিন দ্রুফীবা)

Asthma—এজমা

খাস-কাসি, হাঁপানি ৷

"এজমা" ইহা একটা গ্রীক শক। ইহার অর্থ বার প্রাপ্তির জ ইাপানি বা থাবি থাওয়া। আকেপিক শ্বাসকট সহকারে বক্ষঃস্থলে নাট সাই শক্ত ক্ষিয়া ধরার ন্তার জাঁট জাঁট বোধ এই রোগের লক্ষণ।

নানা কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। কুসকুদের বাযুবাহাঁ নলগুলি (bronchial tubes) পেশী হারা বেষ্টিত। এই পেশীর আক্ষেপ জানিলে বাযুবাহী নলগুলি সন্ধুচিত হইরা পড়ে। বাযুবাহী নলের সক্ষেচিন জন্তই খাস-প্রখাসে কট ও বুকের ভিতর সাঁই সাঁই শক হইরা থাকে। এই রোগ অভিশয় যন্ত্রণাদারক, কিন্তু প্রাণনাশক নহে। পিতামাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানসন্ততিক্রমে চলিতে থাকে।

বাইওকেমিক প্যাথলজি অনুসারে হাঁপানি রোগের নিদান।—রক্তে কোনও একটী বা ততোধিক ইন্-অর্গানিক পদার্থের অভাব হইলে কতকগুলি অর্গানিক পদার্থ অকার্যাকারী হওয়া বিধার প্রকৃতি উহাদিগকে শহীর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতে চেয়া করে। উক্ত অর্গানিক পদার্থ সমূহ খাস-পথে বহির্গত হইবার কালে খাস-যম্ভের উত্তেজনা জন্মায়। এই উত্তেজনা বশতঃই বায়ুবাহী নলীর আক্ষেপ জন্মিয়া ইাপানি রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ব্যান্থ-হ্নতন। —পরিষার, ছল্ছেন্ত শ্রেমা নিষ্ঠাবন বিশিষ্ট রোগা।
খন্যা হইতে উঠিবার কালে শিশুর খাস-রোধের আবেশ (লাট-ফস)।
গাঁড়, পীতন্ত নিষ্ঠাবন। অন্ত ঔষধ ব্যবহার করা হইলেও মধ্যে মধ্যে
ইহা ব্যবহার্যা।

কালী ক্রিস।—খাস রোধের মাশকার ৩ × ক্রমের বিচূর্ণ অধিক মাত্রায় পুন: পুন: প্রয়োগ করিলে অতি উত্তম ফল দর্শে। যংসামান্ত আহারেই খাসের আবেশ। ইহা খাস-কষ্টের সর্বাপ্রধান ঔষধ।

কালী-মিউর ।—আমাশরের (প্রমাক্) বিশৃত্যকা সংযুক্ত খাসকাস; খেত লেপারত জিহবা, যক্ততের ক্রিয়ার বৈষম্য, কোঠকাঠিয়। গাঢ় শুদ্র, ছম্ছেন্ত শ্রেমা, তুলিয়া ফেলিতে অভিশন্ন কপ্ত হন। খাসের জন্ত কালী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

কাক্রী-সাক্র।—পাতলা, পীতবর্ণ শ্লেম্মাবিশিষ্ট খাদ-কাস। কাসিলে সহজেই শ্লেমা উঠিয়া আসে। উষ্ণ গৃছে বা গ্রাম্মকালে বৃদ্ধি; বিমুক্ত ঠাণ্ডা বামুতে উপশম। ন্যাউ-ন্মিউল্লা-পরিষ্ণার, ফেণিল শ্রেমা নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট শ্বাস-কাস; চকু এবং নাসিকা হইতে জলবং আব। শ্বাসের জন্ত কাণী-ফসের সহিত পধ্যায়ক্রমে।

স্যাপ্ত হৈ সাদক প্রকর উদারাগ্মান বা বক্ষে অত্যস্ত আক্ষেপিক জাকুঞ্চন অনুভব সংযুক্ত হাঁপানি।

ক্রাল্ল-ক্রোক্স। কাসিলে বহু কটে পাতবর্ণ, কুদ্র কুদ্র নিষ্ঠীবনেব থণ্ড উঠিয়া আইসে। খাসে পর্যায়ক্রমে কালী-ফস ব্যবহার্য।

স্থাতি-স্কুল। স্থাকাদারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই ঔষধ শিশুদিগের রোণে বিশেষ ফলপ্রদ। আর্দ্রভায় ও আর্দ্র ঝাতুতে বৃদ্ধি। এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ নিষ্টাবন, জিহ্বার বর্ণ ও প্রাতঃকালীন অভিসার ইহার বিশেষ পরিচালক লক্ষণ।

লেট্রাম-ফ্রুস।—গাঢ় গীতবর্ণের নিষ্ঠাবনযুক্ত খাস-কাসে ইহা স্থব্যর উপযোগী।

সিলিকাকা!—খাস গ্রহণে অভিশয় কট, বিমুক্ত বায়ুতে থাকিবার একাম্ব আংশুকতা। কৌলিক রোগে, রোগের মূলোচ্ছেদের নিমিন্ত ক্যাট-সলের সভিত পর্যায়ক্রমে। খাসের জন্ম কালী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

পথ্যাপথ্য।—খাদ রোগে গুরুপাক দ্রব্য ও অভিভারন নিষিদ্ধা ধারা স্নান, বিমল বায়ু দেবন ও অল্ল অল্ল বিচরণ (হাঁটা) উপকারী। স্ত্রী-সংসর্গ ও অতি পরিশ্রম নিষিদ্ধ। মূলা, পটোল, বেগুন, গোধুম, ষব ও উষ্ণজ্ঞল পান স্থব্যবস্থেয়। বারংবার অল্ল জল্ল আহার করিবে, কিন্তু কথনত উদর পূর্ণ করিয়া থাইবে না।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) ৪২ বংসর বয়য়া জনৈক মহিলা করেক বংসর যাবং খ্রাস-কাসে ভূসিতেছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠীবনের সবুজাভা ছিল ও উহা প্রভূত পরিমাণে িংস্ত ইইত। তেটুম-সংফ ৬×, ৬ হণীান্তর দেওয়ার নিষ্ঠাননের (শ্লেমা) ২ণের পরিবর্তন ও পরিমাণের স্বল্লভা জনা। এই উষধ এমোগের পূর্বের যথনই রোগের আবেশ ইইত, ভাষা কভিপন্ন সপ্তাহ পথান্ত স্থ রী ইইত; কিন্তু ইহাব কয়েক মাত্রা মাত্র ব্যাহর করার শ্লেমা শ্রাব একেবারেই হগিত ইইয়াছিল। ইহাতে ব্রা গেল এগেত্রে এই উষধ রোগের মূলদেশে কাণ্য করিয়াছে।

- (১) একজন ভদ্র লোবের নাস-কাসের এরপ প্রবল আবেশ উপত্তি ইত দে, বত দুর হংতেই তাঁহাব আগমনের নিষম জানা মাইত। ভদ্রনোকটার আরুতি হা ব শানি পুর বলিষ্ঠ ছিল। বংশে কাইছের প্রবন্ধ হার কাইছিল। বংশে কাইছের প্রবাহ ছল বাহান প্রবাহ নাইছিল। বাহান শালে বক্ষা প্রবাহ বাহান বিশ্ব ছল ভাষার বুক জ্প্রশান্ত ছল হা স্ন-নিনাম শালে বক্ষা প্রায়ার বুহণ বাহান লী-ভূতেই নিকটে এইছে জার কেথাত Coarse rate-বাহার অরপ থাসেব আবেশ হয় যে, ভীবনে আর বথাত এরাপ হয় নাই। এইছিম-স্বাহ্ বংল স্থানের আবেশ হয় যে, ভীবনে আর বথাত এরাপ হয় নাই। এইছিম-স্বাহ্ বংল স্থানের আবেশ হয় যে, ভীবনে হুলার স্থান ত এরাপ হয় নাই। এইছিম-স্বাহ্ বংল স্থানের আবেশ হয় বের মারো নাত সেবনে হুলার প্রায় জার এই রোগের ভাবেশ উপস্থিত হয় নাই।
- (৩) একজন সম্রাস্ত জনিদারের যুবক পুত্র কতিপার বংসর যাবং হাঁপানি খোগে ভূগিতেছিলেন। এই রোগে স্চরাচর ব্যবহৃত উব্ধ বাবহারে বিশেষ কোন উপকাব পাভ্যা যায় নাই। কালী-ফ্স ও কালী-মিউর. ব্যবহারে অতি সম্বর এই রোগা আবোগা হয়।

Atrophy—এটুফি।

(একান্স বা সর্ববান্সের শীর্ণতা)

পরিদৃশ্যমান্ কোনও কারণ ব্যতীত শারীরিক কোনও বিধান, যন্ত্র বা পেশীর শীর্ণতাকে এট্রি, ম্যারাস্মস্বা ইমাসিয়েসন বলে। পৃষ্টিকর বা পর্যাপ্ত আহার্যের অভাব, পরিপাক যন্ত্রের পীড়া বা ত্রবলতঃ বশতঃ ভুক্ত দ্বোর অজীর্ণতা, উনরে ক্রমির বিভ্যমানতা ইত্যাদি এই রোগের কারণ। শিশু ও বালকদিণের ইন্ফ্যাণ্টাইল লিভার, স্ক্রিলা, টেবিস্ মেসেন্ট্রিকা প্রভৃতি ছইতেই শীর্ণতা থ্রাম্মা থাকে।

(সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)

ন্যাউ হাস। স্থা ছথের পরিবর্তে বোডলে করিয়া কুত্রিম চয় পান করাতে শিশুর শীর্ণতা জন্মিয়া থাকিলে। উদরের স্ফীততা; বৃহৎ যক্ত। খাইবার পর উদর বেদনা। অপরিপাচিত ভুক্ত দ্রবা সংযুক্ত মন।

ব্যাট সালা।—কৌলিক মাষক দোষ; শ্বীত উদর, উদরে অতিশয় গুড় গুড় হুড় কুড় শক। পীতংৰ্জনবং, সবেগে নিঃদারিত মল; প্রাতে নভিবার চড়িবার উপক্ষে বৃদ্ধি।

সিলিশিকা। —শরীরের শীর্ণতা, কিন্তু মন্তকের বুহত্তা।
সহকেই শিশুর ধর্মের উদ্রেক; অতিশ্য মার্নীয়তা (বিচাধ্যে স্থভাব)
ও ক্রোধের উদ্রেক। মুখ্মগুলের শীর্ণতা ও জরাজীর্ণতা। মাতৃত্তক্তে
অস্গা, উহা শাইলেট বমি হয়। জলবং, হ্যান্ধিমা। ঋতুর একটু
পরিবর্জনেই শার্ণতা।

কালী-ফাসা।—পেশীর শার্পতা সংযুক্ত অথবা বে কে:ন কারণেই হটক শীর্ণতার সহিত মলে অতিশর চর্গন্ধ থাকিলে ইহা আবশ্রক। ক্যাব্দ্ধ-ছাল্স।—কৌনিক রোগে অন্ত কোন ব্যবস্থের ঔবংধর সহিত পর্যায় ক্রমে। স্থাফি ইলাগ্রস্থ শিশুদের অস্থি আক্রান্ত হইলে; খান্ত দ্বা ভীর্ণ হয় না। অত্যস্থ হুর্দ্মলহা ও দস্তোদ্ধামে বিলম্ব সংযুক্ত শীর্ণতা।

নাত মিউল্লাল নুখমগুলের মূর্ব, শিশুদিগের গ্রী বার শীর্ণতা তবং স্থাট-নিউরের আর আর নিশেষ লক্ষণ বিদ্যানন থাকলে। শিশুর কথা দলিতে শিপিতে বিশ্ব । কোর্চ কাঠিকা।

Back ache—ব্যাক্ এক; কটি বেদনা

(मः कि श्र हिकि भा)

ব্যান্ধ-ফ্রন্স ৬×, ১২ × ।—স্বরণতা, নীতলতা ও তংসহ সিড় সিড়ানি বা ভুড়ভুড়ানি সংযুক্ত কটিবেদনা। রাত্রে ও বিশ্রাম কালে বৃদ্ধি। ফির-ফ্র ১২ × স্চ প্র্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। প্রাতে জাগিবা মাত্র ক্টিদেশে বেদনা জন্ত ভব।

ব্যালে সালাফ ৬ x ।— উষ্ণ গৃঙেও অপরাক্তে বেদনার বৃদ্ধি এবং শীতল বিমৃক্ত বায়ুতে উপশম। বেদনা নজিয়া চড়িয়া বেড়ায়।

আগি-ফ্রন্স ৬ x ।—থননবৎ ও তিরবিদ্ধ বং বা চিড়িক্মারার স্তার বেদনা। এই বেদনা নাড়গা চড়িয়া বেড়ায় ও উঞ্চতায় উপশ্মিত হয়।

বেট্রাম ফ্রন ৬×।—প্রাতে জাগিনা মাত্র কটির অভ্যন্তর দিগ্র বেদনা অনুভব। স্পি হা - আফে পিক ও আকর্ষণবৎ বেদনা, বেগ্নী,ক স্থির ভাবে শুইয়া থাকিতে হয়। মেরুদণ্ডের অভান্তর দিয়া অবিরাম মুহ বেদনা।

ফিল্লাফ্রস — বটি: , কুর্চাক্রে এবং বৃক্তক-শাদেশে বেদনা।
কেমল নড়িলে হাড়লে দেন। অন্তভূত হয়। ইং। এই বোরের প্রায়
অমোঘ ঔরধ।

কালে ক্লোকা ।—বটিদেশে বেদণা। কোইবল্ধ। গেগাক ও তানে
পূর্বতা ও জানা। সংগ্রেন উপত্ম বেদনান বু'ল, 'ক্ল ক্ষাগ্রন ইাটিকে থা'ব্যে উভ্যে উপত্ম কোলী না)।

নাত মিতি,—,কলে কঠি ব্যৱ হল গানে কটিবেৰনাৰ উপশম। ভিহ্বাঃ প্রকাতি নিজ লোপ, কোনল লালা। বহুকা অবলাধ হট্যা থাকার পর বাটিতে মুন্বই বেদনা। কটিঃ জুল-তা, প্রতি বৃদ্ধি। কেকদণ্ডের অভিশঃ স্পান্তভ্রতা। তী রে ভ্রতা ও লাভা। আতশ্র প্রকাতা ও ক্রিয়া।

ন্যা তি সকা। – সমক্ষরণাত্র ব্যাপেয়া কটিতে কলবৎ বেদনা। কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শুহয়া থাকিতে পারা যায়। তের্গুণণ্ডের এবং ত্রীবার উপর হইতে নীচ প্যাপ্ত ফাতবৎ ব্যাপিত্তা।

কালী মিউর ৩× ।—ফিংম ফদে উপকার না দশিলে ৩ৎপর ব্যবহার্যা।

কালী হাল্স ০ x :— বেদনায় থেঁ:ড়াইয়া ই:টিতে হয়। আত্তে আতে হাটিলে ক্রমশঃ বেদনা ও হুল্লভার অনেকটা উপশ্য। বেশী হাঁটিশে বৃদ্ধি। প্রথম মঞ্চলনকালে বেদনার বৃদ্ধি। (বেদনা এইবা)।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) এক বাক্তির প্রবল মুইবং পৃষ্ঠবেদনা ছিল। এই বেদনা সময়
ক্ষমন্ন কেবল পূর্ব্বাস্থেই উপন্থিত ২০০, আবাব সময় সময় সাবারাত্রিও ভোগ
করিত। কাল কারবার কালে ১ স্তকের উপরে হাত তুলিতে পার্হিত
না। সবলো নড়া চড়া কারলে ও দল্পপের নিকের কাল কারবার কালে
তানেকটা উপন্ম বোধ কারত। ইাল চেয়ারে ওইয়া থাকিবার কালেও
উপন্য বোধ হইত। উপরের দিকে তাঁকাহবার কালে ঘাড়ে আড়ুইবং
(stiffness) বে ধ হইত। ছুই সন্তাহ একদিন রাত্রে কালে-ফোর
২২ × এক মাত্রা ও পর্যাদন রাত্রে নেট্রান-মেটর ও০ × একমাত্রা, এইরূপ
গ্রেহের বারে এই ইই উন্ধ প্রয়ায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়। ২০০ ম ত্রা ঔবধ
সেবনের পরহ বোগী ভাল বোধ কারতে থাকে; কয়েক সন্তাহের মধ্যেই
বনায়ী সম্পুণ্রাণে আবোগ্য হয়।

Bites of Insects-বাইটস্ অব-ইনসেক্টস, কীটাদির হুল-বেধ।

(সংক্রপ্ত 'চকিৎসা)

নেত্রি মিতির তে × 1— মাত্রেরক ও বাহিক। যত বিদ্রার সম্ভব এই উধধো লোশন (িয় ক্রম) দুংট্র হানে প্রয়োশ করিবে স্থাবা শুদ্ধ হিচুর্গ উক্ত স্থানে মদন করিবে। হহাতে অতি সত্তর বেদনা দ্রীকৃত হয়। নিয়ক্ষের উষ্বিও ফলপ্রদ। এই উষ্ধ ব্যবহারে আমরা স্বপ্রকার বিষ্যাক্ত শীটের হুলবেধেই ফল পাইয়াছি।

Bones Diseases of-বোনস্ ডিজিজেস্ অব : অস্থির রোগ।

(भर कश जिक्शा)

আ্রাপ-ফ্রনা—স্পাইনা ভেনটোসা। ক্যাল্প-ফ্রেরে সহ প্র্যাস

কার ফ্রান্ত — অন্তির কোমগতা ও ওর্বন্ত, <u>অন্তি থে</u> ইংগ্রাব্দার করিলে সম্বর জোড়া লাগে। তিকেটদ, মেরদ্রের ব্রুতা ইত্যাদি। <u>অন্তি দোগ লাগা।</u>

সিকি শিলা। — প্রায় সকল প্রকার অভিন বোগেই সিলিনিয়া
ব্যবস্ত হইয়া থাকে। অস্থি-সত ইউতে গাঢ়, গীতবর্ণ ওর্গন গুলার
আব ইংকি প্রেয়াগ লক্ষণ। উক্ষ সহিল রোগ। সকল প্রকার আবেরত
অভিশয় ওর্গন। অবিতে দাস লাগিলে ইংন হারা উংক্ট ফল পাওয়া
ব্যি। অহিল বেনি অংশ নই ইইলে ইংল বিহা বেনি উহা বাধির ইইরা নার।

কার্ম ক্রোক্র।—অহিংইতে নিংস্ত প্রাণ অহির উপর কঠিন,
কর্ম আবরণ উৎপন্ন করিলে। উপদ্ধে ও পারদের ফলে অহি আনার
হলৈ। প্রতিশাহিক রোগে নাসাপ্তি আক্রমণ কলিও উচাতে
অভিশয় হুর্গন্ধ পাকিলে। অফ্রি টিটুমার। অভিময় বিশ্বনি। আপ্র

ব্যাক্ত সালা — এই ঔষধের প্রাকৃতিসিদ্ধা শক্ষণ বিদ্যামান থাকিলে অস্থি-ক্ষতে ব্যবহার্য্য। মন্ত কান্থির শ্রতি।।

হৈছর ফস: — অন্থির রোগে, কোমলাংশের প্রদাহ, উত্তপ্ততা ক বেদনা থাকিলে। <u>উরুদ্ধির থোগে ইহা প্রধান ঔষণ।</u> অন্থির ও ৯থি-বেষ্টের প্রদাহ। কালী মিউব্ল:—অভি ও মন্থিবেটের এদাকের বিতীয়াবস্থায়। কালৌ ফ্রুস।—হর্গন্ধি অভিসার সহ অন্থির শীর্ণতা।

লেট্রাম সাল হো ।— সাইকোসিস। অন্তি বেদনা; সন্ধিতে বড় কড় শক; সন্ধির হন্ধা।

ন্যাট সলা - মাধক ধাতু; ছাত্তি বেদনা, সন্ধির বিদরণ; জাতুব আড়প্টতা।

(চিকিৎসিত রোগী)

(> একটা বালিব। ৫ বংসর বংগ্রেম কালেও ইনটিতে বা মাথা সোজা করিতে সমর্থ ইইয়াছিল না। মস্তবের অহির অসংযোজনা ছিল। প্রায় প্রত্যুহ্ট আক্ষেপ বা স্প্রাজ্য মজানত। অত্র অবস্থা দেখিরা ৫ মাসের দিশুর অন্তি অপেকা বেশী পুরু ব'লয়া মনে হইছনা। ক্যাল্ক কর্ম ও ক্যালীক্স এই এটা উষ্প গ্রাগ্রেক্সে ক্তিপ্র মাস বাবহার করায় বালিকাটার অবস্থার এত উহ্নতি হইয়াছল যে, তহোর শিতামাতা চিকিৎসককে কি বলিরা ধ্যাণাদ দিকেন সে ভাষা খুল্লিয়া পাইলেন না। ক্তি তংপর ভাষার স্থানাছরে চলিয়া যাভয়ার এই রোগীর আরে কোল সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(২) ১৮ মাদের একটা শিশুব আরুতি খুব ছোট ও হাড়ের বিধানের (উপাদান পদার্থ) নু'নতা ছিল। ৪টা গ্রীত আর দাত উঠে নাই, এক প'-ও হাঁটিতে পারিত না। মস্করের দিয়ি সংযোজক স্থল বিমুক্ত ছিল। মুধের পাণ্ডুরতা ও লার্থক প্রকৃতি ছিল। প্রতাহ জলের সহিত কাংল-ফস ও কালীফস দেওয়া যায়। প্রথম ঔষধ সেবনের কাল হইতে এই মাস পর জানা গেল শিশুটির ১১টা দাঁত উঠিয়াছে, মস্ক্রেকর বিমুক্ত

শ্বাস্থি সকল সংযোজিত হইয়াছে এবং এখন সে হাঁটিতে পারে। দীত উঠিবার কালে শিশুদের সচবাচব যে সকল উনদ্রা উপস্থিত হইমা থাকে এই শিশুর তাহা কিছুই হইয়াছিল না। যে কেচ পরে শিশুটীকে দেখিত সেই তাহার চিকিৎনার এরাশ আক্টায় ফল সম্বাদ্ধে মস্তায় প্রকাশ করিত।

- (৩) ১৪ বংসব বয়স্কা একটা পিতৃন'তৃহানা বাণিকা সনেক দিন যাবৎ পায়ের বোগে ভূগিতে ছল ও চিকিৎনিত হইয় আসেতোছল। চিকিৎনক-গণ কোন প্রকার চিকিৎনগ্রহ ফল না পাইয়া অবশ্যে ছির করিলেন যে পা-খানি কটিয়া ফেলিতে হহবে। ইসতে হাহার আগ্রীমাণ বিশেষ আহাজহ হইয়া ভিকিৎসাপ্রণালী পারবন্তন করিছে ছির করিলেন ও বাই ওকেনিক মতে চিকিৎসা করা সাল্যেন্ত কারলেন। প্রতি ঘণ্টার ১ মাত্রা সিলিশিয়া ৩০ × দৃতৃতার সহিত সেবন ও হহার লোশনসিক্ত লিণ্টা রোগাক্রান্ত ছানে প্রনাণ করা হয়। হম দিন হাড়েণ ও ক্ষতের অবস্থাব এই উল্লিখ্য গোল সেই প্রানি কাটিয়া ফোলতে হাবে এ আশক্ষা আর বহিল না। ইফার পর আরহ কিছু'দন কেবল এই উর্ণিই প্রয়োগ করা হয়, হাহাতে রোগিলা সম্পুনিরণে আর্রোগালাত করে।
- (৪) ৬০ বংশর ব্যক্ত ছবৈক গুলোব প্রের ফিনার" নামক দার্ঘ অস্থি
 ভাঙ্গিয়া যায়। িশ্ব সতক তা অবক্ষন করা সংখ্যেও উহা জোড়া লাগে
 নাত। বাহওকেনিক মতে চাবংশকালে প্রথম প্রথম প্রাত্ত রাত্তে ১
 মাত্রা ক্ষিয়া ক্যাল্ড-ফন ও পরে ১ দিন পা ১ দিন রাত্রে হহা দেওয়া
 যার। হহাতে অতি সন্ধা হাও জোড়া লাগে। ইহার ১০ মান পর এহ
 রোগীর ঐ হাজের নিম্নদেশ আবার ভাঙ্গিয়া যায়। তথনও এই ঔষধ
 সেবনে হই মাসেই উহা জোড়া লাগে।
- (৫) ছইটা রোগীর হাড়ে টি ট্যার জ্ঞা। দে.পর শ্রেট সার্জনগণ অন্ত করা সাব্যস্ত ববেন। কিন্তু ক্যাল্ব-ফ্রোল ১২× ব্যব্হার করার

উভয়েই ভাল হয়। ঔষণ সেবনের পর অল্প কাল মধ্যেই বেদনা ও টিউমার গ্রহ-চ কমিতে থাকে

- (৬) গ্রন্থারের তৃতীয় পুত্র শীনান্ রবীক্র সুন যাইবার সম।

 একখানা ঘেড়ার গাড়ীব নীচে পড়িয় যায় এবং উহার ফলে একখানি
 পানেব 'নিবিয়া'' হাড়খানে ভাজিনা ছুই টুক্ডা হয়। তৎকলাৎ
 হাসপাতালে নিয়া ভগ্ন অস্ত সংযোজন করাহনা প্রাতে ও বৈকালে
 ক্যান্ত্রিস ১২× দেওয়া হয়। ইংতে আত স্থব ভগ্ন আছে
 ভোড়া লাগে।
- ্দ) চাকা জিলাব জন্তগত কলা তথা এম নিধানী জনৈক ড'কাবের (সাব্এপিন্টাট দাজ্ন) এক পুরের মন্তকর অভি নালাকার হটাতে কুম্পঃ বুজি প্রাপ্ত হটাতে ত্রুতা একলা পিরামিটো শাকাব ধারণ কানতে থাকে। একটা নারিকেলের মংলার (মালই) কুজ পুঙ উদ্ধৃ দেকে রাথিলে যেরপ দেখাণ, বাংকটার মন্ত.কর শীর্ষ ভাগে ঠিক সেহরূপই দেখাহত। বোগীর পিতা স্বাং একজন ডাক্তার, স্থারাং এলোপ্যাাণক মটে চিকিৎসার কোনও ক্রেটিই হল নাই। ঢাকার যাবভীয় সাজ্জন ও সিভেল সাজ্জনকে এই বোল। দেখান হুইয়াছিল এবং চিকেৎসাও হুইতেছিল। এই স্ব বিদ্ল হুইলে, নোগীর পিতা পূকোক ড কাব মগাণ্য ছেলেটাকে লগ্ধা কলিকাতা যান এবং তথাকাব মে'ডক্যাল বোর্ডের স্থাবক্ত চিকিৎস্ক্রদিগকে দেশান। এই রোগীর মস্তকের আহু স্বাভাবিক আকার ধারণ করিবে বা কারতে পারে একথা কেহট বলেন নাই। অবশেষে, ৰ্থন ছেলেটার বয়স অনুমান ১৮'১৯ বংশর, ত্যন এফদিন অপ্র একজন ডাক্তারের মুখে গ্রন্থকারের চিকিৎসা প্রণানীর কথা শুনিয়া এবং বাইওকেমিক মতে গ্রন্থ কাতক গুলি টিউনাবের রোগীব ও

অন্তি রোগের রোগীর আরোগের সংবাদ শুনিয়া পূর্ব্বেক্ত ডাক্তার মহাশয় তদীয় ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া গ্রন্থকারকে দেখান। রোগী দেখিয়াই বলা হয় যে, বাইওকেনিক চিকিৎসায় রোগীর মন্তকের অন্তি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক আকার ধারণ করিবে। এই রোগীকে ক্যাক্তকে ১২ × এবং কাল্ল-ফ্রোর ৬ × , ৪ ট্যাবলেট মাত্রায় দিনে পর্যায়ক্তকে ৬ বার থাইবার বিধি দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাক্তকের ছল হার থাইবার বিধি দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাক্তকের ছল চাঁচিয়া মন্তকের চুল চাঁচিয়া মন্তকের লাগাইতেও উপদেশ দেওয়া য়য়। ০ মাস পরে বাহির হইতে দেখিলে রোগার মন্তকের অন্তিব অস্বাভাবিকত্ব কিছুই বোধ হইত না। আরও একমানকাল পুরেলকে ঔষধ পুরেরই লায় ব্যবহার করায় রোগার মন্তকারি সভাবিক আকার ধাবণ করে। ইছা দেখিয়া সকলেই অবাক্ত হয়া যান এবং বাওওকামক চিকিৎসার স্ব্ব্যাহিত করেন।

Brain Diseases—ব্ৰেইন ডিভিজেস

মস্তিকের রোগ।

(সংক্ষিত্ত চিকিৎসা)

কালী-কলা — সায়র লুপু শক্তিব পুনরুদারার্থ। অভিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম হল্ত মহিছের অবসরতা ও তৎসহ ক্ষাণীনতা, বিষয়তা, ক্লাগিতা, অসহিফুণ্ডা এবং স্থৃতিক্ষীণ্ডা ও নিজাগীনতা। মন্তিকের কোমল্ভার কালী-মিউরের সহিত এবং জল সঞ্চয়ে কাল্ড-ফ্লের সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে। স্নায়বিক দৌর্বল্য। মস্তকে আঘাত লাগার কৃফল দুরীকংলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔবধ। তন্ত্রালুতা ও স্থানিদা।

হিন্দ্রকার — মেনিজাইটিস, ব্রেইন ফিণার প্রভৃতি মন্তিক্ষের প্রোদাহিক রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর এবং তাপ ক্যাইবার নিমিশ্র ইহা বাবস্থাত হয়।

ব্চাকি ফস।—মহিক্ষের ত্র্লিডা; সুখমওলের পাণ্ডুরতা ও শার্লিডা, হস্ত-পদের শাত্রতা, শ্বেশতা, নৈশ-ল্ডা, জনন-শক্তির অভাব; মস্তকে জল সঞ্জা, মস্তকান্তির অসংযোজন;

ন্যা উ- মি ভিরা—নিকংসাটিতা, নিদ্য়কর চিম্বা, প্রত্যেক বস্তুরই মন্দিক দশন, সংজ্ঞ ভশ্রমাব ও অবসঃতা। নিজ্বিজ্করিয়া প্রশাপ বাক্থাবলা।

ন্যাক্তি-স্কুলা – মন্তকের উপঘাছের পর মন্তিক্ষের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য। মন্তকেব পশ্চাদেশে প্রবল বেদ্যা।

ম্যাসা-ফা-সা।—মন্তকের রোগে আকোপক লক্ষণ বিশ্বমান থাকিলে। মন্তকে আঘাত লাগার পর দৃষ্টি শক্তির লাবন।

ক্যান্ধ-ফ্রোব্র।—মন্তকের অভিতে টিউমাব। রক্তগুলা।
(মেনিঞাইটিস দ্রষ্টব্য)।

(চিকিৎসিত রোগা)।

(১) ভনৈক হিদাব রক্ষকের অভিারক্ত থাটু ন খাটতে ইইত। ইহাতে ভাষার মন্তিক্ষের নানারূপ উপদ্রব উপস্থিত হয়। রাত্রে ঘুম ইইত না, স্মৃতি শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত এবং শরীরও অত্যন্ত ওবলৈ ইইয়া পড়িয়াছিল। এই জা সে চাকুরি ছাড়িরা দিতে বাধ্য হয়। তাহার নিকট কেই গেলে

ভাহার ভাহা ভাল লাগিত না, খাইতে পারিত না, সকল বিষয়ই ভাহার বিরক্তি উল্পাদন কারত। ভাগার Brain Fever হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল: স্থান পারবত্তন এবং ক্যাণী-ফ্স ৩× ব্যবহারে রোগী মন্পূর্ণবাস আরোগ্য লাভ কবে।

- (২) ভনৈক অধিক বাস্ক ব্যক্তি বছদিনস্থায়া মন্তিক্ষেব প্রদাহ লোগে ভূণেন ও পরে আন্তে আন্তে আন্তে আরোগোর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু এই সময় হইতে তাহ্রে মন্তিক্ষেণ পোমলভার লক্ষণ প্রকাশ পাছতে থাকে। এই ক্ষণ তিনি অস্থান্ত উবধ ত্যাগ করিয়া এই ক্ষপ্রবৃত্তিত বাইওকেমিক ঔষণ পরীক্ষা কবিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হন। বন্তমান লক্ষণঃ—বাক্শ ক্রির বাতিক্রম, সময় সময় সংজ্ঞালোপ; ভ,হার উপর দিলা গাড়ী ঘেন্ডা ইত্যাদি চলিয়া ষাহ্বার উপক্রম হইনেও ভাড়াতাভি সরিয়া ঘাইতে, ক্ষথবা হাত্রিয়া ঘাইবার কালে সম্মুথে কোন বাধা থাকিলে হঠাৎ থামেতে অক্রমতা ইত্যাদি। এইন্ত ত'হাকে একাকী বাহিরে ঘানতে দেওয়া নিরাপদ ছিল না। ক্যালান্স ০ × ব্যবহারে এই রোগী আরোগ্য লাভ করে।
- (২) সংবশ্ব কালে ক্রেলে বেশে এবং মণিছে। ও সমূব চবর্শভার কালা-ক্র ব্যবহার কালে স্বলাভার চমৎকার ফল পাওনা গিয়াছে। ভ'ত ও ছাত্রীগণের স্মৃতি শক্তির ক্লাণভার ইহা অমোঘ উষর রূপে ব্যবহার ইহাছে।

Brain Fag-বেইন ফ্যাগ।

(মস্তিক্ষের অবসহতা)

ক্সাক্ষাক্ষাক্ষা ১২ × ।— সাধানক দৌকাল্য সহকারে নিকংসাহিত্য , প্রভৃত নৈশ ধর্ম , পাগু ব, শীর্ম, মুগাক্ষাত ; জন্ম-পান্তির অভাব, তুর্কলিতা বশতঃ হস্ত-পদেব শীত্রতা, নিজ্গ্রীনতা, কুণাহীনতা ও অবশ্রুমুহন।

সৈলিশিহাত × 1—কোন বিষয়ে মন । হর রাণতে পারা যায়না। আত্দর উংগ্রা। পান্তে বা কিনিতে আহণ্য কাঞ্চিবোদ, চিন্তা কাতে আহুপ্রি। অভিশয় তুল্লভাল্ভন, বোগা ট্রিয়া কার্যা প্রের হয়, কিন্দু শীঘুট ক্লান্ড হট্যা আনোচা বিশ্বাম ক্লিডে বাধা হয়।

কালী ফাস শ X. ৮X, ০০ X I—সাধারক শবির পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থ। মাস্ক ও সামারক ক্রেণ্ডাজনিত সকল প্রাণা উপস্থোর ইহা প্রধান উম্ধা

ন্যাউমিউর — ক্রিটান মচলার বিয়া দ বিষয়ে ভবিষ্য গী বথা বলিবার পর আজ্শয় হলেন্তা।

আপি হ্নতন — সারপকার কিবিজিনির কর্থাৎ সায়বিক দৌর্বলো সায়শূলের ভায় চিড়কমান বেদনা, কম্পন ও থবলতা থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১) জনৈক সালি থক আত্রিক্ত মতিকো প্রিলার ফলে শারীরিক ও মান দিক অতিশয় গুকাল চইয়া পড়েন। তাঁহার চিন্তা করিবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পাইয়াছিল। ব্যালী-ক্ষম ৩× ব্যবহার ব্যিবার ভল্লকাল পরেই উল্হার যাবহায় উপদ্বের শান্তি জন্মে।

२०७ वांडे अरक्षिक हिकि ६ मा- अप्तर्भिका।

(২) ১৬ বংশর বয়য়। একটা ছাত্রী অভিরিক্ত অধায়নের কংশ অভিশয় ক্রান্ত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পড়িলেই আবার কভক্ষণ বিশ্রাম করিছে হইত, বায়াম কালেও পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিবার আবশুক হইত। পরিকারে রূপে কোনও বিষয় চিন্তা করিছে পারিত না। চিন্তনীয় কোন বিষয় আসিলেই প্রমাদ গণিত। কোন বিষয় মুখয় বলিতে গেলে গোলমাল হইয়া পড়ত। কেননা সে চিন্তনীয় বিয়য় শুল একত্র করিতে পারিত না। শরীর অভিশয় শার্ব ও ছবল হইয়া পড়িয়াছিল। অবয়য়ন ত্যাগ করিয়া স্থান প্রিক্তিনের উপদেশ দিয়া সিলিশিয়া ৬×, ৪ বঁটো অয়য় এক স্পাহ প্রস্তুর বাহার করিতে দেওয়া যায়। পরে ১ সপ্রাহ্ বাদ দিয়া আবার পুনের তার ১ সপ্রাহ এই ওার থাইতে বলা হয়। কতক্দিন পর ভাহার যাবতীয় লক্ষণ উপশ্যিত হয় ও সে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হইতে বাগ্র হয়

Bright's Disease-ৰাইট্য ডিজিজ

ত্রাইটাখ্য রোগ

ইথা মৃত্ত-গ্রন্থির (কিড্নি) বিধানবিকারজনিত এক প্রকার রোগ।
মৃত্রপ্রাবের স্বল্লতা হেড় দীঘ্র দীঘ্র সংবাজীন শোপ, চর্বাগতা ও রক্তগীনতা
লক্ষণ প্রকাশ পার। মৃত্রে অওলালের (এবুমেন) বিভয়ানতা এই
রোগের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

(সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা)

কাল্ক-ফস ৬ × এবং কালী-ফনই এই বোগের প্রধান ওবধ। লক্ষণের
সাদৃশ্র থাকিলে ক্যাট-মিউর, ক্রাট-ফন, অথবা ফির-ফসেরও প্রয়োজন হইতে
পারে। ক্যাল্ক-ফস ৬ × ক্রম ব্যাহার করাতেই অবিকাংশ গোগীব ফল
দর্শে। ইহাতে কোন ফল না পাইলে ৩০ × ক্রম ব্যবহার করিলোনিশ্চরই
ফল দর্শিবে। এই ক্রমও বার্থ হইলে ২০০ × ক্রম ব্যবহার করিবে।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) স্ব'লে টিনার পরবর্তা তুইটা ব্র'ইটস্ ডি জিজের রোগী পাওয়া যায়। মূত্র পরীক্ষার Tube Casts এবং এলুমেন পাওয়া যায়। সকাঙ্গীন শোণ, হৃদ্পিভের এবং রেটিনার প্রদ:> ও (Retinitis) বিজ্ঞান ছিল। রোগীর শরীরের বৈধ নিক বিনাশ এবং উপত্ব তালত দেখা যাওয়ায় ক্যাল্র-ফ্য ৬× বাবস্তা করা যায়। ইহাতে শীঘ্রই তুই বোগীই আরোগ্য লাভ করে। এই রেংগে ক্যাল্র-ফ্য ব্যবহার করিয়া বহু রোগী আরোগ্য করা হইয়াছে।

Bronchitis-ৰক্ষাইটিস।

वायृ-नलौ-जूज अनार।

কুস-কুসের অভ্যন্তরন্থ বয়ুগাহী নলের শ্রৈত্মিক ঝ্রিলীর প্রদাহকে বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ বা ত্রন্থাইটিস বলে। সার্দ্ধ রোগে কেবল নাসিকা ও গলার শ্রৈত্মিক ঝিলী আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রদাহ অধিক বিস্তুত হইয়া স্কুত্র ক্রেল বাপ্তি হইয়া পড়িলে হস্তে প্রেল্পা দ্বারা উহা সম্পূর্ণক্রপে

অবরুদ্ধ ইইয়া পড়ে। কাজেই খাসরুদ্ধ ইইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। প্রথমতঃ তালেন্তা ও মালাধনা, তৎপর ক্রমে জ্বরুলাব, ব্লঃগুলে আকৃঞ্জন অনুভব, ক্রেলাধা খাস-প্রখাস, গলার ছিত্ব হিস্ হিস শক, প্রথমে শুদ্ধ কাসে পরে আঠার কায় ফোলিল কথন কথন বা হক্তামশ্রিত শ্লেমাবিশিন্ত, অবলেধে গড় ইবিলালে ও পূম্বং শ্লেমা প্রাব সংযুক্ত কাসে ইহার লক্ষ্য তালায় ছড় ঘড় শক্ষ, খাসলোধ ভঞ্জন, শীলল ঘণ্ডার ব, শুদ্ধ কলিশ্বর ভিছ্বা ও শ্রেমাবিশিন্ত কলেন্দ্র কলিশ্বর ভিছ্বা ও শিল্পার ভঙ্গ ভল্লা কলিল্যা এই লোক্ষি ভালা ক্রমাবিশিন্ত কলি হিন্দ্র কলিল্যার বিশিক্ত কলিল্যার বিশিক্ত কলি হিন্দ্র ভালা বিশেক্ত কলিল্যার ভিত্তা প্রায়িত বিশিক্ত কলিল্যার ভিত্তা প্রায়িত বিশিক্ত কলিল্যার ভিত্তা প্রায়িত বিশিক্ত কলিল্যার ভিত্তা প্রায়েত বিল্যালিল্যার ভিত্তা প্রায়েত বিশিক্ত কলিল্যার ভিত্তা প্রায়েত বিশ্বিক কলিল্যার বিশিক্ত কলিল্যার বিশিক্ত কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার কলিল্যার কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার কলিল্যার কলিল্যার বিশ্বর কলিল্যার কল

চিকিৎসা।

হেরহান ।— প্রারভাবের জন, প্রদাহ ও বেদনার উপশ্যাপ।
। জীবনের ১০ত জবে কোন উর্ধের সদৃশ্র দর্শিক ভাষার সাহত
প্রায়ক্রমে। শিশুদের ক্যাণিলারা ব্রশ্নাহটিলে ইহা বিশেষ উপকারী।

কাল্টি তি ব – দিটাগবভাষ প্রদাস হ্রাস পড়িলে ফর ফসের সাহত প্রয়ায়ক্রমে। গড়, খেল, ছপ্রেস ডিটাল, খেত অথবা ধুসরাত পেত শেপারত ভিহ্বা।

কালী সল্ফ :— তৃতীয় বা রোগের ক্লান্বস্থায়। প্রভুত, জলাৎ পীতাভ বা সব্ধাভ আঠা অঠা শ্লম ি গ্রীনে ইছার প্রয়োগ লম্মণ। এই অবস্থায় জর থাকিলে ইছাব সহিত প্রয়ায়ক্রমে ফিন্ফ্স ব্যবহার্যা।

সিলি হো — গড় গীতবর্গ, ভারী পূ্যময় শ্লেমা, এই শ্লেমা পাত্রের ভলদেশে ভূবিয়া হার। শীতল পানীয়ে কাসের বৃদ্ধি; উষ্ণভার উপন্য। ন্যাউ-মিউ হা i—পহিষ্কার, জনবং ও ফেণিগ শ্লেমা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট তরুণ রোগ। চক্ষু ও নাসিকা হইতে জলবং প্রাব সংযুক্ত "শীত কালীয়" কাসি। সমুদ্র হীরে যোগীর মন্দাবস্থা প্রাপ্তি।

বা অ-ফাস ।— এলু মিনঃস বা আওলালিক শ্লেম (জলবৎ নহে)।
বক্তাইন ব্যক্তিদেগের ব্রন্ধাইটিস।

ক্যাৰ-সল। —পূৰ্মঃ বা বক্তমিশ্ৰিত পূৰ্কে শ্লেগা!

লা'উ-জালা, —কা'সিনার সময় হ তদিয়া বুক চাপিয়া ধহিতে হয়;
বুকে ক্ষতবৎ বেদনা। কাসিতে কানিতে বির'ক্ত উৎপাদন করে।
অপরাক্টেশ্বাস-কাসের আবেশ। বর্যাবালেও অর্জিশীতল ঋতুতে বুজি।

পথ্যাপথ্য।—রোগের ভোগকালে তরল ও লঘু পর্যা দিবে।
রোগীর বৃক্ষে অধিক রক্ত সঞ্চিত না চইতে পারে এজন্ম সুণ বালিদে লয়ন
করিতে দেওয়া উচিত। বক্ষঃস্থলের (ফুসফুসের) সঞ্চিত রক্ত দূর করিবার
নিমন্ত সময়ে সময়ে বুকে মদিনার পেঃ তিশাদবে। বুকে আন্তে আন্তে
কিছুক্ষণ অলিভ অয়েল অর্থাৎ জলপাইয়ের তৈল মাথিলেও উপকার হয়।
আতশয় তুর্বলিতা থাকিলে মাংসের কাথ (যুস) দিবে।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) জনৈক মহিলা কণ্ডিপয় শীত ঋতুভেই ব্রন্ধাইটিস্রোগে আক্রান্ত ইইতেন। পরে একবার নিউনোনিয়া হয় ও উহা উৎকট আকার ধারণকরে। গোগিণীর স্বামী বাইওকেমিকমতে চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছুক হইয়া চিঠি ধারা গোগিণীর অবস্থা জানান ও কি ঔষধ ব্যবহার করিতে ইইবে জিজ্ঞাসা করেন। প্রতি ঘণ্টায় ১ মাত্রা করিয়া ফিরম্-ফস ও মুর্বলিভার জন্ত মধ্যে মধ্যে কালী-ফন প্রয়োগ করিতে বলা হয়। এই ছই ওঁষণ নিয়-মিতরপে কয়ে গদিন ব্যবহার কবিগা পরে পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফন ও ক্যানী-মিউর প্রয়োগ করা হয়। কিছুদিন পর রোগিণীর স্থানী ডাকযোগে চিঠি 'লখিয়া জানান যে, স্থানীয় চিকিৎসক বক্ষঃ পরীকা ক'রয়া বলিয়াছেন যে তঁহোর ব্রন্ধাইটিসের কোনও লক্ষণই পাওয়া যায় নাই।

(২) একবাক্তি লোহের কাংখানায় কাজ করিত ই হার পুরাতন লফ্টেটল রেগ ছিল। পরে নিউনোনিয়া হয়। অতাবিক অগ্নির উন্নের নিকট বসিয়া কাজ করার দক্ষণ প্রথম প্রভূত ঘর্ম আবে হয় ও গরে লাভ লাভ অক্সভব করিয়া দক্ষিণ লেল্লেগের প্রদানের (নিউনোনিয়া) কেণ প্রকাশ পায়। রোগার লক্ষণ বড় ভাগ ছিল না; সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণ প্রতিক্র লক্ষণও ছিল। জা খুব বেশী, বিংক্তিকর কাসি, দক্ষণ কুমের গভারতমপ্রদেশে বেকনা, ছক্তেনা, সাচা আঠা, মারচারবর্গ বিশষ্ট ক্রা ছিল। প্রথম হয়লী পর্যান্ত অন্ধি লক্ষ্টা অন্তর প্রায়িক্রমে ক্রিম-ক্ষণ গোলী-মিউর দেওয়া যায়। ছবলভা ও নিজাহান্তর জ্যু মধ্যে মধ্যে নি ম-ম-মিউর নের কাক্ষে ক্রেম হয় ইচাতে ১০ বিনের মধ্যেই লি মিপুর্বরূপে আরোগ্য হয় ক্রিয়া শত শত রোগী আরোগ্য করা হইয়াছে।

Burns and Scalds. বারণস এণ্ড স্ক্যালডস—অগ্নিদাহ।

(চিকিৎসা)

কালী-নিউর — শাভাস্তবিক ও বাহিক। এই ঔষধের লোশনে বস্থাও ভিজাইটা দগ্ধ স্থান আহোগা না হওগা পর্যান্ত ঢাকিয়া রাথিবে। নেকড়া গণ্ড না উঠাইয়া পুনঃ পুনঃ পুনঃ লোশন দ্বারা ভিজাইয়া দিবে। দগ্ধ স্থানে ফোজা। উন্ধা তেবল পদার্গ প্রিয়া ত্বন বালিয়া প্রেয়া উত্তা উত্তম ঔবন।

ক্যাক্তিক ক্লেক, — কালী- মিউর ব্যবগরের পর যাদ পূষ উৎপর ইটতে থাকে তবে ইগ বাবহার্য।

ন্য ভি-ফ্রন্স — দগ্ধ ক্ষতে পূথ জন্মিলে। বংহ্যিক প্রয়োগও উপকারী।

নেট্র মিউর —পুড়িগা ফে'ছ' উৎপর ১ইলে।

অন্তবা।—কোনও হান সামার বানসিয়া বা পুড়িয়া গেলে তংকলাৎ উক্ত হানে উত্তাপ দিবে। ইহাতে গ্রথমে জ্বালা কিছু ধর্মি ছ হুইলেও শীঘ্রই কমিয়া লাকে। কালী-মিউর ৩× বা ফিংম-ফ্স ৩× লোশন করিয়া অথবা ভোসলিন সহ লাগাইলেও বেশ ফল দর্শে। বহরের-লনী দগ্ধ স্থানে লাগানমাত্র জ্বানা যন্ত্রণা দৃঃ হুইয়া পাতে। দগ্ধ স্থানে সন্তর স্পিরিট লাগাইলে ফোজা পড়ে না। ক্ষত জ্বিলে খেত ধ্পের মলম লাগাইলে শীঘ্র শীঘ্র শুক্রী থাকে।

Cancer & Tumors

ক্যানসার ও অর্ব্বুদ।

ককটি রোগ, দূষিত অর্বনুদ।

ক্যান্সার এক প্রকার দূষিত অধ্বৃদ। ইং। ক্রমণঃ বর্দ্ধিত হয় এবং প্রথম প্রকাশের স্থান ১ইতে দূ: বড়ী স্থানেও বিস্তৃত ১ইয়া থাকে।

কাহ্রপ ত ক্রেক্রণ।—বে কোনও শরীর যথে এক প্রকার সৌত্রিক পদার্থ (Pibrous tisque) জমিনা ক্রমণঃ বৃদ্ধিত ইইতে থাকে।
উক্ত বর্ধন মধ্যে বহু প্রকারের অনংযুক্ত নিউল্লেখ্য দেল পাকে এবং
উহাও ক্রমণঃ বৃদ্ধিত ইইতে থাকে। ইহা দারা লিন্দ্রুটিক্ সিপ্তেম
আক্রান্ত ইইটা শরীরের নানা জানে এক প্রকার নূতন অর্কুদাদি উৎপর
হয়। পরিশেষে এই কর্মিদ শত জনো এবং ক্রমণঃ শরীর ছবল ইইতে
থাকে। এই রেগে ক্রমণঃ শরীরের শীর্ণিচা ও ছবলতা জনিয়া এবং
রক্ত সঞ্চলনের বিকৃতি জন্মাইরা শ্রীরেক ধ্বংশ করে। ইহা আহিশার
তরারোগ্য রোগা। এই বোগের কোন চিকিৎসা নাই বলিয়া সাধারণতঃ
কথিত ইইরা থাকে। কিন্তু রোগের প্রার্থ্য উপযুক্ত
হোমিওপ্যাপিক অথবা বাইওকেমিক ঔষণ প্রযুক্ত ইইলে বহু রোগী
আরোগ্য ইইরা থাকে। আমরাও ক্তিপ্র ক্যান্সান্তের রোগী আরোগ্য

নিম, আর্রভুমিতে বাস, কোন প্রকার আঘাত উ॰ঘাত দি প্রাপ্ত হওয়া, কোন প্রকার বুহুৎ আঁচিলে (moles) কৃষ্টিক দারা উত্তেজনা ভন্মান, প্রাতন অভীর্ণতা, শারীরিক ও স্থায়বিক মুর্বলিতা, স্থানিক টিশুর অপকৃষ্টতা ও উহাতে উত্তেজনা জন্মান তবং কুলদোষ এই রোগের প্রধান কারণ। পিতামাতার এই বোন থাকিলে, সন্থান সন্থতিতে প্রায়ই ইহা জন্মিয়া থাকে। ৪০ বংশবের পূর্বে এই রোগ খুবই কম ইইয়া থাকে এবং পুরুষ অপেকা স্থানিকর বেশী ইইয়া থাকে।

প্রকার ভেদে।—নিমে টিউমারের বিভিগন কান্দ ও প্রকারভেদের বিষম বণিত হল। যথাঃ—(১) মালেধিয়া প্রভৃতি রোগের
কলে উত্ত মক্তর্যানতা জনিত ক্রিংস্ (scirrhus)। এই প্রকার
কলকার স্ত্রীলোকদিগের স্তন এবং জংগ্রেড, স্ত্রীলোক এবং পুরুষ
উত্তরেই পাক্ত্রীতে, সংলাগের (rectum গুরুষ মুকে জন্মিয়া থাকে।
ইহা অভিশন্ন দৃদ্, অস্ত্রোপচার কারেলে ইনং নাল্মণি পারিদৃষ্ট ইইনা
থাকে।

- (২) কোড়লারি অথবা এন নিফোলবেরড, (Medullary or Encephaloid) ইলাখের অথবা গোহিতাভবর্ণের হইদা থাকে এবং অন্ত্রোপচার কারলে মন্তঞ্চের হাল জর সকল পরিদৃষ্ট হইদা থাকে। আহ, অপ্তকোষ, যক্ত্রং, প্লীহা, তুরকুস, মূত্র এবং মন্তিক ও চক্ষু ইলা ভারা আক্রান্ত হহদা থাকে। এই প্রধান ক্যান্তার মতার মতার মতার মহানান্তার মতার মতার মতার মহানান্তার মতার মতার মহানান্তার মহানান্তার মতার মতার মহানান্তার মহান্তার মহানান্তার মহান্তার মহানান্তার মহ
- (৩) কোলে হোড (Colloid)— হার ভিতরে মৃত বা গানের তাম কোমল পদার্থ থাকে। গ্রীবার পশ্চান্তাগ, পৃষ্ঠ, অন্তর, এবং পাকস্থনী প্রভৃতি স্থানে ইহা জন্ম
- (৪) প্রশিক্ষিক্রিকেন্ডেরেল (Epitholial —প্রথম ও বিতীয় প্রকারের রোগাপেকা ইহা অংগকারুত সংজ্ঞ সাধ্য এবং সাধারণতঃ পুরুষদিগের মধ্যেই ইহা দৃট হইয়া থাকে। চর্ম ও শৈক্ষিক বিল্লীর ংযোগ স্থলেই ইহা প্রথম প্রকাশ পাইয়া থাকে। চক্ষুর পাতা,

মুখের কোণ, গুহাদার (anus), স্ত্রী জননে দ্রিয় অর্থাৎ যোনি, পুংজননে দ্রিয়, অগুকোষ প্রভৃতি স্থানে ইহা ভ্রিয়া থাকে। চক্ষুর পাতায় এবং নিমেটে ইহা স্চরাচর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভিহ্বা, জরায়ু-মুখ (০৪) এবং স্বকেও (মুখমগুলে নামিকার পার্শ্বে) ইহা জনিয়া থাকে। জবায়ু ত ইইলে টিউমারটী ফুলকপির ভ্রায় আকার ধারণ করে। এই প্রকারের ক্যান্সার ভাগুকোবে জন্মিল ইহাকে "চমনা-মুইপার" ব্যান্সার আহ্যা দেওয়া হয়।

(৫) তাইতে (Ostoid)— অভিজে, বিশেষণঃ পদের 'ফিমার' নামক অন্থিব নিম্দেশে ইংা জ্বানা থাকে। ইংা জ্বীব ক্টপ্রদ এবং বিরল! এই টিউমাব অন্থির ক্যায় কঠিন হইয়া থাকে। ইংা অতীব ভ্রারোগ্য বোগ হইলেও বাইংকেমিক চিকিৎসায় অনেক সময় আবোগ্য হইয়া থাকে। যোগীর বয়স যদি বেনী না হয়, এবং রোগ যদি বেনী দিনেব না হয়, তবে ক্রিয়েই তারোগ্যের জানাকরা যাইতে পারে।

এখানে এই বিভিন্ন প্রবার রোগ সন্তব্যে আরও একটু আলোচনা করা যাউক। স্তানের কালের।—দাধারণতঃ ৩৫, ৬ে বংসর বংসের পর ইহা জন্মে। প্রের কোনও এক ক্ষুদ্র স্থানে স্ফাতিতা ও তাক্ষ বেদনা অন্তভূত হয়। পরে ক্রমণঃ সমগ্র হনই আক্রান্ত হয়। এই সমগ্র স্থানের বোটা স্কুচিত এবং সমগ্র শুন কঠিনাকার ধারণ করে এবং হানের গ্রন্থিজিলি শক্ত ও ফ্টাত হইগ্রা উঠে। তৎপর স্থান করে (নাpple) নিকট প্রথম ক্ষত করে এবং উহাতে অস্থ্য বেদনা জ্যো। সমগ্র সমগ্র ইহা হইতে প্রভূত রক্তরাবও হইগ্রা

প্রশিষ্টে বিলা

প্রতি হয়। ইহা সংক্রে জ বোগা ইইতে চায় না। ইহা হইতেও

রক্তরা হইগ থাকে, কিন্তু খুব কম। জুকের ব্যাক্সার। ইহাকে

বাসিনামা বা সার্কোমাও (Carcine ma or Sarcoma) বলা।

জাকর বে কোনও স্থানে প্রথমে একটা ক্ষুদ্র ও দুট্ ক্ষীতভা জন্ম।

ছট এক মাদ, অথবা আন্ত কিছু বেনী দিন এ অব্যায় থাকিয়া

কমা তীক্ষা ফুচবিদ্ধাব, ক্রম্বর জ্বা ছিয়বর (Cutting and tearing pain) কেনা ভ্রো। রোগাক্রাক্ত স্থানের জ্বের হিবল

জন্মে (অবিধাংশ স্থান নীনাভ বর্ণ ধারণ করে) এবং স্থানে স্থানের

ভিত্তিব ভারে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। এই প্রদাহের ফলে সার্বাইত
গ্রাইও ক্ষীত হইয়া উচ্চে এং উহাতে বেদনা জন্মে। পাবিশ্বে প্রদাহত

পাকস্তল র ক্যাজনার (Cancer of the Stomach)—পাকহলীতে ক্যাজার জানালে রোগীং শরার জত শীর্ণ হর্মা পড়ে এবং মজীর্ণতাও বিদ্যান থাকে। এই রোগে বোগার কে মিদ্রিত শ্রেমা মন হই য়া থাকে এবং পাকস্থাতে ভীবল জালাকর কেদনা তন্তুত হয়। পাজরার নিরে (Below the tibs) চাপ দিয়া পরীক্ষা কবিতে কঠিন মক্ত হত্তে অমুভ্র করা যায়।

তা শুকোর হা কালে হয়। ত্রা কালে কালের কা

জিহার ক্যান্সার।—িছ্বার মাঝামাঝি, কোনও এক পার্ষে প্রথম সামান্ত ক্ষতের উংপত্তি হয় এবং তথায় স্থিচি বিশ্ববং বা কর্তুনবৎ বেদনা অন্তভূত হয়। উপদংশ-দোষ অথবা ভগ্নত্তের থোঁচো লাগিয়া প্রথমতঃ ভিহ্বায় ক্ষত উৎপন্ন হট্যা থাকে এবং পরে ক্যান্সারে পরিপত্ত

জ্বান্ত্র কালোর।—প্রথন জরায়ু-মুনে কর জন্ম এবং খাতুর ব্যবধান কালে গুলা হিন্দ হক্তমি শ্রন্ত গুলবং হাবে নিঃস্ত গুলত পাকে। কর স্থানে অতান্ত জালা অনুভূত হয়। বোলিনী জনশ্রুত শীর্ণ ও গুলল হট্যা পড়েন। সাধান্ত ও ওবংসর ব্যবস্ব

(চিকিৎসা)

বজে ধাত্র পদার্থের অভাব হেতুই এই যোগ উৎশন্ন হইন্না থাকে। ব্যুবাং অগণ দৃষ্ট নিয়ে ক্র ভিন্ন । বহার করিতে পারিলে আবোগ্যের আশা করা যাইতে পাবে।

কালী-মিউর !—স্থান তুক্ন কালোকে (recent cases) ভানের অভান্ত স্পর্শায়ভালা অধাৎ স্পর্শ মহান্ত দেন। লক্ষ্যে তবং স্থানের শিরাভাল শক্ত না হটরা কোমল মন্ত্রুছ হইলে ৬× ক্রেম ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে।

কাল্পী-সালাহা। — শেল গ্রেমা। বৈশ্বিক বিল্লী ও ত্রকর
সংযোগ স্থার ত্রকর ক্যান্সরে পাত্রা গীতবর্ণ, জলের প্রায় অথবা
গ্যাক্ত প্রাব বিজ্ঞান থাকিলে এই উরধ অতিশয় ফলএদ।
ইহা প্রয়োগে জনৈক ডাক্তারের নাসিকার বাম পার্থের এপিথেলামা
আরোগা হয়। উহার চতুর্দিকের মলিন আরক্তা এবং উপরে শ্রের

ক্সায় কঠিন মামড়ি (scib) ছিল। এই ঔষণ প্রয়োগ কবিয়া বহু এশিগেলোমা আরোগা করা হইগ্নছে।

নেট্ৰ-নিউব্লা—ে গুল (ভিহৰ র নিয়ে এটপ্রধার অম্বর্জ অর্কাদ) রোগে ইয়া বিশেষ ফলপ্রদ।

কালৌ-ছাস।—অত্যন্ত বেদনা, বিবর্ণ এবং চর্গন্ধ শ্রাব সংযুক্ত ক্যান্সার। অন্ত্রোপচারের পর, আধোগ্যের প্রাক্তালে এই ঔষধ ব্যবহারে স্থান্য দর্শে (বিশেষভঃ যেরানে টিউমার কাটিয়া তুলিখা ফেলা হইয়াছে)।

বিদ্যান-কল্প — ব্যানাধ্য তংগত কেনাও অধ্যাজ্য উষ্ধের মহিত প্যাধিক্রমে ব্যবসার কারণে জুন্দ্র কল দর্শে। ভিহ্নার কান্দিধ্যেও ইয়া ব্যবসারে বিশেষ কল পাওয়া বিয়াছে।

স্থান্ত হৈ ।— ক্র'ণ উলাজ্য ধাতু । বোগীদের পদে । শেষ উপযোগী। হাউস্মেই দুল্লী । তরণ বা পুলাহন নিষ্টে (cyst) ইহাব আবগ্রক। ব্রহোগিল, গলগণ এবং নিষ্ট রোগে এবং সন্ধির থেছের (Buren ' পদাদে ইহার একান্ত পদোহন।

ক্ষানৌ-সালেফ।—াজ আৰ জনিত গীততা (serous swelling);

কিষ্টিল নিউমার। ঘটত অধ্যাকি মাংগরাজ (granulation);
আন্তাৰ আধিকা (excessive suppur tion).

শিশুদের মন্তকে। প্রন্ধ ক্ষিত্র ক্ষিত আছিব ক্ষিত প্রতিন্দা (knots, kernels, hardened glands in female breast): মেবো মিয়ান গ্রাছর (চকুর পাতার ক্রিড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাছ বিশেষ; meibomian glands) বিবৃদ্ধি। হত্তর অস্থির (jaw bone) উপর কঠিন ফীতভা

(swelling on the jaw bone): হাতের কজির পৃষ্ঠ দেশে এনদিষ্টেড্ টিউমার। গলগ্রন্থির এবং গ্রীবা-গ্রন্থির ফ্রীততা ও কঠিনতা। টেওন এবং লিগামেন্টের কঠিন ফ্রীততা। অন্থির অর্কুদ বা টিউমার ইত্যাদি।

সিলিশিহা — গ্রন্থির বিবৃদ্ধি; নিন্দেটক গ্ল্যাণ্ডের পুরাতন দ্বীতত ; স্থীততা বা টিউমারে পুযোৎপত্তির সম্ভাবনা। জরায়ুর ক্যানার; উপরের ওঠেব ও মুখমগুলের ক্যান্সার।

লেট্রাম-ম্ব্রস।—ভিহনার কালিকারে এই ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। গল-ওন্থির স্থীতভায় (ঘাগা) কল লকলের বিদানানভায়। এই বেংগে প্রস্তিকর । টিউমার দ্রাইবা। পথা শবস্তা কবিবে।

চিকিৎ্দিত রোগী।

(১) জনৈক ব্যক্তির নাসিকার দ্ধিণ দিকে, ঠিক চক্ষরনিম্ন অভান্তবহু কে'লের নিমে এপিথেলামা রোগ জান্ম। ইহার আকাব প্রায় ৯টা হ শিল্ছি এর মত ছিল। ইহা ইইতে চক্ষর নিম্ন পাতার নিকট দিরা চক্ষর অভান্তরে যে আব নিংক্ত হইত কাহা দ্বারা চক্ষর ক্রদাহ জ্বিয়াজে বলিয়া মনে হইয়াছিল। যাহাই হউক, বোলীর যজ'ভোইনাইটিয়াও কলিয়ার অপরিচ্ছেন্নতা ছিল। শাকার প্রান্ত দিয়া কওটা ৪ বংসর প্রান্ত কলিয়ার অপরিচ্ছেন্নতা কিবিৎ উচ্চ ও ক্ষাত এবটা হান ছিল। পরে উহা শ্লের ক্রায় উচ্চ একটা মামড়ি দ্বারা আবৃত হয়। বিছুদ্দন পর উহা প্রেয়া বায় ও একটা ক্ষত থাকে। এই ক্ষত জমে জমে বাঙ্ডিত থাকে। রোগের প্রারম্ভাবস্থা ইইতে এপর্যান্ত বহু চিকিৎস্ককে দেখান হয়। বোলের প্রারম্ভাবস্থা ইউতে এপর্যান্ত বহু চিকিৎস্ককে দেখান হয়। রোগের প্রারম্ভাবস্থা ইউতে এপর্যান্ত বহু চিকিৎস্ককে দেখান হয়। বোলের স্বারম্ভাবস্থা হিত্ত ও চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার্নকেও দেখান হয়; কিন্তু বিহু হয় নাই। অবশ্বের বাইওকেমিক মতে চিকিৎসায়

করান সাব্যস্ত হয়। প্রভাই প্রাত্তে ও র'ত্রে এক এক মাত্রা করিয়া ক্যালী-সশ্ব থাইতে দেওয়ায় ও উহার লোশন ব্যবহার করায় ক্যেক দিনের মধ্যেই প্রদাহ দূব হয়। পরে দৃঢ়তার সহিত কতক দিন এই ঔষধ ব্যবহার করায় ক্ষত ক্রমশঃ ছারোগ্য হইতে থাকে ও পরিশেষে একেবারে শুষ্ক ইইটা গিয়া একটা দগে মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

- (২) ১৯ বৎসব বয়স্ক এক ব্যক্তির ক্যান্সার হইতে অধিক পরিমাণ বক্তুআৰ হই ছ। এলোপ্য'শিক মতে রক্তস্তাব নিবারণের কোনও ওঁবধর পরীক্ষা করিয়া দে'থতে বাকী ছিল।। অবশেষে কিরম-ফ্সের লোশনে স্পঞ্জ ডুবাইয়া ক্ষতের উপর প্রোণ করায় ইহা নিবারিত হইয়াছিল।
- (৩) চাবার সব্ ডেপুটা নিং ভি. এম, বানাজিক মহোদয়ের দক্ষিণ ইন্তের বণুইয়ে একটা এশিপেলোমা জন্ম। এক মাসের মধ্যেই উঠা ১টা ডিমেব আকার ধারণ করে। স্থানীয় প্রধান সাজ্জনকৈ দেখান হয়। তিনি রোগীর পিতার ক্যান্সার বোগে মৃত্যু হইয়াছিল জানিয়া সম্বব (তাঁহাকে দেখাইবার পর দিনই , জন্তু করিবেন সাবাস্ত করেন। কিন্তু নানা বিষয় চিম্বা বেগ্রী বাই ওকেমিক মতেই চিকিৎসা করাইবেন স্থির করেন। ইথা শুনিয়া সার্জ্জন বলেন যে, যদি এই হোগী এই চিকিৎসায় ভারোগ্য হন তবে তিনা তাঁথার এলোপ্যাথিক 'চকিৎসা পরিন্যাণ করিবেন। যাথা হউক, কালী-সন্ফ ৮ × ও কা জ্ব ফ্স ৬ × দিনে প্র্যায়ক্রমে ওবার সেবন ও কালী সলফের মলম দিনে ৪০ বার স্থানিক প্রয়োগ করার ১মাস মধ্যেই বেগা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। বলা বাহুলা, উক্ত সার্জন তাঁহার কথা রক্ষা করেন নাই।
- (৪) ৭ বৎদর বয়স্কা জনৈক রম্পীর ডান দিকের গালে একটা এপি-থেলোমা জন্মে। চক্ষুর নীচের পাতা হইতে নাসিকার ছিদ্র পর্যান্ত উহা িস্তুত ছিল ইহার আক্বতি প্রায় গোলাকার ও ১টা ফ্লোরিণের মত ছিল

এলিথেলামাটী কয়েক বৎসর থাকিয়া পরে ক্ষতে পরিণত হইবার উপক্রম হব। ইহার ভূমিদেশ (Base) ও প্রান্ত শক্ত ছিল। ক্যাশী-সংফ ৬× এক এক মাত্রা প্রতি রাত্রে সেবন ও উহার লোশন দ্বারা লিণ্ট ভিজাইয়া শনঃ পুনঃ স্থানিক প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায়। একম্যে পব দেখা যায় যা অনেক শুকাইয়াছে। ইহার পর ও সপ্তাত মধ্যেই ক্ষতিটী সম্পূর্ণক্রপে শুদ্ধ হুইয়া যায়।

- (৫) ৬০ বংসর বয়য়া জনৈক ভদ্রমহিলার যাম হত্তের মধ্যমাসুনীর অগ্রভাগ ফুলিয়া কঠিনাকার ধারণ করে। ফীত স্থানে বেদনা, চাক্চিন্য এবং উহা দেখেতে দ্বিগণ্ডিত স্থপারির ভায় ছিল। রোগিণী
 অভান্ত সায়বীর প্রকৃতির (nervous) এবং নিরুৎসাহিত চিনেন।
 ক্যাক্-ফ্রোর ৬× বাবস্থা করা হয়। ঔষধ বাবগ্রের সঙ্গে সঙ্গেই ফল
 দর্শিতে থাকে। আড়াহ মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়।
- (৬) ২৫ বিনের একটা শিশুকে দেখিতে আহ্বান করা হয়।
 ভাষের পরক্ষণেই শিশুটার যাত্তকশীর্ষে একটা ফ্টা হতা (swelling)
 দুই হয় এবং জ্মশংটে উহা বাড়িতে থাকে। মন্তব্যের ধাম পার্ষে
 (on the left tuberosity of the parietal bone) উহা অবস্থিত
 ছিল। ক্টা তভাগ্র ভূমিদেশ দেড় ইঞ্চিন্ত উপর এবং উচ্চতা এক
 ইঞ্জির কিছু কম ছিল; চাপ প্রদানে মন্দার ডেগার ভাগ্ন ভূল্ভুলে
 বোধ হয় (doughy and not fluctuating) কিন্তু এক পার্ষে চাপ
 দিলে অপর দিকে সঞ্চালিত হয় নটে। যাত্রা সহিত প্যারাইট্যাল
 কান্থি থানি পরিক্ষা করায় উহার দোষ (defect) ধরা পড়ে; উহা
 হইতেই এই টিউনারটী উৎপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মন্তিক্ষের উপর
 (on the brain) এই টিউনারটীর চাপের কোনও লক্ষণ পরিদ্য হয়
 নাই; শিশুটীর ভাবণ ইঞ্ইয়াল হাণিয়া ও ছিল—এত্রাতীত শিশুটীর

স্বাস্থ্য ভালই ছিল। ক্যান্ধ-ফ্রন ৬× দিনে ৬ বার করিয়া থাওয়ার বিধি দেওয়া হয়। ৩ দিন মাত্র এই ঔাধ সেবনের পর টিউমারটী হ্রাস পাইতে থাকে, ১০ দিনের পর উহার চিহ্নও দেখা যায় নাই। অস্থ্রি অভ্যন্তরন্থ গহরর ক্রমশঃ পরিপুরিত হইতে থাকে এবং এই সপ্তাহের পর উহা সম্পূর্ণরূপেই ক্ষে হইদা যায়।

- (৭) মন্তকের দাক্ষণ প্যারাইটাল্ সন্থির উপরস্থ আরত অবসুদি (Sanguinous cyst) এবং ৩৭সহ মন্তক পৃষ্ঠের অস্থির আনংবোজন (open posterior fontanelle) ক্যাল্ক-ফ্স ২ ক্রেম ব্যবহার কার্য়া আব্যোগ্য করিয়াছেন বণিয়া ডাঃ র (Dr. Raue) উল্লেখ ক্রিয়াছেন।
- (৮) এক ব্যক্তির ইট্র অভান্তর প্রদেশে (in the hollow of the knee) ফাইব্রেয়েভ টিউমার উৎপন্ন হইলে, অস্ত্রোপ্চার বারা উহা তুলিয়া ফেলা হয়। কিন্তু তৎপর উহা পুনরার উৎপন্ন হল্য়া একটা বলের আকার ধারণ করে। ইহার ফলে ইট্র-সান্ধির চলৎ-শক্তি রাহত হয়। পুনরার অস্ত্র করা নিজ্যা চিপ্তা করিয়া বাইওকেনিক মতে চিকিৎসা করিয়া দেখিতে সকলে পরামর্শ দেন। লম্মণ দৃষ্টে ইহার আশ্চর্যা ক্ষমতাশালী ঔষধ ক্যান্ত ফ্লোর ৬× ৪ গ্রেণ মান্তার দিনে ৪ বার করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ইহার ফলে টিউমারটা ক্রমশং বিশীর্ণ হইতে পাকে (gradually dwindled) এবং পা খানি পরে স্বাজ্ঞাবক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।
- (৯) একটা যোগীর বাম নাসিকার অভ্যন্তরস্থ পলিপাস্ বা নাকড়া ক্যাল্ক-ফস ৬ × সেবনে বিদ্রিত হয়।
- (>•) গ্রন্থকারের ভনৈক আত্মীধের উভয় নাসার অভান্তরে নাকড়া জন্মিয়া ক্রমশ: বুদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময় নিদ্রিভাবস্থায় শ্বাস-

রোধের আবেশ উপস্থিত হওয়ায় তিনি উক্ত শব্দ করিয়া লাফাইয়া উঠিতেন। চিঠি মারফ্ড রোগীর অবস্থা বিদিত হইয়া ক্যাক্ষ ফ্ল ৬× এবং কাল্ল-ফ্লোর ৬× দিনে পর্যায়ক্রমে ৪ বার সেবনের উপদেশ দেওয়া যায়। কিছুদিন ঔষণ দেবনের ফলে সম্পূর্ণ আরোগা লাভ হয়।

(১১) এক ব্যক্তির উদ্ধ হন্ততে (superior maxillary) সার্কোমা (বেদনা ও প্রাণাহ শূতা দৃঢ় মাংদল অর্কুদ; মাংসার্কুদ sarcoma) উৎপন্ন হয়; এজন্ম গালে একটা ভেকের ন্যায় আক্লতি (frog like appearance of the cheek) উৎপন্ন হয়। রোগের বিকাশের পর এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করান হয়। ভাঁহারা টিইমারে পুষোৎপত্তি করিবার জন্স বহু প্রকারের উপায় অবশ্বন করেন। উহার ফলে টিউমারের করেক ভানে নালী ঘারের মত মুথ জনিয়া একপ্রকার পাতলা, স্বচ্ছ তুর্গন্ধি আব মাত্র নিংস্ত হঠতে থাকে, কিন্তু পুষ ভাষে নাই। তংপর বাহওকেমিক চিকিৎদা করান হয়।পুষ জ্মাইবার আশার প্রথমে সিলিশিয়। ৬× এই সপ্ত'হ পর্যাত্ত দেওরা হয়। ইহার करन हिडेमारतत मना नाहरन छहें। जनम ७ दस्त उत्तर उत्तर अला अला (two protuberances in the median line of the tumor), এত্যাতীত আর কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হয় না : তথন ক্যাক্ষেবিয়া-ফ্রোর ৬× বিনে ৩ বার করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে তৎপর দিন প্রভূত পুষ আৰ হইতে থাকে এবং রোগী বিশেষ উপশম বোধ করিতে থাকেন। এই ঔষধের এইরূপ দ্রুত ফল দেথিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। অতিসম্বরই এই রোগী আরোগ্য লাভ করেন।

(১২) জনৈক রমণীর স্তনের গ্রন্থি ফীত হইয়া উহাতে সংযুশ্লের স্থায় বেদনা জন্মে। উহা কঠিন অর্ব্যুদের স্থায় (scirrhus) বেণাইভ। ক্যান্ধ-ফ্রোর ৬× ব্যবহারে জ্রুত আবোগ্য জন্মে।

- (১৩) অপর একজনের চিবুকের নিমের কবৃত্রের ডিম্বের মত বড় একটা কঠিন অব্দ ক্যাল্ব-ফ্রোর ৬× ব্যবহারের ফলে সত্তর আরোগ্য হয়।
- (১৪) এক রমনীর হাঁটু সন্ধির প্রদাহে সন্ধি হইতে বার্সা (Bursa, চিবির জায় জিনিষ প্রত্যেক সন্ধিব ছইখানা হাড়ের মধ্যে ক্ষয় নিবারণের জন্ম এই পরার্থ ভগগান্ দিয়া স্থলন করিয়াছেন; ইজিন এবং যন্ত্রান্ধিতে ও এই উদ্দেশ্যে চিনি বা grease ব্যবহৃত ইইয়া থাকে) প্রাব হইতে থাকে। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ক্যন্ত্র-ক্ষপ ৬× দেওয়া হয়। ১২ ডোজ উষ্ব সেবনের কলে এই প্রাতন রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল এই রোগে ডাঃ স্থ্যাব ও এই উষ্ধের বিশেষ প্রশ্না করেন এবং সকলকে ব্যবহার করিতে উপ্দেশ
- (১৫) লালা ক্রিদে।—একটা দ্রীলোকের উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে কতকগুলি বটা বর্ণের অক্ষুদ (নাকড়া) জন্ম। ইহা হইতে সহজেই রক্তপ্রাব হইত। ইহাকে প্রত্যহ প্রাতে ১ ডোজ করিয়া এক সপ্তাহ কাল ক্যাক্তকে ৩০ দেওয়া হয়। ভূতীয় সপ্তাহে জানা যায় যে রোগ সম্পূর্ণরূপে অ বোগ্য হইয়াছে। বছ গুলি পভিয়াযা, ছোটগুলি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায় (absorb 1).
- (১৬) St. Bartholom 's Hospital । বালিকার অসুলি শক্তির অর্ব্রুদে অস্ত্রোপচার করা হয়। ঘা গুকাইলে গুফ দার্গের উপর (in the scar) পুনরায় উহা অপেকারত বহনাকা:। দেয়। এইক্ষণ প্রত্যাহ প্রাত্তে ও রাত্রে সিলিশিয়া ও ব্যবহার করার খীরে ধীরে টিউনারটা বিলীন হইরা যায় (John II. Clarke).

- (১৭) অঙ্গুলীর গভীর স্থানের প্রদাহ ৷- লওন হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে Gerard Smith চারি বংশর বয়স্কা এক বালিকাকে আনেন। তুই বংসর পুর্বের বালিকাটীর ভর্জনী অসুনীতে ক্ষত জন্মে। ইহার ফলে অসুনির অন্থিবেষ্টের প্রদাহ ও ন্ফোটক (periostitis and abscess) ভবো, কিন্তু অন্থিনাশের (necrosis) বা অন্তিতে দাগ লাগার কে'ন নিদর্শন পোত্রা যাষ নাই, কেননা প্রোব (probe) ব্যবহার করায় অস্তির কোন ভগ্নংশ আসে নাই। প্রদাহের পর প্রথম ৬ মাস কাল অন্থির ফীততা বুদ্ধি পাইতে পাইতে প্রায় গোলাকার (globular) ধারণ করে। এই সময় সিলিশিয়া ব্যবহার করিতে অরেন্ড করা হয়। একটু দীর্ঘকাল এই উন্ধ ব্যবহার করিতে থাকার আজে আত্তে অন্থির স্মীতত। কমিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। হিতীয় ২লাসে পুনরায় এবদেস জন্ম। এইক্ষণ অস্ত্রোপচার করিয়া পোব দিয়া প্রাকা করিলে উহা কোমল টিশুর অভ্যন্তরে গিয়া প্রবেশ করে (passed into a soft mass) এই সময় হিপার-সলফার এবং সিলিশিয়া ব্যবহার করায় ক্ষাত্ত। কমিয়া অনেকটা উপকার দশে বলিয়া উল্লেখিত ইইয়াছে। Drs Byres Moir & Epps অমুলি সন্ধির রোগে সিলিশিয়া, ক্যাল্ক-ফদ এবং ক্যাল্ক-ফ্রোর দারা বিশেষ ফল পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।
- (১৮) স্তন প্রতির পুরাতন কালিন স্ফীততা ২২ বংগর বয়স্থা এক রমণীর স্তনে ক্যান্সার উৎপর হইয়াছে, অতএব উহা সত্তর কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে বলিয়া জনৈক সার্জন মত প্রকাশ করায়, রমণী অত্যস্ত ঘাবড়াইয়া যান। রোগিণীর স্তনটী ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া এবং ভাঁহার কোলিক ইতিহাস প্রবণ কনিয়া রোগিণীকে বলা হয় যে, কেবল মাত্র ঔষধ সেবন করাইয়াই রোগিণীর

ন্তনের কাঠিয় ও যাবতীয় উপদর্গ নিদ্রিত করা ঘাইতে পারে। এই আরা দ্বাক্য শ্রুবল করিয়া ভৎক্ষণাৎ রোগিনী উপযুক্ত ব্যবস্থা করিছে অন্তরোধ জানাইলেন। ক্যাক্ষেরিয়া-ক্লোর ৩×; ৪ জাম ৪ আউক্ম জলে ওলিয়া এই লোশন হারা সকলো ক্ষীত স্থান ভিছাইয়া রাণিতে উপদেশ দেওয়া হয়। ৩× ক্রমের ৩টী করিয়া ট্যাবলেট প্রাতি ৩ ঘণ্টাত্তর থাইবারও ব্যবস্থা দেওয়া য়ায়। এক সভাহ কাল মাত্র এই প্রকারে উব্ধ দেবন ও স্থানিক প্ররোগ্যের ফলে ক্ষীততা বার আনা কমিয়া য়ায়। এইক্ষণ গোগিনী ব্রিতে পাবেন যে তিনি নিশ্চয়ই আবোগ্য হইবেন। ৬ সপ্তাহে রোগিনী সম্পূর্ণকপে আরোগ্য লাভ করেন।

- (১৯) পূর্বোক্ত রোগির আর এক আত্মারার (৪২ বংসর বয়দা)
 দক্ষিণ স্থনটা ৩৪ বংসর যাবং স্ফুটি ও শক্ত হইরা ক্রমণঃই বদ্ধিত
 হইতেছিল। ইহাতে এতই বেদনা ছিল যে, প্রোগিণী এক্স দক্ষিণ
 হস্ত দ্বারা কোন কাজ কর্মাই করিতে পারিতেন না। যদি কথনত
 বাহা হইরা তাঁহাকে কোন কাজ করিতে হইত, তাহা হইলে এই
 বেদনা এতই বাড়িত যে তজ্জ্য তিনি ঘুমাইতেও পারিতেন না। এই
 বোলিণার অগ্নিমানাও ছিল। পূর্বোক্ত রোগিণার স্থায়ই এই রোগিণার
 চিকিৎসা কলা হয়। ৩ মাসে এই রোগিণাও সম্পূর্কপে আরোগ্য
- (২°) ভবভূষণ চক্রবতী নামক ২০া২২ বৎসর বয়স্ক, ঢাকার জগনাথ কলেজের ভানক ছাত্রের নাসাভ্যগর্হ পালপাস্ (নাসাক্ষুদ) জনৈক গ্রাম্য সাজ্ঞন অস্ত্রোপচার করিয়া তুলিয়া কেলেন। ইছার ৮০০ দিন পর, যুব টীর ভাষণ শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। বেদনা

এতই প্রবল ও ছঃসহ ছিল যে, তজ্জা সে অনবরত ডাক-চিৎকার করিতে থাকিত, এক্সানে স্থিব ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিত না. অনবরত ঘবের ভিতর পায়চারি করিতে হইত; অবিরাম তাহার মহক ও পৃষ্ঠপেশে খাত বুলাইতে বা ডলিয়া দিতে হইত, নতুবা সে কিছুতেই ডিষ্ঠিতে পানিত না সেক:কালের গন্তও গুইতে পারিত না। গ্রামের চিকিংসকগণ বিফল হইলে, রোগার পিভামাতা ভাহাকে টাকার লইয়া আসেন। ঢাকাব জনৈক অভিজ্ঞ ও প্রাচীন চিকিৎসক এট অভিমত প্রকাশ কবেন যে, নাসিকায় যে অব্রোপরার করা হইয়াছে উহা সেপ্টিত হটয়া মস্তিক আক্রমণ করায় এট শিঞ্গী ঢার উদ্ভব হট্য়াছে এবং ভদঃযায়ী ৮:১০ দিন তেল চিকিৎসাও করেন কিন্তু ইহাতে রোগী। কিছুমাত্র উপশ্য জন্মে নাহ। অংগের ঢাকার একজন প্রাচীন ও বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথকে দেখান হয়। তিনিও ৭৮ দিন চিকিৎসা কবেন। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায়, ঢাকার মিটফে,ড হ' পাতালের অভিজ চিকিৎসক ৬াঃ এন্ গুপ্তকে call দেওয়া হ:। তিনি সৰ কথা শ্ৰবণ কবিয়া, ঢাকাৰ যে ভাক্তার সেপ্টিক্ হত্রাব কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, ভাহার প্রতিবাদ কনেন এবং ২।১ দিন পর চিন্ত। কবিয়া রোগাব কি ব্যারাম হইয়াছে ভাহঃ বলিনেন বনিয়া প্রকাশ কনেন। ২০০ বিন প্র আবার ইচাকে call দেওয়া হইলে ইনি বলেন যে, বোগীর বেইনের ভিতর (মহিক্ষের অভ্যস্তরে) একটি টিউমার উৎপন্ন হইতেছে ইহারই ফলে এই বেদনার উদ্বত। একটা মেডিকেল জানেলৈ তিনি ঠিক এইরূপ একটা রোগীর বুক্তান্ত পাঠ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। চিকিৎসা স্থানে তিনি বলিলেন যে, একমাত্র সাজিকেল অপাবেশন ছার, ইছার চিকিৎসা সম্ভবপর; অধিকস্ত ভারতবর্ষের কোথাও এরূপ অস্ত্রোপচার

সভবপর নয়; যদি রোগীর সাধ্যায়ত্ব হয়, তবে একমাত্র ভিয়েনায় গেলে (অখ্রিয়ার অন্তর্গত) ইহার অপারেশন হইতে পারে। এক কথায়, তাঁহাদের মতে এই বোগীর আরোগ্যের কোন সম্ভাবনাই নাই এরূপ ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি হোমিওপ্যাথি অথ**বা** বাইওকেমিক সিষ্টেম অভ্যানী চিকিৎসা করাইতে উপদেশ দিলেন এবং এই interesting রোগীর অবস্থা কংন কিরূপ হয়, উ:হাকে মধ্যে মধ্যে জানাহ্যার ইচ্চা প্রকাশ কবিলেন। অভঃপর রোগীর ২া৩ জন বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি (ইংগ্র একজনের স্থানিক আত্মায়ের এনটী টিটনার গ্রন্থকার ইভঃবুকো আরোগা করিয়াছিলেন) গ্রন্থকারের লিকট আসিয়া এই রে নার বিভাবিত এবস্থা বর্ণনা করেন এবং উপদেশ প্রাণী হন। গ্রহকার সক্ষা কথা শুনিয়া এই কথা বলিলেন ্য— লেকণারুষামী আমাদের চিকিৎসা কলিতে হয় স্তেরাং নোগী দেখা একাত দৰকার; বোগাৰ বাচনিক কোন বিশেষ লকণের সন্ধান াতেলে miracle ও দেখান যাইতে পারে 🕆 এট কথা গুলিয়া ভাছারা ত প্র দিন গ্রন্থকে নিত্রা রোগাঁ দেখনে বেদনার উপচয় ও উপশ্ম কিনে হয়, এই কথা জিজাসে কলার এবং আবিও কয়েকটী প্রধ্যের উদ্ধান আয় 'ব্রোগা কিছুতেই শুংতে অর্থাৎ horizontal ক্রান্ত ক্রিভ পারে না, সক্রদাই বসিয়া বা দৃ!ড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন। যদি কখনও ঘুমের ছোরে গুইয়া পড়ে তৎকণাৎ লাফাইয়া উঠিতে হয়।' এই কথা শুনিয়া রোগীকে এই বলিয়া আধাস দেওয়া হয় যে, যদি Science পত্য হয়, তবে তোমার রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, ভিয়েনা যাইতে হইবে না। এই রোগীকে পুর্বোক্ত লক্ষণামুঘায়ী বেলেডোনা ২০০ এর ২টা পাউডার দিয়া আসা হয়। বলা যায় যে, একটা পাউডার তথনই খাইবে এবং আর একটা রাখিয়া

দিবে, আগামীকল্য সকালে রোগী কিরূপ আছে দে সংবাদ দিবে এবং প্রয়োজন হইলে পরে ঐ পাউডারটী খাইবে। পর দিন সকালে রোগীর আত্মীর আসিয়া সংবাদ দেন যে, ঐ পাউডারটা খাওয়ার পর বেদনার আশ্চর্য্য উপশম জন্মে এবং রোগী গতকাল সারা দিন ও রাত ঘুমাইয়াছে। এখন মাথা নাড়িলে সামান্ত একটু বেদনা বোদ করে মাত্র। টিউমার জন্মিবার ফলে রোগীর চক্ষু এবং দৃষ্টিশক্তি বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল। এইজন্ত কালী-ফস্ ৬× ম্যাগ-ফস্ ৬×, ক্যান্ত-ফস্ ১২× একত্র মিলাইয়া (প্রত্যেকের ৪ গ্রেণ লইয়া) দিনে ৩ বার এবং সিলিশিয়া ৩০ × ৪ গ্রেণ ট্যাবলেট দিনে ১ বার খাইবার বিধি দেওয়া হয়। ইহাতেই এই রোগীর যাবতীয় লক্ষণ বিদ্বিত হয়। এই বোগী আবোগ্যান্তে ঢাকার হ্যবিখ্যাত সাপ্রাহিক ইংরেনী সংবাদ পত্র Last Bengal Times এ (চিকিৎসকের এবং চিকিৎসাপদ্ধতির ভূয়্সা প্রশংসা করিয়া কৃত্জন্তা জ্ঞাপন করিয়া) প্রকাশের জন্য এক পত্র প্রেণণ করেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য East Bengal Times ইদ্ধত হুলুত হুলে।

To The Editor, "E. B. Times"

Sir.—Whether a sick person should choose to be treated by this or that doctor or prefers this or that 'pathy', is no doubt a personal question. Yet, I feel my case has something about it to interest the public. It is a triumph of Homœopathy & Biochemistry which are so often criticised and condemned by those belonging to many other system of treatment. Cured and benefited, I stand today to sing all glory to

Mahatma Hahnemann & Schussler and to the sciences they discovered and left as legacies to mankind. Indeed I am overjoyed and overwhelmed with enthusiasm and I know no adequate language to express my gratitude to Dr. Nripendra Chandra Roy of Wari, Dacca, whom I look upon as my saviour.

Some of the most eminent Allopaths of the city were consulted. All sorts of examinations were undergone, even X ray was not spared. Final diagnosis was a Brain Tumor—a varitable death sentence. They all declared with one voice my excruciating pain as incurable and some of them suggested that I might try such overseas experts as of Vienna if my purse would allow.

So, the horrid pain continued day and night. Mental agony of the dearest increased thousand fold. And we all were awaiting the inevitable moment of death which could alone relieve me of my misery.

At this stage Nripen Babu's name was suggested by some one of my relatives. We did not know him before. My guardians agreed and Nripen Babu was sent for. Throgh a strange coincidence I saw a dream at that moment. As though a voice was speaking—"The doctor who comes now will give you two doses and cure you of this dreadful disease."

The purpose of the latter is to tell my readers that the dream came true to the letter and the miracle

was performed. I am now cured and saved. I go about my normal college routine as before.

Yours etc.

Bhababhusan Chakrabortty
(A Student of Jagannath College)
C/o. Royal Book Agency
Bangla Bazar, Dacca.

(২১) ঢাকার Pumping Station এর ইঞ্জিনিয়ার Mr. J. N Deyর নীচের মাড়িতে (Lower-jaw bone) ক্ষত জন্মিয়া ক্যান্সারে পরিণত হয়। ঢাকার বিশিষ্ট এলোপ্যাথগণ তাঁহাকে কলিকাতা গিয়া মেদিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞগণকে দেখাইতে পরামর্শ দেন। তদমুবারী ভিনি বিদায় লইয়া কলিকাতা যান এবং বিশেষজ্ঞগণকে দেখান। কিছুদিন চিকিৎসার ফলে কোনও উপশমই পরিলক্ষিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর ষত্রণাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই থাকে। আরোগ্যে নিরাশ হইয়া তিনি ঢাকার ফিরিয়া আসেন এবং জনৈক বন্ধুর পরামর্শে গ্রন্থকার দ্বারা চিকিৎশিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই রোগীকে ক্যাল্ধ-ফ্লোর ৬×, ৪ ট্যাবলেট মাত্রায় দিনে ৩ বার সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যায়। ২।১ দিন মাত্র এই ঔষধ সেবনেই বেছনা ও গলাধ:করণে (ঢোক গিলিবার) কষ্টের অনেক লাঘ্ব হয়ঃ এবং ৮।১০ দিন মধ্যেই রোগ একেবারে বিদ্রিত হয়।

Carbuncle—কার্কঃস্কল।

পৃষ্ঠাঘাত

ইহা এক প্রকার দ্বিত ত্রণ; এই ফোড়ার বর্ণ ক্লাঞ্চ মিপ্রিত লোহিত।
ইহা সাধারগতঃ পূঠে ও ঘাডে উৎপর হয়। পূঠে ১ইলে পূঠাঘাত বলে।
কার্ব্দল ও সামাস্ত স্ঘোটকে প্রভেদ এই বে, স্ফোটক অপেকা কার্ব্দল
কবিক বদ, চেপ্টা ও প্রশস্ত, বহু মুগ হইয়া প্রাব নিঃসরণ করে, প্রদাহিত
চর্ম ধ্রনমিত্রিত লোহিত বর্প হয়, এবং ইহার সহিত স্ব্রাসীন উপস্র্গ
বিহ্মান থাকে। অত্যধিক জালাপোড়া ইহার বিশেষ্ত্ব।

(চিকিৎসা)

হিন্দ্র-হান্ত । — প্রথম বা প্রাদাহিক অবস্থায় জ্বর, প্রদাহ ও বেদনার উপশমর্থ। ইহা যথাসময়ে ব্যবহার করিলে পূষোৎপত্তি নিবারিত হয়ে। সহক্রেই রোগ আরোগ্য হট্যা পাকে।

ক্রান্তী- ক্রিভিক্র। — বিতীয়াবস্থার। ফির-ফদের পহিত পর্যায়-ক্রমে ব্যবহার করিলে হর্গন্ধ সম্বর দ্রীভূত হয় ও পুষ জন্মিবার আশহা বাকে না। পুষ জন্মিলে লক্ষণামুসারে সিলি ও ক্যান্ধ-সলফ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য।

(এবসেসস্ দ্রফীবা)

Cataract-ক্যাটার্যাক্ট

ছানি, বিদগ্ধ-দৃষ্টি।

চকুর বে অংশকে লেন্স বা মুকুর বলে ভাহার অস্বচ্ছতাকে ছানি বলে।
চকুর স্থাবস্থায় এই মুকুর দেখা যায় না কিন্তু ছানি পড়িলে, মুকুর বেত বা ঈষৎ নীলাভ খেত বর্ণ হইয়া উঠে এবং চকুব ভারার মধ্য দিয়া দেখা
নায়। ছানি কোমল ও কঠিন ভেদে এই প্রকার। কোমল ছানির বর্ণ নীল।
ইহা শৈশব হইতে ৩৫ ৩৬ বংসর বয়স মধ্যে জন্মে। কঠিন ছানির বর্ণ ধুসর বা পীতাভ ধুসর। ইহা পরিণত বয়স্কদিগের হইয়া থাকে। ছানি
এক চকে বা এই চকেই জনিতে পারে। আঘাত, উপঘাত, বহু মূত্র,
অস্তান্ত চকু রোগ এবং বার্দ্ধক্যাদি জন্ত এই রোগ জনিয়া থাকে। ছানি
রোগে দৃই বস্তু ঘোর ঘোর দেখায় এবং ক্রমে ক্রমে দৃষ্টশক্তির ক্ষীণতা
জনিয়া পরিশেবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা জনিয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ক্রাক্তিক — অভিত্তার ফলে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহা ব্যবহার করিলে রোগ আর বাড়িতে পারে না। শিরংপীড়া, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্যে, দক্ষিণ চক্ষ্র চারিদিকে বেদনা, দক্ষিণ চক্ষ্তে অবিরাম মৃত্য বেদনা ও দক্ষিণ চক্ষ্তে ক্রান্তি অহভব বিশ্বমান থাকিলে ইহা অভিশয় কলপ্রদ। চক্ষ্র আড়ষ্টতা ও গ্রন্থলিতা, শিরোঘূর্ণন, আমবাভিক্ বেদনা ইত্যাদি।

কালী-মিউর।—কোমল ছানি ও আঘাত জনিত ছানিতে বিশেষ উপকারী।

ক্যাৰ্ফ্লোক্স। কঠিন ছানি। ক্যালী-মিটর সহ প্র্যায়ক্রমে।

সিলিপি হা। — যুবকদিগের রোগ অথবা পাদ-ঘর্ম হঠাৎ বন্ধ হইয়া এই রোগের উৎপত্তি হইলে।

কালী-সালাফ ।— অক্ষিমুকুর আ । ক্রিপ্টালাইন *হেন্স* যথন অপ্রিক্ষার হইয়া উঠে তথন নেট্রম-মিউর সহ প্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা।

আজ্বা — রোগের স্থানা হইতে প্রতাহ নিয়মিতরপে ২০০ মাস পর্যান্ত ক্যাল্ক-ফদ, ক্যাল্ক-ফ্রোর ও ক্যাল্ল-মিউর ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই কল পাওয়া ষায়। সকল ঔষধই আভ্যন্তরিক ও ব্যাহ্যিক ব্যবহার করা কর্বা;

(চিকিৎসিত রোগী)

দকা জেলার অন্তর্গত বায়ড়া গ্রাম নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রগোকের ছানি জনিলে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়া অস্ত্রোপটার করান। ইহার পর কাড বৎসর রোগী সব জিনিষ বেশ দেখিতে গাইতেন। কিন্তু তংপর আবার উক্ত ভদ্রলোকের উভর চক্ষেই ছান দেখা দেয় এবং দৃষ্টিশক্তি একরপ বিলুপ্তই হইয়া আইসে; সব জিনিষং ঘোর নোর দেখিতেন। স্কতরাং পুনরায় কলিকাতা গিয়া অপারেশন করাইবাব ইচ্ছায় বাড়ী হইতে রওনা হইয়া প্রথমে ঢাকায় আত্মীয় গর্ বিপ্তগাচরণ দাস (মবসব প্রাপ্ত পুলিশ স্থপারিকেতিওেণ্ট) মহাশয়ের বাসম উঠেন। এই বিপ্তগাচরণ দাস মহাশয়ের বাসম ইতিন। এই বিপ্তগাচরণ দাস মহাশয়ের বায় ২০।২৫ বৎসরের পুরাতন পিতশুল এবং হার্ণিয়া রোগ গ্রন্থকার বাইওকেমিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন তাই, বিশ্বলা বাব্র বাইওকেমিক চিকিৎসা প্রণালীর উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস জিয়ায়াছিল। এইজয় তিনি তাঁহার পুর্বোক্ত আত্মীয় ভদ্রগেককে দৃচতার সহিত বলেন বে—'চক্রের ছানি কাটাইবার

জন্ম আগনাকে মুথা অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতা যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই, আপনাকে আমি দৃঢ়তার সহিতই বলিতেছি—এজক্ত আপনাকে আর কলিকাতা যাইতে হইবে না। আপনি নৃপেন্ বাবুর নিকট গিয়া আমার কথা বলিবেন যে আমিট আপনাকে কলিকাতঃ ষাইতে বিরত করিয়া আপনার চিকিৎসাধীন ছইতে প্রামর্শ দিয়া পাঠাইয়াছি।" ত্রিগুণা বাবুর উপদেশ মত এই তদ্রলোক (নামটী ভুলিয়া গিয়াছি) আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, আমা দারা চিকিৎসিত হইবার অভিপ্রায় জানাইলে, আমি তাঁহাকে ক্যাল্ক-ফ্স্ ১২× এাৎ ক্যান্ধ-ফ্লোর ৬× এই ছুইটা ঔষ্ধ ৪ ট্যানলেট মাত্রায় দিনে প্র্যায়ক্তমে চারিবার (প্রত্যেক্টী ঔষধ ২ বার করিয়া) সেবনের এবং সিলিশ্যঃ ৩• 🗙 সপ্তাহে ১ দিন একবার মাত্র ৪ ট্যাবলেট সেবনের ম্যবস্থা দেই। সাব্যস্ত হয় ২।১ দিন পরই রোগী (কলিকাতা না গিয়া) ঢাকা হইতে বাড়ী যাইবেন এবং কখন কিরূপ থাকেন, ৭ত্র দারা, আমাকে বিস্তারিত অবস্থা জানাইবেন, আমিও তদনুষায়ী ব্যবস্থেয় खेर्य फाकर्यारा পार्शहेमा निव। এই बल्लावस क्यूमामी देशक > মাস দেবনের উপযোগী ঔষধ দেওয়া হয়। ঘটনা ক্রা,ে ইহার পর e:৬ দিন তাঁথাকে ঢাকাতেই থাকিতে হইয়াছিল এং এই সময় তিনি বাবস্থের ও্রধঞ্জি উপদেশ মত থাইতেছিলেন। যে দিন বাবস্থা कित्रा এই खेयस मिख्या इटेबाहिन, जाहात क्षा फिन भन अहे ভদ্রলোক একদিন আসিয়া আমার চরণ্যুলি লইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে আমার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থন। জানাটতে লাগিলেন। আমি প্রথমে ইহামে চিনিয়া উঠিতে পারি নাই। ইনি তৎক্ষণাৎ পরিচয় शिक्षा यगिरगन, १।७ पिन शूर्व्स जिल्ला वाच्य श्रामर्भ करम आभात নিক্ট আসিয়া ছানি রোগের ব্যবস্থা লইয়া ওবধ স্বেন করিতেছেন

এবং এই জন্নকাল মধ্যেই জাঁহার দৃষ্টি শক্তি-পুনরায় ফিরিয়া আলিয়াছে। আরও বলিলেন — প্রথম যেদিন আপনার নিকট আলিয়াছিলাম, সেদিন আপনার মুখ আঁধার আঁধার ঝাপ্সামত দেখিতে পাইয়াছিলাম, স্টে দেখিতে পাই নাই, কিন্তু আজ একেবারে স্টেই দেখিতে পাইতেছি। এই বলিয়া উক্ত ভক্তলোক পুনঃ পুনঃ অন্তরের ক্বজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন।

বাহুল্য ভয়ে অন্তান্য আরোগ্য প্রাপ্ত রোগীর বিবরণ উল্লেখ করিছে বিরত রহিলাম।

Catarrh— প্রতিশার,

मिष्र ।

"কাটার" ইহা একটা গ্রীক শব্দ হইতে নিপান্ন হইনছে। ইহার অর্থ "বরিয়া পড়া" (to drop down)। বাঙ্গালার ইহাকে গার্দ্ধ এবং সংস্কৃত্তে প্রতিখ্যার বলিয়া থাকে। নাসিকার শ্রৈত্মিক ঝিল্লীর প্রদাহকে প্রতিশ্যার বা সন্দি বলিরা থাকে। এই রোগে নাসিকা হইতে প্রথমে জলীর আব নিঃস্ত্ত হয় ও পরে উহা ঘন হইয়া থাকে। প্রারহ্বাবস্থায় প্রবল হাঁচি, মাথার ভার-বোধ, রোগ উগ্র প্রকৃতির হইলে জর জর বোধ এবং শরীরে অতিশন্ন গ্লানি সমুভব হইয়া থাকে। সন্দি অনেক দিন স্থারী হইলে প্রাবের বর্ণ ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মন্তকে ঠাঙা লাগিয়া বসিয়া গেলে সমন্ত সমন্ন বক্ষান্তগও আক্রান্ত হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ফিল্ল-ফস।—প্রথম বা

কালী-মিউর।-গাঢ়,

গাহিক অবস্থা, অথবা মন্তকের প্রতি-খ্রার; সহজে দর্দি লাগে (ক্যান্ত-ন সহ প্যায়ক্ত্রেন)। প্রাতিখ্যায়িকজ্র। ছুম্ছেগ্ৰ খেতবৰ্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট শুতিখারের দিতীর অবস্থায় বিশেষ প্রোগী। মন্তকের প্রতিখার সহকারে নাসাবরোধ এবং খেত বা ধুদর লে বুত জিহ্বা। মন্তকের ওদ-প্তিশ্রায়। ্ স্থাট-নিউল্লা—বছ াবং প্রাব বিশিষ্ট মন্তকের প্রতিশ্রায়। ব্রক্ত হীন ব্যক্তিদিগের ফেণিল আ বিশিষ্ট প্রতিশায়। উপরোক্ত লক্ষণ শংযুক্ত পুরাতন এতিখায় ৷ ইাণি বিং জলবং আব সংযুক্ত ইন্ফু য়েঞা ৷ 😎 🛪 প্রতিখার। বক্ষঃ হলে শ্লেমার 👂 ঘ'ড়, কিন্তু কাসিলে কিছুই উঠেনা।

ক্যাক্তফ স। —প্রতিখারে, বিশেষতঃ রক্ত হীন ব্যক্তিদিগের, ও শ্রাতন রোগের ইহা একটী : ধান ঔষধ। অধিক এলুমেন বিশিষ্ট এবং অসিচ্চ ডি.মুর শেতাংশের ত্যায় স্বচ্ছ গ্রাব।

কালী-সালাফ —প্রতি য়ের তৃতীয়াবস্থায়, সাধারণতঃ কালী-মিউরের পর, ইছা স্প্রযোজ্য। ব তবর্ণ আঠা আঠা, বা জলবৎ আব। লাদিকা হইতে তরণ, পীতবর্ণ আব নিংসংগ। শরীরের শুষ্কতা ও উত্তপ্ততা স্বাকিলে ফির-ফসের সহিত পর্যায় মে। উষ্ণগৃহে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

ক্যা ক্র-ক্লোর।— ওম বা নাসাবরুদ্ধকর মন্তকের প্রতিখ্যায়। ৰায়ভূজন্লীর প্রতিখায়, বহু ৫ প্রত্বর্গ ক্ষুদ্র শুদ্র শ্লেষা থও কানিয়া কেলিতে পারা যায়। পৃতিনভা (নাসারকা, হইতে ছুর্দম্য ছর্গক্ষময় আব ্রিঃপরণ)। অজিশয় চুর্গন্ধবিশিষ্ট নাসাস্থির রোগ। চর্গন্ধ দূর করিতে ইহার বিশেষ কমতা।

বিভাত আম্রাব।

বহালী-ফ স।—অতিশয় তুর্গর প্রাব বিশিষ্ট পুতিনস্ত।

স্যাক্ত-ফ্রন — প্রতিশ্রার সহকারে অন্নের লক্ষণ বিভাগান থাকিলে প্রধান উষ্থের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। জিহ্বার লেপ, ও সরের স্থায় বর্ণ বিশিষ্ঠ আস্রাব বিশেষরূপ দুষ্টব্য।

স্থাতি-সক্রে।-- ঋতুকালে ন সিকা ইইতে রক্তপত। উপদংশ জনিত পতিনস্থা (ওজিনা)। শুরু ঋতুর আর্দ্রতায় পরিবর্তনকালে রোগের উপচয় বা র্দ্ধি। প্রচুর হরিতাভ (সবুজ) শ্লেমা আব এই ঔষধের বিনির্দ্দেশক লক্ষণ।

আগো বা সা া <u>ভাগ শ কির হি:লাপ বা প্রতিরন্ধকতা।</u> পর্যায়ক্তে তারল ও শুক্ প্রতিশায়।

সি বিশিক্ষা।—পচা গুর্মি প্রাব বিশিষ্ট পৃতিনস্ত (ওজিনা) ৷ জলের সহিত কিঞ্চিং এট উষ্ধ মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদান্ত বিশেষ উপকারী। নাসারক্ষের চতুর্দিকে অভিশয় শুস্তা ও ক্ষত। নাসাগ্রের কণ্ডুংন।

আরম্ভাবস্থার ফিরম-ফস ও ক্যালী-সলদ গরম জলের সহিত মিশারো ২০।২৫ মিনিট পর পর পণ্যায়ক্রমে সেবন করিলে প্রচুর ঘর্মপ্রাব হইরা বিশেষ্ট উপকার দেশ। ষাহাদের ঘন ঘন স দিলাগে তাহাদের পক্ষে কিছুদিন নিয়মিত রূপে ক্যাল্ক ফস, ফিরম-ফন ও লাট্রম মিটর ব্যবহার করিলে বিশেষ্ট কল দর্শে। তঞ্ল সর্দিতে অত্যন্ত হাট এবং নাক চোথ ও মুথ হুইতে প্রভৃত জলবং প্রাব নিঃ ত হুইলে গ্রায়ক্রমে ফির-ফন ও লাট-মিউর ঘন ঘন ব্যবহার্য্য।

(চিকিৎসিত রোগী)।

- (১) জনৈক রোগীর ১৮ মাসের পৃতিনস্ত (Ozoena, নাসিকা হংতে প্রথম নিঃসরণ) রোগ ছিল। নাক হইতে গাঢ় হরিদ্রাবর্গ প্রগন্ধি প্রাব নিঃস্ত হইত। ঘাণশক্তি ও আস্বাদনের শক্তি লোপ পাইয়াছিল। বাম নাসিকা অধিকতর খারাপ ছিল। তিন সপ্তাহ পর পর পর পাতৃ প্রত্যাগত হইত। সহজেই সর্দি লাগিত ৩ বংসর পুর্নের ১টী মৃত সন্তান প্রসব হয়। ৩ মাত্রা ক্যালী-সলক ১২ × দেওয়া যায় ও স্থাহে কেবল মাত্র এক মাত্রা ওম্ব জলের সহিত খাইতে বলা হয়। ১ মাস পর জানা যায় যে নাসিকার রোগ সারিয়া গিয়াছে এবং ভ্রাণ ও আহাদন শক্তিও অনেকটা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।
- (২০ একটা ভ্রেলাকের প্রায় সপুণ্ছে একবাব করিয়া বাম নাসার উদ্ধৃত্য গাঢ় মলিন কটাবর্ণের অদ্ধৃত ভরল পুয় সঞ্জিত হইত ও কুৎকার কবিলে উহা বাহির হইয়া পড়িত। এই পূথের অত্যন্ত গুলুর ছিল। এই রোগীর উপরের পাঁটার ১টি দম্ভ উৎপাটন করা হইয়াছিল এবং ১ মাস পুরের ঐ উৎপাটত দত্তের মূল-দেশন্তিত এক ট্কভা মরা হাড় বাহির কবিয়া কেলা হইয়াছিল। ক্যান্ধেরেয়া, সিলিসিমা প্রভৃতি ঔষধ লেখমে প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু উহা বিকল হইলে কাসী-সলক ৬× জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে ও দিন মাত্র ব্যবহার কবা হয়। উহাতেই পুর্বাব প্রভৃতি যাবভীয় উপস্বা বিদ্রিত হইয়াছিল।
- (৩) ডাঃ Goullon নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধের প্রতিশ্রারে স্বর্ণের ন্থার ছিরদ্রা বর্ণের প্রার ছিরদ্রা বর্ণ থাকিলে নেট্রাম-ফসের অভিশর প্রশংসা করেন। এরূপ ২টা রোগীর রোগে ক্যালাবাইক্রম বিফল হওয়ার ভিনি ইছা প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছিলেন; রোগিটীর বোগা-ভঙ্কও ছিল।

Chicken Pox — চিকেন পকা।

জল বসন্ত, পানি বসন্ত।

ইহা এক প্রকার রদপূর্ণ গুটিকানিশিই অতিশয় স্পর্শ সংক্রোমক রোগ। শিশুও বালক বালিকাদিগের হ এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। প্রকৃত নসন্তের সহিত হহার অনেকটা সাদুর্গু আছে বলিয়া প্রথমবিস্থার ইহাকে আসল বস্ত বলিয়া ভাষ জন্মে। কিন্তু প্রভেদ এই বে, পানে বসন্তের জ্র অতিশয় মৃত্ত গুটিকা গুলির অগ্রভাগ ফুল্ল অর্থাং চোকা। প্রকৃত বসন্তের গুটিকার অগ্রভাগ চেপ্ট।। অপর প্রক্লুং বসত্তেব গুটি প্রথমে হাতের তালু বা পারেন তলায় প্রকাশ পায়, পানি বসস্তের শুটি প্রথমে মুখে ৬ বুকে প্রকাশ পায়।

পানি ব্যস্তের শুটিকা প্রকাশ পাইবার হা৪ দিন প্র উহা একপ্রকার জলবং রুসে পূর্ণ হয়। প্রাক্তি বসন্তেব গ্রায় উহাতে কথনং পূয হলে না। তৃতীয় বা ৪র্থ দিনেই গুটিকাগুলি ও শাহতে আরম্ভ করে ও ৫।৬ দিন মধোট রোগ সম্পুনরূপে সারিয়া যায় । পানি বসম্ভেব সঙ্গে কখন কখন ছই চারিটী প্রকৃত বসন্তেন (Small Pox) গুটুীও প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।

ফিল্ল ফল।—জর লক্ষণে; গুটিকা বা জিহ্বার লক্ষণে প্রযোজ্য ঔধ্ধের সহিত পর্যায়ক্রমে।

কালী-মিউর ৩× ।- বিতীয়াবস্থায়, জিহ্বায় খেত বা ধুসরাভ-খেত লেপ বিছাণন পাকিলে।

স্থাট মি ভিল্ল । জলীয় লকণ, তদ্ধালুতা বা অচৈত্য লকণে। নাক, চক্ষু ও মুথ হইতে (লালা) জল পড়া, বিড় বিড় করিয়া প্রশাপ বকা।

বাংকা কিলে।—এই ঔষধের উদ্ভেদের (গুটকা) লক্ষণের সহিত সানুগু থাকিলে (পূব জনালে)।

জিলিজি হা। — পূবোৎপর হইলে ও এই ঔষধের লক্ষণ বর্তমান পাকিলে।

পথ্য দিন ।— জর থাকিলে সাগু, বালি প্রভৃতি; জর না থাকিলে কাঁচ। মুগের ডাইল ও অল পথ্য দিবে। ছগ্ন স্থপথা। মৎশুনিধিদা। কোন প্রকার উপসর্গনা থাকিলে জ্বাবস্থায় ও পুরাতন সক চাইলের অল পথা দেওয়া যাইতে পারে।

> Chlorosis — ক্লোরোসিস্ হ্রতথা গু হার্রিৎপাগু (এনিমিয়া ত্রুষ্টব্য)

Cholera —কলের।।

ওলাউঠা।

প্রবল বমন-বিরেচন, তুর্দ্দম্য পিপাসা ও ভয়স্কর উদর বেদনা ও পেশীর খল্লী (হাত পায়ের পেশীতে খালধরা) কলেরার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

কারণ ও নিদান

সূর্য্যোতাপে, বিশেষতঃ গ্রীম্মকালে, নদী, পৃষ্করিণী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল উত্তপ্ত বাজ্পীভূত হইয়া বায়ুর সহিত মি ≛তে হয়। উক্ত জলীয় বাষ্প (water vapour) নিঃশ্বসিত বায়ুর সহিত ভ্রথমতঃ ফুসফুসে ও তংপর শরীরস্থ রক্তে প্রবেশ করতঃ রভের জলীয়াংশ বুদ্ধি করে। এবস্প্রকারে রক্তের জলায়াংশ বুদ্ধি হওয়ায় (রক্তের নিক্নইতা হেতু) দেহস্ত সমগ্র ষ্ট্রাদি সম্পূর্ণরাপে পরিপোবিত হইতে পাবেনা। কাজেই পেহত্যস্তাদি ও মায়ুম ওল ক্রমশঃ তর্বল হইয়। পড়ে। প্রাক্তর অনি দচনীয় ক্রিয়া কৌশল কিঞ্চিং উপলব্ধি করিতে পারিলেও বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া সেই প্রম কারুণিকের পদে স্বতঃই মন্তক অ নত হয় ও তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে দোষারোপের পরিবর্ত্তে কুভজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারা যায়না। প্রতি অমঙ্গলে তাঁহার মঙ্গলেচ্চুক হস্তের ক্রিয়াই দৃষ্ট হয়। এই অনাবশুকীয় জল দেহ হইতে নিজ্ঞান্ত করিতে না পাহিলে দেহের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। তাই. প্রকৃতি অন্য উপায়ে এই জল বাছির করিতে চেষ্টা করে। উক্ত জল-সংস্পূর্ণে সমগ্র স্বায়ুমণ্ডল উত্তেজিত (irritated) হইয়া এক প্রকার কম্পন উৎপন্ন করে। ইহার ফলে, শিরা ও ধমনীসমূহের সকোচন জিনারা তন্মধ্যে ছইতে জগীয়াংশ বাহির হইয়া কতক আমাশর (ষ্টমাক্, পাকস্থলী) ও অন্ত্রে সঞ্চিত হয় ও কতক ঘর্মরাপে বাহির হয়। আমাশয় ও অন্ত্রের সঞ্চিত জলই সায়বিক কারণে যথাক্রমে য়ৢথ ও মলদার দিয়া বহিগত হয়।
ইহাত কলেরাব ভেদ ও বমন। যে জল অক্পথে নিগত হয় তাহাই কলেরার
ঘর্ম। আর, রক্তে ম্যাগ্রেশিয়া-ফসফরিকমের অভাব বা ন্যানতা ঘটিলেই
য়ায় ও পেশীর বেড-হত্র (white fibres) সমূহের স্ফোচন জন্মিয়া

আক্ষেপ বা গালবরা (spasm) উৎপন্ন হব।

পকতাদি উচ্চ ভূগণ্ডে কলেরা ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বোগ জন্ম না।
আর্দ্র বায়ু অথ া বায়ুপিত জলীয় বাপের এই রোগের মূল করিল। ডেইন,
ডোবা বা কটোলু (maisma) প্রভৃতি কলনও ইহার কারণ নহে।
কটিলু হইতে যে কলেবা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে এই ভ্রান্তবারণা একদিন
চলিয়া বাব্বেই। The germ theory must go.)

বিগত ১০৭৭ সালে যথন কালকাভায় ভগনক কলেরার প্রাত্তিবি হয়, তথন বিগতে হৃততে স্থানিক ভাঃ বোচ্ (The great Dr. Koach) ইহার কারণ নিগর করিবার জন্ম তথায় আগনন করেন। তিনি একটা পাত্র স্থান্ত জল প্রথমে অগুবাক্ষণ যন্ত্র বারা পরীক্ষা করিয়া উহার ভিতরে যান্তিরভায় জীবাণু (Bacilli resembling sticks) দেখিতে পান (বলা বাহলা এই জল পুন্দে কথাও পরীক্ষা করা হইয়াছিল না)। এই লখাকতি জাবাণুই (যাহাকে তিন 'কোমা ব্যাসিলাই' আখ্যা প্রদান করেন) কলেরা রোগের মূলকারণ বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। অন্তিবিলম্বে এই মূল্যবান সংবাদ তারের সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রেরিত হয়। ডাঃ কোচ কলেরার কারণ (আমুমানিক) বাহির করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বহু স্থানুকে মারা পড়িল বটে (সিরঃম তৈয়ার করিবার জন্ম) কিন্তু এই জীবাণুকে

মারিবার অথবা এই রোগাক্রান্ত রোগীকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না।

বায়ুর তাপ পরে কমিল এবং কলেরাও অদৃশু হইল। এই সময় কিতিপর বৈজ্ঞানিক, (বাহারা জীবাণুমতবাদে আন্তাদন্পর। ডাঃ কোচের আন্বন্ধত জীবাণু পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জ্ঞা তাড়াতাড়ি করিয়া বিলাত হহতে কলিকাতায় আগমন করিলেন। ভাহারা আসিয়া দেখিতে পাইলেন, যে পাত্রে ডাঃ কোচ তাহাদিগকে (জাবানুগুলিকে) রাখিয়াছিলেন সেই পাত্রের ভিত্র তাহারা নেশ মুক্র মতই আছে; কিন্তু আর পুর্বের স্থার দংশন করে না

প্রকৃত কথা এই, সমন্ত অভিযাবসন্ত (in all diarrhetic stool) ব্যাগীর মনেই পুরেরাজ প্রকার জাবার দৃষ্ট হন্তা থাকে। সমুদ্র জান্তব পদাথের প্রনাবস্থানত (In all decaying organic matter) উহা উদ্ভূত হয়ে। থাকে এবং হৈছি খারা কোন রোগই উংপন্ন হর না। আশা করা এন অদু। ভবিষ্ঠাতে, প্রত্যেক বোশের কারণ মানর জাতির অবিদিত পারিবেনা এবং ভাহার প্রভূত উষ্বও প্রভ্যেক ব্যক্তিরই করায়ন্ত হইবে।

হঠাৎ শতে ভাপের পরিবর্তন; আল, সেত্রে হোনে বাস; হঠাৎ শতিলাগা; হঠাৎ ঘর্মাবরোপ, জগার বায়ু সেবন হ গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ ভারাদি এই বোগের উদ্দীপক কাবণ। ত ব্রহান্ত্রপারে এই রোগ নানা নামে অভিহিত হহয়া গাকে। যথা— এসিয়াটিক কলেবা, ড্রাই কলেরা, বিলিজঃস কলেরা, কলেরিক ডায়েরিয়া ইত্যাদি।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রত্যেক লক্ষণের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভবপর
নহে। স্তরাং তাহা হইতে বিরত থাকা গেল। কলেরা রোগীর
চিকিংসক ও পরিচর্য্যাকারী উভয়েরই বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্ব্যায়ে,
ভাঁহারা কোন ভয়ক্ষ রাক্ষসের সমুখীন হন নাই। ভাঁহাদের কেবল মনে

রাথা কর্ত্ব্য যে, তাঁহাদের রোগীর বক্তে কোন কোন লাবণিক পদার্থের অভাব ঘটিরাছে মাত্র। অতএব ভগবানে ও তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মে দৃঢ়ভার সহিত বিশ্বাস রাথিয়া, ও অভিশয় সম্বরতার সহিত অগ্রসর হইয়া প্রকৃতির কাথ্যে সাহায্য করা প্রত্যেক চিকিংসকেরই কন্তব্য। ভাহা হইলে শীঘ্রই ব্ঝিতে পারিবেন, স্থপ্রের ভয়ের ক্রায় শীঘ্রই তাঁহাদের ভয়ের কাবপ্র অপনীত হইয়াছে।

চিকিৎসা।

প্রতিষ্থেক উম্ম —নেট্র ম-চলফ ১× প্রতাহ ২ ১ মণ্ডা সেবন করিলে রোগের আক্রমণের ত ১ ভয় থাকে না

বোঁতোর বিকাশানস্থায়।—াফবম-ফস ১১ x ও কালা-ফস ৬ x (প্যায়ক্রমে)। ২ওপদ বা উপরে আক্ষেপ (spasm) ভারালে ম্যাগ্র-ফস ৬ x ৪।৫ গ্রেণ্যাত্রায় ঘন ঘন গংমভলে প্রাণ্ডিয়া সেবা।

ওইবণ্টা বা ভতোধিক কাল রোগের ভোগের পর (চাউল ধোয়া বা মাংস ধোয়া জলের ন্থায় মল নির্গত হইলে)—কালা-ফল ৩ ×় ফিংস ফস ১০ × ও সাগে কণ ৬ × এবং স্থাট-ফন ৩ × প্রত্যেকটা ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায় একতে গরম জলে গুলিয়া ৫।১০ ১১ ামনিট পর পর াদলে অতি উৎকৃষ্ট ফল দর্শিরা থাকে।

কলেরার প্রার্থাত্ত র ৫ মি'নট গর পর ব্যবস্থে উবধ ও পানার্থে গ্রম জল পুনঃ পুনঃ দিবে। ইছাতে বিশেষ উপকার ১চয়। পাকে।

কলেবার সকল রোগীকেই প্রতি ঘণ্টায় মলধার দিয়া গরম জলের তুপ দেওয়া বিশেষ উপকারী। এক বোতল ঈষগ্রফ জলে চা'র চ'মচের (Teaspoon) অদি চামচ লবণ (যে বিলাতি বেণ আহার্যার্থ ব্যবস্থাত হয়) মিশ্রিক কবিয়া প্রয়োগ করা (তুণ দেওয়া) আরপ্ত উপকারী।

বলেরার রোগীকে কোনপ্রকার উত্তেজক থাল বা পানীর দিবে না। কলেরার রোগীর পক্ষে ১× হইতে ৬× পর্যান্ত নিম্রক্রের ঔষষ অধিক ফলপ্রন।

হিল্পান তালের প্রারম্ভাব লক্ষণ বিশ্বমান থাকিলে প্রধান তালি কালা-ফদের সহিত পর্যারক্রমে ব্যবহার করিবে। চক্ষ, মুখমগুল ও মাস্তক্ষে রক্তের প্রধানন। শিশুদিগের কলেরার ইহা প্রধান তালা জলবং মল ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। শিশুদিগের করেন্ড্রা ও উচ্চ গাজোনাপ। মলের সহিত অপরিপাচিত ভুক্তারা নিংসরণ।

কালৌ হাস।—অভিশন্ন গুৰ্গন্ধ ও চাউল ধোয়া জনের স্থান্থ বর্ণ বিশিষ্ট বা রস্ভাত্বৎ (serum) মল লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা : অভিশন্ধ উপকারী। এই রোগে স্বায়ুমগুলের পাংশুর্ব পদার্থের (grey matter) করে হর বলির: অভিশন্ন গুর্বলভা জন্ম। কলৌ-ক্ষ্য প্রয়োগ করিলে এই গুর্বলভা স্থান দ্রীভূক হয়। কোলাপ্স বা পতনাবস্থান চক্ষ্-মুখ বিন্ধা গেলে, মুখমগুলের নীগাক্তভা ও স্থারভল্প থাকিলে, প্রভূত হাম ও নাড়ী বাস্থা গেলে অথবা মৃত্ স্ত্রেবৎ নাড়ী থাকিলে হুহা অভিশন্ন ফলপ্রাদ। এই বোগে, রোগের প্রথম হুহতে শেষ প্রাপ্ত এই ঔষধ বাবস্ত হওয়া উচিত।

আাহো পি ক্রা হাত স — হস্ত-পদ বা উদরে থাণ ধারলে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সাত্ত মিশাইয়া ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায় ঘন ঘন থাইতে দিবে। ব্যন এবং জলহৎ ভেদ ইচার অপর প্রয়োগ লক্ষণ।

কালৌ সালাফ ।—প্রাঃস্থাবস্থায় ফির-ফদের সহিত পর্যায়ক্রমে। অধিরতা ও শ্বাস-কষ্ট। শীত্রল স্থানে থাকিতে আকাজ্যা।

নেট্রাম সাক্ষয়।—রোগের প্রার্গ্রেকাণে প্রতিদিন প্রাতে এক এক মাত্রা প্রতিষেধক স্বরূপ সেবন করিলে আক্রমণের ভত ভয় থাকে না। সকল প্রকার কলেরা বা পেটের অন্থের প্রারম্ভে ইহার হই এক মাত্রা সেবন ক'রতে দিলে পীড়া তত গুরুতর হটতে পারে না। সর্বদা বিবমিষা (পা বমি বমি করা), মুখের তিজেমাদ ও ভিহ্নায় সবুজ বর্ণের লেপ ইহার প্রয়োগ শহণ।

নেটাম মিউল্ল।—অতিশন্ন পিগাসা থাকিলে উপযুক্ত ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে। তক্রা; বিড্কিছিয়া প্রলাপ বকা; শুক্ষ অথবা কেণাবৃত জিহ্যা।

বেছমান পাকিলে অবশ্র ব্যবহার্য। ভেদ-ব্যনে তম গন্ধ থাকিলে অথবা ভল্ল অল্ল ভেদ ও ব্যনে কণ্ট হইলে। মৃত্ররোগ। মৃত্রলোপে ফির-ফ্র সঙ্গ পর্বায়ক্রমে।

गन्तु ।

পৃক্তিই বলা ইইরাছে যে রক্তের হলীয়াংশের বৃদ্ধিই এই রোগের ম্থা কারণ। স্থাতরাং রোগের প্রচনায়ই এই হল বাহির করিবার নিমিত্ত নেট্রাম সলফ ৩× ঘন ঘন দিবে। রোগের প্রাহতিব কালে প্রতাহ সকালে ইহার একমাত্রা কি মা সেবন করিলে আক্রমণের ভয় অনেক দৃর্হ ইবে। ক্রত নিশ্বাস-প্রশাস, রক্তে আক্রিজেনের অভাব বা স্বয়্রতা স্চক লক্ষণ। স্থাতরাং উক্তলক্ষণ বিভ্যমান থাকিলে ফির্ম-ফ্রন, কংলী-সলফ বা নেট্রম সলফ দিলে বিশেষ ফল দর্শে। বমন বিরেচনে আশীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যা দৃই হইলে পর্যায়ক্রমে ফির্ম-ফ্রন ও ক্যান্ত-ফ্রন দিবে। উদর কিংবা হাত পায়ের পেশীতে থালধরা থাকিলে কিঞ্চিৎ ইফ্ জলের সাহত ম্যায়েশিয়'-ফ্রন গুলিয়া থাইতে দিবে এবং হন্ত-পদাদিতে উফ্ সেক দিবে। আভিশর ঘর্ম কলেরার একটা বিশেষ থারাপ উপস্র্গ। ক্যালী-ফ্রন ছারাধ্ এই ঘর্ম বন্ধ ও নাড়ীর উত্তেজনা জ্বো। কথন কথন ইহা নেট্রাম ফ্রন্স

বা ফিরম-ফন সহ দিলে চমৎকার ফন পাওগ যায়। প্রথমাবধি রোগীকে মাঝে মাঝে ছই এক মাত্র। নেট্রন-ফন দিলে প্রস্রাব বন্ধ হইবার ভয় অনেকটা দুর হইয়া থাকে।

কলেরার দিতী গাবস্থায় অনেকের রক্ত বা রক্তাসুবৎ (serum) ভেদ হইয়া থাকে। এরূপাবস্থায় লম্মণ প্রবারে সাবারণতঃ ফ্র-ফ্র ও েট্র মিউর ব্যবহৃত হয়। চকুর আরক্তা সহ বিকারের শক্ষণ (যথা উচ্চ প্রশাপ বকা, শ্যায় উঠিয়া বসা বা শ্যা হৃহতে উঠিয়া যাইবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি) বিভমান পাকিলে প্র্যায়ক্রমে ফিংম-ফান, ক্যালী-ফন ও হুটুন মিউর দিবে। পিণাসাম রোগীকে ঠাণ্ডা জলের পরিবর্ত্তে উষ্ণ জল খাংতে।দলে পিপাদার অনেক শান্তি জন্ম। সকল প্রকার পেটের পীড়ায়ই মধ্যে ২ মলঘার দিয়া উষ্ণ জলের শিচকারী দিলে অভিশয় উপকার হয়। প্রতিক্রিয়াবস্থা (পতনাবস্থাব পর যখন পুনরায় অল্ল অল্ল ভেদ ও বমন হইতে থাকে এবং নাড়ী উথি ১ হয়) না আদা পর্যান্ত উষ্ণ জল ব্যতীত আর কোন পথ্য দেওয়া বিহিত নহে। কলেরার রোগী অনেক সময় কুধার আহিশর ছট ফট কবে। একুধা ছষ্ট কুধা। এ অবস্থার কিছু থাইতে দিলে অভিশন্ন অপকার হয়। তবে প্রতিক্রিয়ানস্থা আসিলে অতিশয় সাবধানতার সহিত কুধানুসারে মধ্যে মধ্যে বোগীকে বালি, সাঞ বা শঠির পালো অভিশয় পাতলা ও হুসিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ লবল বা মিছরির সহিত তুই এক বিরুক করিয়া থাইতে দিবে। এই সময় রোগীকে মধ্যে মধ্যে ছই এক মাত্রা কারি-ফদ দিলে বল ও কুধ' বু'দ্ধ হয়। এই রোগে সাধারণতঃ নিম্ন ক্রমের (০×) ঔষধই ব্যবস্ত হয়। নিম্ন ক্রমে উপকার না দ'শেলে উচ্চক্রম (৬×,১২×) ব্যবহার করিবে।

প্রস্থাব বহন হইয়া থাকে। অথাৎ প্রস্থাব উৎপন্ন হয় না।

এই অবস্থার এক মৃষ্টি পরিমাণ পুঁদিনা পাতা ৩।৪টা গোলমরিচ সহ বাটীয়া এক মান মিছরির সরবতের সহিত উদ্ভমরূপে মিলাইয়া, ছইটা থানে কিছুক্ষণ ঢালাঢালৈ করিবে। তৎপর ৪।৫ পরতা বস্ত্র থণ্ডে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া রোগীকে থাইতে দিবে। ইহাতে ১ হইতে ২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রচুর প্রস্থান হইয়া থাকে। ইহা ক্মান্তর বিশেষ প্রতীর মধ্যেই প্রচুর প্রস্থান হইয়া থাকে। ইহা ক্মান্তর বিশেষ

প্রপ্রার উৎপন্ন হইয়া ব্লড'রে (মৃত্রাশর) জামরা ধাদি সেই মৃত্র পারতাক্ত না হয় (if urine is retained in bladder). তবে ব্লাডারের উপর কাদার লেপ বা জল পটা দিলে অথবা নীল ঘৰিয়া লেপ দিলে মৃত্র স্লাব হইয়া থাকে।

(চিকিৎসিত রোগী)

- (১) ১৮ মাদের একটা মেনের করেক মিনিট পর পর সবুকবর্ণ অলবৎ শ্রেম্ম মিশ্রিত মন্প্রাব হঠত। হহাতে সে বড়ই নিস্তেজ হহয়া পড়ে। তাহারা মাথা বালিশের এ পাশে ওপাশে গড়াইড, মনে হইত যেন সেউহার ভার বহন করিতে পারিতেছে না। জর্জমুদিক চক্ষু, সর্বদা কোঁকানি এবং নিত্রা কালে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠা লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। নাড়ী ক্রত, খাস বর্দ্ধিত মলিন খেতাভ মুখমগুল এবং জলবৎ বমনও ছিল। শাদ, ঘণ্টা পর্যায় উষ্ণ জলের সহিত ফিরম-ফল প্রাত ঘণ্টার দেওয়া যায়। তৎপরে প্র্যায়ক্রমে কাঞ্ছিকস ও দেওয়া হয়। ইহাতেই শিশুটা আরোগ্য হয়
- (২) জনৈক রোগীর চাউল ধোয়া জলের স্থায় বর্ণ বিশিষ্ট অভিসার গুর্দমা বমন, ও পারের ডি:ম এলী জন্ম। ক্যাণী-ফল প্রারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

(৩) আর একটা বুদ্ধেরও পূর্ববর্ণিত সক্ষণসমূহযুক্ত কলেয়া হয়।

> মাজা মাজ ক্যাণী ফ্ল সেবনেই ৬ ঘণ্টার মধ্যে রোগী সম্পূর্ণরূপে
আরোগ্য হয়। এই ২টা রোগী হইছেই ক্যাণী-ফ্ল যে আভিসারিক
কলেরার অমোঘ ঔষধ ভাহা প্রমণিত হয়।

Chorea কোরিয়া।

(তাওব ; হস্ত, পদ বা মুখের হাস্থোদীপক কম্পন)।

ভয়, মন্তকে কোন প্রকারে অবাত লাগা, ভতিরিক্ত ইন্দ্রির পরিচালনা; ক্রি'মর বিদানানতা, দক্ষোদ্যমে বিলম্ব, স্ত্রালোকদিনের জ্বরায়ুব দোষ প্রভৃতি এই পীড়ার উদ্দীপক কারণ। সকল স্বায়ুতেই শ্বেত ও পাংশু এই ছই বর্ণের পদার্থ থাকে। স্বায়ুর শ্বেত পদার্থই লাসভ-স্বায়ুরূপে কাত কবিয়া লাকে। এই শ্বেতবর্ণ পদার্থের আবার ম্যাগ্রোলয়া-ফদ প্রধান উপকরণ। পূর্ব্বোক্ত কারণের গৌণফলে যথন এই ম্যাগ্রেশিয়া-ফদের জভাব বা স্ক্রতা ঘটে তথনই স্বায়ু যথোপযুক্তরূপে নিজ কার্য্য করিতে পারে না। স্বভরাং উছার কার্য্যের বিশৃদ্ধালা জ্বো। এই বিশৃদ্ধালার ফলেই এই রোগ উৎপন্ন হয়।

(চিকিৎসা)

আাহো পিত্রা হার — আকেপ, হস্তপাদাদির অনৈচিছক কম্পন বা নিকেপ। কথা অভাইরা যার। এই রোগে ম্যাগ ফদই প্রধান ঔবধ। ক্রিব। গভমালা ধাতুর রোগাদিগকে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ দেওয়া করিব।

সিলি শিস্থা।—আক্ষেপ, ভংকর স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ইইতে জাগরণ, মুখমগুলের পাঞ্জুরতা, চক্ষু যেন ছুটরা পড়িবে এরূপ মনে হয়। ক্রিমিব বিদ্যামানতা ব্বিতে পারিলে শেটাম-ফ্য সহ প্যায়ক্রমে।

লেট্ছা-ছিল্ল:—পুরাতন রোগ। কোন প্রকার উদ্ভেলাদি যেথা থোস, পাচড়া ইঙাাদি) বসিয়া যাইবার ফলে রোগোৎপন্ন হইয়া থাকিলে। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টবা।

স্যাতি-ছেন্স। — ক্রিমি ব। অমু লক্ষণ বিদ্যান থাকিলে।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১) ২২ বংশর বয়য়জনৈক বালকের কোরিয়া রোগ হয়ে। এরপ ভয়য়র রোগী চিকিৎসক উল্লেশ ৩০ বংশর ব্যাপী চিকিৎসাকালে আর দেখন নাই। এই রোগিটা বালগৃষ্ট বর্ণিত দৈত্যের মন্ত ছিল (এই দৈতাকে সয়তান একবার আগ্রতে নিক্ষেপ করিত ও পরে জলে নিমজনকরিত)। রোগিটা এক মুহ্রও স্থিতাবে থাকিতে পারিত না। হাওপা এবং মুখমগুলের আরাত বিক্রত ছিল। কখন ২ সে আক্ষেপ অর্থাৎ স্থাকত। এই সময় ভাষার মুখ হইতে ফেলা নির্গত ইত ও সে তুড়ি দিত। এই বালক ভাষার পিতা হইতে স্বায়বিক প্রাকৃতি প্রাপ্তার বিভার দিতো একজন অত্যন্ত গজিকাসেরী ও মদাপায়ী ছিল। এই রোগীকে বে কেহ দেখিত দেই মন্তব্য প্রকাশ করিত, "ডাক্টার, এরাপ রোগীকে আপনি কিছুতেই আরোগ্য করিতে পারিবেন না। ভাষার দিকে

তাকাইতেই ভর হর, কি কবিয়া আপনি ইহার আরোগ্যের আশা করেন ?" ইত্যাদি। নিম্নলিখিত প্রকারে ঔষধ দেওয়া যার। ম্যাগ দদ ১৫ গ্রেণ ও কালী-ফদ ১৫ গ্রেণ এক রেরা এক গ্লাদের ট অংশ জল ছারা পূর্ণ করিয়া ঐ জলে এই মে'শ্রত ৩০ গ্রেণ ঔষধ মিশাইয়া সারা দিনে সময় সময় এক এক চামচ করিয়া খাইতে দেওয়া হয়। এক দিনে সময় সময় এক এক চামচ করিয়া খাইতে দেওয়া হয়। এক দিনে সময়টা ঔষধ খাইতে হইত। প্রতি দিন এইরপ দেওয়া যায়। অস্তর্কাঙী ঔষধ অরপ প্রতাহ প্রাতে ৮ গ্রেণ করিয়া ক্যাল্ল-ফদ কিঞ্ছিৎ জলের সহিত দেবন করিতেও দেওয়া যাইত। এইরপ ৬ মাস চিকিৎসায় রোগীর সম্পূর্ণরূপে আবোগ্য লাভ করে। ইহার ৮ মাস পরে জানা যায় যে রোগীর আর কোনও উপদ্রব নাই।

- (২) ১৩ বৎদরের একটা বালকের কোরিয়া রোগ জন্মে। বালকটা
 মুথের নিকট হাত নিতে পারিত না। অভিশর স্নায়াবক প্রকৃতি ও
 মুথমগুলের পাঞুরতা ছিল। অন্তব্যক্তী ঔষধ স্বরূপ প্রতাহ প্রাতে ক্যাব্দক্ষম এবং মাাগ-ক্ষম ও ক্যালীক্ষম প্রত্যেক ১০ গ্রেপ ২টা স্বভন্ত প্রান্দে কর্ম
 মান ক্ষলে মিশ্রিত করিয়া একটার পর আরে একটা পর্যায়ক্রমে এক এক
 চামচ করিয়া থাইতে বলা হয়। ৩ মানে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।
- ্৪) অপর একটা বোগীর এই বোগে মুখমপুল এবং শরীরের উদ্ধিংশ আক্রান্ত হইয়ছিল। মুখের নিম্ন এবং পার্মাব দিকে হেচ্কে টানা, চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক স্পানন, মন্তকের সন্মুখদিকে গাত, এবং নানাপ্রকার অস্বাভাবিক কম্পান, নিদ্রাকালে লক্ষণ সমূহের হ্লাস প্রাপ্তি, মলভ্যাগাবালে এবং মানসিক উচ্ছাসে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি ছিল। ইথেশিয়া ব্যবহারে ফল হর নাই। ম্যাগ্যক্ষ ৩× তিন মাস পর্যন্ত ব্যবহার করায় বেশ ফল দেখা যার। কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই। পরে

-ইংরে সহিত পর্যায়ক্রমে কা ব্র-ফস দিনে একবার। এংং ম্যাগ-ফস ছইবার করিয়া ব্যবহার করার এক মাসে রোগিটা সম্পূর্ণক্রপে আরোগ্য হয়।

(३) ১৮৮৭ সনের মার্চ মাসে লণ্ডনের হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে এই বোগের একটী রোগী ভর্তি হয়। ৮ মাস পূব্দ হইতে সে এই রোগোক্রাম্ভ হয়। হাসপাতালে গৃহীত হইবার ২ মাস পূব্দ হইতে এই রোগে সর্বদা বাবহার্য। নানা ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ বিছুই ফল হয় নাই। রোগের কারণ কিছুই স্থিররণে নিজারণ করিতে পারা যায় নাই। মেরেটীর ক্রমি ছিল না এবং ভয়াদির পর এই রোগ হুলিয়াছে এরপণ্ড ভনা যায় নাই। হাসপাতালে আসিবার পর হইতেই কার্যালে তাহার সর্বাঙ্গে আক্ষেপ (spasm) জানতেছিল। কিন্তু নিক্তিবাবস্থায় বিছুই থাকিত না। সে হাটতে এবং থাইতেও পারিত কিন্তু বাক্শক্তির অসন্তাব ছিল। ছব্পিণ্ডের ক্রিয়া ক্রততর ছিল, কিন্তু ক্রোন অস্থাভাবিক শব্দ ক্রান্ত ছবা যায় নাই। পরে সমন্ত্র সমন্ত্র ক্রমান হয় ক্রান্তের পানী-স্ত্রের (muscular fibres) আক্ষেপ অর্থাৎ স্প্যান্তম ক্রিয়াছে। চক্রর তারা প্রসারিত ছিল। ম্যাগ ক্রম ৬ ম ছই রোণ ন্যারায় থ্রস্থা করা হয়। ইহাতেই রোগী ভাল হয়।

Cold in the head—কোল্ড ইন দি হেড—মস্তকের প্রতিশ্রায় বা সর্দি।

(চিকিৎসা)

হিন্দ্র হা ফ হন: — প্রারম্ভাবস্থায় যথন নাড়ী জ্রুত ও পূর্ণ থাকে।
প্রাতিশ্রাধিক জ্বু; নাসিকার অভ্যন্তরে মুড়সড়ি। যাগদের সহজেদ স্থিলি লাগে ভাগদের পক্ষে এই ঔষধ ও ক্যান্ত ফ্লম পর্যায়ক্রমে স্থার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

নাতি মিডিই —জলবং, সচ্ছ ও ফেণা ফেণা শ্লেম প্রাক বিশিষ্ট প্রতিশ্রায়। রক্তনীন ব্যাক্তিলিগের পুরাতন প্রতিশ্রায়। লবণাক্ত শ্লেমাপ্রাব, সর্দিকালীন শরীরের নানা স্থানে ক্ষুদ্র কলপূর্ণ কুদ্ধ ভর উত্তব, এগুলি সলিয়া গিয়া পাতলা মান্ডি পড়ে। নাসিক। দিরা পার্ছার জলবং শ্লেম গুড়ায়া পড়ে। ইনফ্লুরেজা। অবনীর্ষ হইলে কা কানিবার কালে নাদিকা হইতে সক্তপাত। আলশক্তির বিলোপ। ভালুং

ক্রান্তন ।— মৃহকের প্রতিশ্র মুহকারে গ চ্, পীতবর্গ অক্সছ্ পূধবৎ ও র:জের রেথান্ধিত শ্লেম স্রাণ। ইহা সৈগ্রিক-এ'ইর অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে বিশেষ উপযোগী। নাসিকা হইতে রক্তপাত।

(मिक्स खहेवा) :

Colic—কলিক।

উদর বেদনা, শুল বেদনা।

জন্ত্রস্থ (intestine) পেশী সমূহের অনিধ্যমিত আক্ষেপিক সঙ্গোচন ২শতঃ যে বেদনা জনৈয় তাথাকে অন্ত্র-শূল বা কলিক কছে।

কার্রা — গুরুপাক দ্রা ভক্ষণ, উদ্বে বায়ু সঞ্চয়, কোঠকাঠিন্ত ক্রি বন্ধান্তা, পিত্ত-প্রশালীর (bile-duct) অভ্যন্তর দিয়া পিত্ত-শ্রণাল (gali stone) নির্গমন, এবং মুইনালীর (urcter) অভ্যন্তর দিয়া পাথুরী নির্মন প্রভূতি কার্যে এই বেদনা জানুধা থাকে। উদ্বেশনা সভাপত ব্যমন হল্লে প্রভূতি কার্যে এই বেদনা আব্দ্রা প্রাক্তি পার্যে পার্য ব্রেশনা কটি দশা ইন্তর্গে আব্দ্রালার বেদনা ব্রেশনা ব্রেশনার ক্রার্য ক্রম প্রক্রের ব্রেশনার ক্রার্য ক্রম প্রক্রের থাকে না। শূল বেদনার প্রায়ই আন্ফোপক (অর্থাৎ মেন্ট্রানবং) প্রক্রাহ প্রক্রণ প্রক্রির প্রক্র প্রক্রির প্রক্রির প্রক্রির প্রক্র প্রক্র প্রক্রির প্রক্রির প্রক্র প্রক্রির প্রক্রির প্রক্র প্রক্র

(চিকিৎসা)

তালি কি সাল বাতী চ শুল। ৬× বা ০০ × ক্রম ৪।৫ গ্রেণ মান্ত্রার প্র বিদ্যার বাজার বাজা

গরম জলে গুলিয়া হন হন ব্যবহার করিলে অতি সত্তর ফল দর্শে। পিকেপাথরী জনিত শূল বেদনায় ম্যাগ-ফস ও ক্যাল্ক-ফ্স সহ প্রয়োগ করিলে চমংকার ফল দর্শে।

নাতি সকা। — পিতৃশল ও তৎসত পিতৃ বমন, মৃথের তিক্ স্বাদ;
জিহ্বায় কটাদে সবুজবর্ণির লেপ। যক্তবের ক্রেয়ানেবন্ধন জাধানক
শ্লা শীদ শ্লা ১×, ২× বা ০× ক্রেয়েব বিচুণ্ ঘন ঘন ব্যবহার।
দ'ল্ল ক্রিকি পাদেশে দেলাৰ আহম্ম। উদ্বে বায়ু চলাচল করে।

নাটিমি উল্ল —কালোডেছির গার উল্লাহ একং ভ মাস্কোরিয়া ও কলোগিছের জার উদর বেদন নিশিষ্ট গুলে হলা অভিনার ফাপ্রদ

স্থাতি হাইসা,—াংকনিগোর গুল বেদনার মনিও জ্রিমর একণের বিদামানতা অথক অন্ত্রেলা , মসু বর্ণ এলাতি তেন, ছ াব জ্বার জমাত জন্ম বমন ইত্যানি।

কাল্যা বাংসা :— বিফাল মত-এবগু সহু উর্জ্যাদেরে বেদনা, সমুধাদকে অবনত ২ইয়া ব্যাতি এই বেলনার উপশ্মা বিষু স্থায় জন্ম জন্ম জন্ম ক্ষাতিতা।

কালী সলাফ — ম্যাগ-ফণ বিফল হইলে এই ঔষৰ প্রয়েজা। এই ঔষধের বেদনার কাশন ঠিক ম্যাগ-ফদের বেদনার ভাষা। উদরে শীতশতা অমুভব; ক্রোধেক সাবেশের পর হঠাৎ উহার তিয়েভাব ওপ্র শুল-বেদনা। গলকের ভাষা গল্প বাধু (বাহক্ষা নিঃসরণ।

ফিব্রাম ক্রানা বার্জশুল।

শুল বেদনার রোগীকে পুনঃ পুনঃ উপাঞ্জল পান করিতে দিলে ও মণ্ডার দিয়া উষ্ণ জলের পিচকারী দিলে অতিশয় উপকার দর্শে। এই বোগে কিঞ্চিৎ ইফ জলের সহিত মাাগ-ফল ৩× গুলিয়া ১০/১৫ মিনিট অস্তর পাইতে দিয়া আমহা চমৎকার ফল পাইয়াছি।

চিকিৎসা।

- (১) জনক ধর্ম-যাজকের উংকট শূল রোগ জন্ম। ব্যারামটা কভিপর বংসর স্থায়ী হয়। প্রাদাহিক বেদনার প্রায় বেদনা, প্রবল বমন, উদব স্পর্শে অভিশয় অনুভূতি । tenderness), অন্তিংতা, উদ্বেগ ও অভিশয় যন্ত্রণাস্চক মুগমন্ত্রল ছিল। যথনত দেদনা উঠিত ভাতা ও ত্রতে ৭ দিন পর্যান্ত স্থায়ী হতত । প্রায় ১ বংসর যাবৎ লক্ষ্য করা গিয়াছিল যে বেদনা দক্ষিণ দিকের কুলকেস নিকটি হইতে উঠে এবং তথা হইতে সমগ্র উদরে ছড়াহয়া পড়ে। তেটুন সলফ দেওয়া যয়; ইহাতে অভি সম্বর ফল দক্ষেণ্ ইহার পথ ওঁহার তার বেদনা উঠেনাই।
- (২) অপর ১টা বমণীর পিতৃশুল ছিল। একদিন বেদনা উঠিলে রাত্রে চিকিৎসককে ডাকান হয়। কৈয়ু চিকিৎসক বিশেষ কারণ বশ ঃ রাত্রে হান নাই। পরদিন প্রাতে উলিব স্থানী শাসিয়া বলেন, রোগিণীর লক্ষণ সমূহ কিছুমাত্র শাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরং বুদ্ধি দেখা যাইতেছে। চিকিৎসক তথায় না পৌহা প্যান্ত ব্যবহার করিতে একটা স্থগার অব মিক্ষের পাইডার দিয়া প্রায় ৯ই টার সময় তথার পৌছিয়া দেখেন রোগিণী ক্ষের্য যন্ত্রণা ভোগ কলিতেছে। বোগিণী পিত্র বমন কবিষাছে এবং তছ্কেন্ত মুখ একেবারে ভিক্ত ইইয়া রাহয়াছে। ইহা গুনিয়া চিকিৎসক মাগ্র-ফস এবং নেট্র-সল্ফ পর্যায়ঞ্জনে ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ঔষধ সেবনের অল্পলা পর হাত্রেই রোগিণী উপশম বোধ করেন ও ইহাতেই সম্পূর্ণরূপে আব্রোগ্য হন।

- (৩) ৫০ বংসর বয়য়া জনৈক রম্পী ২ বংসর যাবং আমাশয়িক (gas tralgia) ও পাকাশয়িক (enteralgia) শূল বেদনায় ভূগিতেছিলেন; যখনই বেদনা উঠিত, তখনই ভিনিগারের ক্রায় ভয়ঞ্জলীয় পদার্থ বমন হইত। ২ জন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আমাশয়ের (পাকস্থলী) ক্যাল্যার এবং ভাসমান রকক (floating kidney) বলিয়া রোগ নির্পন্ন করিয়া চিকিৎসা করেন। ল্যালিক এসিডের অভিনিক্ত নিংসরণ রোগের কারণ ফিরান্ত করিয়া নেউম-ফস ব্যবস্থা করা হয়। ছইদিনেই ফল হইতে দেখা যায়। কতিপয় সপ্তাহ মধ্যেই রোগিনী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন।
- (৪) ধৃন্টাদ বদাক নামক ৪৪।৪৫ বংসর বয়য় এক ভদ্রলোক প্রায় ২০.২২ বংসর যাবং পিন্তশূল রোগে ভূগিয়া আসিতেছিলেন। এক দিন ছপুব বেলা এই রোগের আক্রমণ এতই তার হইয়াছিল যে, বেদনার প্রচণ্ডতা বশতঃ বোগা শ্বাস-ক্রমাবস্থার মেজের উপর (on the floor) গড়াইতে ছিলেন। গ্রন্থকারের বাসার ঠিক বিপরীত দিকেই ইহার বাটা ছল। স্বতরাং সম্বর যাইয়া এই রোগী দেখিবরে ক্রম্ল গ্রন্থকার আহত হ'ন। বেদনার তীব্রতা বশতঃ রোগীর দম বয় হইবার আশহা জন্মিয়াছিল এবং কথা বলিবার শক্তি মাত্রও ছিল না। গ্রন্থকারের একটা প্রশ্নেরও তিনি উত্তর দিতে সক্রম হন নাই রোগীর পূর্বে ইতিহাস প্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ১ ডোক Plumbum ও০ (প্রাশাম) দেওয়া হয়। ইহার ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রোগী গাঢ় নিলায় অভিত্ত হন। অভঃপর কয়েক দিন মাত্র (১) নেট্রাম-সলফ ৩× এবং (২) ম্যাগ্রন্থক ওম এবং ক্যাম্বন্ধক ১২ × পর্যায়ক্রমে দৈনিক ৪ বার মাত্র দেওয়া যায়। ইহাতেই তাঁহার এই দীর্ঘকানীন রোগ একেহারে সায়িরা বায়।

(৫) ঢাকা কেলার অন্তর্গত ধানকোড়ার জমিদার স্বর্গীর দীনেশচন্ত্র রাধের পত্নী বহুদিন যাবৎ পিভ্রশৃলে ভূগিতেছিলেন এবং এজন্ত বছপ্রকারের চিকিৎসা করাইয়া প্রচুর অর্থণ্ড ব্যন্ত করেন। একবার এই রোগের চিকিৎসা জম্ম কলিকাভা গিয়া মেডিকেল বোর্ডের ভাক্তারগণকে দেখাইয়া ঔষধ সেবন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশ মত প্রায় ৬ মাস কাল নারায়ণ্গঞ্জে লক্ষ্যা নদীর উপর পিঙ্গিলে (green-boat) বাস করেন। এই সময় আবার হঠাৎ রোগের আক্রমণ উপস্থিত হইলে ঢাকা চলিয়া আসেন এবং তৎকালীন निजिन नार्क्डन ও अभन्न २१० कन अवीन এলোপ্যাথের চিকিৎদাধীন থাকেনা ডাক্তারগণ প্রত্যহ ২া৩ বার করিয়া আদিয়া রোগিণীকে দেখিরা ষাইতেন। বেদনার তীব্রতা এত বেশী ছিল যে, তজ্জ্য ৩টা মফিয়া ইঞ্জেকশন করা হয়; কিন্তু ইহাতেও বেদনা কিছুমাত্র উপশমিত হয় না; থাইবার জন্ম যে ঔষধ দেওয়া হইত, তাহাও খাইবামত্র ৰমি হইয়া পড়িত। এগ্র সিভিল সার্জ্জন সাহেব একদিন আসিয়া পরিষ্কার বলিয়া দিলেন—' মফি বায় যথন বেদন। উপশ্মিত হইল না এবং থাওয়ার ঔষধও বমি হইয়া পড়ে, তথন আপনারা এই চিকৎসা ছাড়িয়া দিয়া অক্ত চিকিৎসা করিয়া দেখিতে পারেন" (You may try other systems). ভাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে অপর একজন বাঙ্গালী চিকিৎসক (যিনি ডাক্তার সাহেবের সহযোগীরূপে এই রোগিণীর চিকিৎসা করিভেছিলেন) বলিলেন,—''আমি এই রোগের শেষ ক্লোকোফরম চিকিৎসা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি, ইহাতে **১রতো বেদনা প্রথমে একটু** বাড়িতে পারে, কি**ন্ত**ে শেষে বেদনা निक्षदे मन्त्र्राकृतकृतिक वारवागा हदेरा।" এहे कथा अनिया वार्शिय करेनक बाबीय (छमीय जाठा) विनित्त-'(विनना वाष्ट्रिया भारत

যদি না কমে, কেমন হবে ?" ইহা শুনিয়া ডাক্তার বাবু (শায় দক্ষিণ ২ন্ত দেখাইয়া) উত্তর করিলেন,—'ফদি বেদনা না কমে, তবে এই হাত কাটীয়া ফেলিব।" এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে এই স্ববোগ দেওয়া হইল। কিন্তু ছঃথের বিষয়, ক্লোরোফরম চিকিৎদায় বেদনা বাড়িল বটে, কিন্তু উহা আর ক'মল না। আমরা নিশ্চিত-রূপে অবগত আছি, এই ডাক্তা গাবুটী তাঁহার এই দন্তোক্তি রক্ষা করেন নাই: গোগিণীর অভিপ্রায়ানুসারে, এই ডাক্তার বাবু ও তাঁহার অপর একজন সহযোগীর উপস্থিতিকালেই গ্রন্থকারকে রোগিণীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবার জন্ম আহ্বান করা হয়। গ্রন্থকার গিয়া দেখেন রোগিণী নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছেন। ত্বকের পাঞ্রতা (jaundiced), শোথের ভাব এবং অল্ল অল্ল অরও বিভয়ান ছিল। যাহা থাইতেন, তৎক্ষণাৎ বমি ইয়া পড়িত। রোগিণীকে প্রীক্ষা করিয়া দেখিবার পর, গ্রন্থকার বাইওকেমিক ঔষধ দিবার মান্সে, ভূতাকে একটু গ্রম জল আনিতে আদেশ করিলেন। এই কথা শুনিমা রোগিণীর ভাতা পাত্রবাবু (বাবু বীরেক্রনাথ ভট্টাচার্যা) विलालन,—" खेय्ध मिवात क्र श्रम क्ल बानिए विलालन नाकि ? গ্রন্থ বাললেন—'হা।।'' ইহ। শুনিয়া পাত বাবু বলিলেন—'ামড্ ওয়াইফ আসিয়াছেন ডুশ্দিয়া বাহ্যি করাইতে, স্তরাং ডুশ্দিয়া বাহ্যি করাটবার পর ঔষণ দিলে ভাল হয় না ?' এই কথা ভুনিয়া গ্রন্থকার বলিলেন-জুশ দিতে গেলে হয়তো বেদনা আরও বাড়িতে পারে, স্তরাং আগে ঔষ্ধ দেওয়া হউক, ইহাতে শীম্রই বেদনা কমিয়া য'ইবে, তৎপর ডুৰ দিলেই ভাল হইবে।" তিন তিনটী মফিয়া ইঞ্কেশন দিয়াও বেদনা কিছুমাত্র কমে নাই, এমতাবস্থায় বাইওে েমিক ঔষধ দিলে এখনই (in no time) বেদনা কমিয়া

याहे.वं' श्रुकादित भूर्य এहे कथा श्रुनिया श्रुकाल এলোপ্যাথ ছইজন (বাঁহারা নিকটেট উপবিষ্ট ছিলেন), বেশ একটু মুচ্কি মুচ্কি (যেন স্বজ্ঞা ভরে) হাঁদেতে লাগিলেন এত্তকার ইহা সুস্পাই ক্ষ্যা করিয়াছিলেন, তাই তিনি দুঢ়ার সহিত্ই (পুকোক্ত ডাক্তার হয়ের দর্প চুর্ণ করিবার নি:মন্ত) ভৎক্ষণাৎ ঔষধ দেওয়ার জন্ম গ্রম জল আনিতে অহুরোধ করিলেন। গ্রম জ্ল আসিলে, ম্যাগ্-ক্স ৬ 🗙 এবং কাল্ল-ফ্স ১২× প্রভ্যেকের ৫ গ্রেশ করিয়া মোট ১০ গ্রেণ একত্রে কিঞ্চিত উষ্ণ জলে গুলিয়া খাইতে দিলেন; অতঃগর তামাক আসিলে ত.মাক থাইতে থাইতে এন্থকার পুর্যোক্ত ড.ক্তার ব্য সঙ্গে (ইহারা উভয়েই গ্রন্থকাবের সহিত পুরু হইতেই পার্টিত ছিলেন) আৰাপ করিতে লাগিলেন, এই ডাক্তার হয় ভাম,সা দেখিবার জন্ত এতক্ষণ কষ্ট স্বীকার বরিয়া বদিয়াছিলেন। অনুমাণ ৪।৫ মিনিট কাল পর, গুঞ্দয়াল নামক ভূতাটীকে গ্রন্থকার বাললেন,—"গুর্বয়াল! দেখিয়া আস তো ঠাক্রণ কেমন আছেন।' গুরুদয়লে উপর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সর্বজন সমক্ষে বলিয়া ফেলিং—"বেদনা এনদম নাই; মা কি খাইবেন জিজাসা করেছেন।" এই কথা ওনিয়া ডাক্রার বন্ধু দ্বয়ের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল জানিনা, কিন্তু তাঁহারা উভয়েই কর্তুঠাকুরাণী অন্ততঃ আপাততঃ বেদনা ২ইতে কণিক উপশম পাইলেন ইহা দেখিয়া (বাহ্যিক) আনন্দ প্রকাশ করিয়া একে একে চলিয়া গেলেন। ইহারা চলিয়া গেলে, গ্রন্থকার পাতু বাবুর মুখে রোগিণীর চিকিৎসা সম্মীর যাবতীয় ইতিহাস অবগত হইলেন। বেদনা এইভাবে কমিয়া গেলে, পামুবাবু গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করিখেন — 'বেদনা আর তো প্রভ্যাগত হইবে না ?'' গ্রন্থকারও দৃঢ়ভার সহিত পামু বাব্ৰে বলিলেন,—"কিছুতেই আর বেদনা উপস্থিত হইতে

দিব না।" এই বলিয়া, মূল রোগের জন্ম (১) নেট্রাম-সলফ ৩× এবং (২) মাগ-ফদ ৬×, ক্যাক ফা ১২× এবং নেট্:ম-ফদ ৩× (এক তে) এই ছই দফা ঔাধ প্রেছ্যেকটার ৪ গ্রেণ নাতায় ২ ঘণ্টাস্থৰ থাইতে দেওগ হয়। বৈকালে গিয়া দেখা ষায়, রোগিণীর সক্রদাই যে জব থাকিত, তাহাও ছাড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর ৭৮ বংসর কাল মদ্যে রোগিণীর আর পিত্তশুলো বেদনা উপস্থিত হয় নাহ। এইখানে একটা কথা না বলিলে অকুতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। বোাগণীর ভাষা প্রেজি পার বাব্ব ইচ্ছারুদারে গ্রন্থকার প্রভাগ ২ বেলা এই রোগিণীকে দেখিতে যাইতেন (ভাল থাকা সত্তেও) sie দিন পর এন্থাব পারুবাবুকে ব'লবেন—"ঠাকরুণ তো ভাগই অ'ছেন, এখন আর আসিবার প্রয়োজন কি ? পুর্বোক্ত উষ্ণগুলি উপদেশ মত পাভ্যাইলেই চলিবে; বরং মধ্যে ২ প্রর জানাইবেন.'' এই ভুনিয়া পামু ব'বু ইাসিয়া বলিলেন,— ভাকার বাবু! আপনার টাকা নিতে কট্ট হয় না—াক ৈ উহার ৪।৫ জনে প্রত্যুহ কত টাকা নিয়া গেল, এভঘাতীত কলিকাতা গিয়াও ১৪।১৫ হাজার টাকা চিকিৎসা বাবদে খরচ হুইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ফ্রদাই হয় নাই। যা' হোকু, ভগবানের কুপায় আপনার দারা এইরূপ আশ্চর্যা ফলে পাওয়া গেল—আপনি'ত কিছুই নিলেন না' প্রতাহ মাত্র দশ টাকা করিয়া পাইতেখেন, আপনিও যৎসামাঞ কিছু নিন্, আপনি প্রত্যহ ২ বার করিয়া ঠিক এইভাবেই আসিয়া দিদিকে দেখিয়া যাইবেন যে তিনি ভালই আছেন; ইহাতে আমাদের প্রাণেও धक्षे माश्चि जानित।"

(৬) ঢাকার তদানীস্তন এক্সাইজ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌঃ এমাথিয়দিন আহম্মৰ সাহেবের স্ত্রী বছদিন যাবং পিতৃশ্লে ভূগিতেছিলেন। তাঁহার পিতকোষ হইতে পিত্নীলা নির্মনকালে এরপ নিদারুণ বাথা জন্মিত বে, ভজ্জন্ত রোগিণীর মৃচ্ছ্য জন্মিত এবং হাদপিংগুর ক্রিয়া লোপ পাইবে বলিয়া আশহা হইত। এজক্ত এলোপ্যাথগণ প্রায়ই ইঞ্কেসন্ দিতে ৰাধ্য হইতেনা রোগ পুরাতন আকার ধার্থ করায় শোপ, মুধক্ষত এবং কামলাও জনিয়াছিল। রোগিণী কিছুই থাইতে পারিতেন না, বনি হইয়া পড়িত। কোষ্ঠকাঠিয়া এবং স্বল্প সূত্র আব হটত। একদিন আসরকাল নিকটবন্তী মনে করিয়া রোগিণী তাঁহার শেষ বক্তব্য আত্মীয় স্বজনগণকে বলিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন 1 এই সময় নিকটে উপবিষ্ট জনৈক ভর্ত্রলোকের অন্তরোধে হোমিওণ্যাথি মতে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্ম গ্রন্থকারকে আহ্বান করা হয়। গ্রন্থকার রোগিণীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ১। নেট্রাম-সলফ ৩× এবং ২। ক্যান্ত-ফ্স ১২×, ম্যাগ্-ফ্স ৬× এবং নেট্।ম-ফ্ প্ ০ প্রক্রি বাইয়া) গ্রম জলে গুলিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টাস্তর সেবনের বিধি দেন। কিন্তু রোগিণীর স্বামী এই বাইওকেমিক ঔষধের প্রেস্ক্রিপশন দেখিয়া ইহার পরিবর্ত্তে হোমিওণ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থ। করিবার অভিপ্রায় জানান; কেননা বাইওকেমিক চিকিৎসা কতকটা আধুনিক, ইহাতে ভাঁহার বিশেষ আস্থা নাই: এই কথা শ্রবণ করিয়া গ্রন্থকার বলিলেন,—"মাপনি রোগিণীকে আমার চিকিৎসাধীন করিয়াছেন, স্থতরাং রোগিণীর যাহাতে সম্বর স্থকল দর্শে আমাকে ভাছাই করিতে হইবে, স্তরাং for the best interest of the patient, আমি এই প্রেস্ক্রিপশনই রাখিব, আপনার অহুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় তু:খিত।" ইহাই করা হইল। এক ডোজ মাত্র দেবনের ফলে বেদনা প্রায় তিরোহিত হইল (pain almost gone). দিভায় ডোজ সেবনের পর ছবলভা ব্যতীত রোগিণীর নিকট আরু কোন থানি অমুভূত ইইল না। ৪।৫ ঘণ্টা পর প্রচুর প্রপ্রাব ইইল পরে আপনা হইতেই উভম মল আব হইল। এলোপ্যাথদের চিকিৎসাকালে প্রত্যহুই বিরেচক ও মুত্রকর ঔষধ দেওয়া হুইত। ডুশ বাভীত বাহ্যি হইত না এবং অতি অল্ল পরিমাণ মূত্রই পরিতাক্ত इहें क्या करकवादारे हिन ना। किन्न करे घरे एए। माज বাইওকেনিক ঔষধ দেবনের পর, আপনা হইতেই প্রভৃত মুত্র ও বাগ্যি হওয়ার সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং পর দিন অতি প্রভাষে মবিনউদিন সাহেব গ্রন্থকারের নিকট হাত জোড় করিয়া বলিলেন— 'Your medicine acted like magic"—এই বলিয়া গ্রন্থকারের নিকট পূর্বে দিনের ঐরূপ ব্যবহারের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং আরও বলিলেন—"এর পূর্ব্ব ৬ মাস মধ্যে রোগিণী कथन ७ यमः था ७मात्र देख्। প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু গতকলা বাহ্যি ও প্রস্রাব হওয়ার পর হইতেই কুধায় পাগল।" এই দিন গিয়া দেখা যায়, শোধ বা জভিদের (কামলা) ভাব কিছুই নাই। অতঃপর ২ ঘণ্টা পর পর পুর্বোক্ত ২ দফ। ঔষধই দেওয়া হয়, হঁহাতেই রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। ইহার পর ১৪।১৫ বৎসর মধ্যে রোগের আর পুনরাক্রমণ হয় নাই।

Concussion of the Brain কঙ্কঃসন অব দি ত্ৰেইন

(মস্তিক্ষের বিকম্পন)

আঘাতাদি কারণে মস্তিক্ষের ক্রিয়ার ক্ষণকাল বা দীর্ঘকাল স্থায়ী
লুপ্তাকে কক্ষঃদন সব দি ব্রেইন বলে। উচ্চ স্থান ইইতে প্তনের
ফলে বা ট্রেইনের কলিশনের (সংঘর্ষ) ফলে এরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।
(চিকিৎসা)

হিল্র ম-ফ স।—জর লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার্য।

ক্রার অভিশয় হর্ষণতা, তজ্জ গ্র অবদাদ।

আ্রান্স-ফ্রন্স।—মহিছের সংঘাত জনিত চক্ষুর স্মুথে আলোকাদি অবান্তব পদার্থ দর্শন।

ব্যাক্স-**হাম্প**।—অবশতামূভব থাকিলে, অথবা অপর কোন ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা।

বোৰহাৰ্য।

Constipation—কন্ষিপেশন। (কোষ্ঠকাটিন্য, কোষ্ঠনজ)।

বাইওকেনিক মতে নিয়লিথিত কারণ বশতঃ কোষ্ঠবছ জন্মিরা থাকে।
(১) পিত্তিতি নেট্ম-সলফ ও নেটম-ফন নামক পদার্থব্যের শ্বরতা নিবন্ধন

পিত ঘনীতৃত হওয়া জন্ত, অথবা (২) ক্লোরাইড অব পটাসের (কানী-মি) নানতা বণতঃ স্বল্প পিত্তপ্রবে জন্ত, অথবং (০) নেটুম-মিউরিয়েটিকম নামক পদার্থের স্বল্লভা বশতঃ জলীরাংশের অনির্মিত সঞ্চালন (uneven distribution) জন্ত অত্তের নৈমিক বিল্লার শুস্কতা বশতঃ কোঠকাঠিত জনিয়া থাকে। এত্যতীত আরও বহু কারণেই এই বোগ জনিতে পারে; বাইওকেমিক চিকিৎদক মাত্রেই জানেন যে রগ্নাবস্থার লক্ষণগুল রক্তন্ত কোন কোন ইন্-অরগ্যানিক সল্টের অভাব জ্ঞাপক; অত্তরব যে কারণেই কোঠবছ জন্মকনা কেন, িহ্বার লেপ বা মলের বর্ণ দেখিয়াই শরীরে কোন পদার্থের অভাব হুইয়াছে জানিতে পারা বায়; এই প্রকারে জিহ্বার লেপ এবং মলের বর্ণ ও প্রকৃতি দৃষ্টে ঔষধ ব্যবস্থা করিলেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। বিবেচক ঔষধ দিলেই এই রোগ ভাল হয় না; কারণ দ্র

(চিকিৎসা)

হিল্প সংসাদে সর্লান্তের উত্তাপ জনিত মলের কঠিনতার এই ঔষধ আতশ্য ফলপ্রদ, জর্ম, সর্লান্ত নির্গমন (হালিশ বাহির হওয়া) অথবা জরায় ও ষোনির প্রদাহ বশত: কোষ্ঠ কাঠিন্তা; শুষ্ক, কঠিন মল; মাংসে সম্পূর্ণ অক্লাচ।

কালী মি উল্লা— যক্তের ক্রিয়ার বৈষম্য ও তজ্জ্ম পিওলাবের অভাব জ্ঞা কোডবর্ক; মলের ফেঁকানে বর্ণ; জিহ্বার খেত অথবা পাংশুটে বর্ণর লেপ সহবারে কোট বন্ধ, তৈলাক্ত বা অধিক মসলা সংযুক্ত রূব্য সহা হয় না; চক্ষুর ঢেলা বাহির ইইরা পাড়িবে বলিয়া মনে হয়; দীর্ঘণালয়ারী রোগে বিশেষ ফগ্রাদ।

কালৌ ফ্লা -পাঢ় পাটল বর্ণ মন, উহার সহিত পীতাভ সবুর বর্ণের শ্লেমা লাগিয়া থাকে; সরলান্ত্র ও কোলনের (colon) পক্ষাঘাত। লেটাল-লিউব্র।—অন্ত্রের রসপ্রাবের অভাব জন্স মলের কঠিনতা ও তজ্জন্ম কোষ্ঠবদ্ধ; কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে চক্ষু দিয়া জল পড়া, প্রভূত লালা নিঃসরণ, জলবৎ পদার্থ বমন ইত্যাদি; কোষ্ঠবদ্ধ সহ মুখ হইতে জল উঠা ও নিদ্রাকালে লালা নিঃসরণ; মস্তকে শুকুতানুভব বিশিষ্ট শিরঃপাড়া; শুক্ষ, শক্ত ও কষ্টে নিঃসারিত হয় এরূপ মল; মলত্যাগের পর মলহার বিদীর্থ হইয়াছে এরূপ অন্তভব; এরূপ রোগীদের পক্ষে উষ্ণ জলের সাহত কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া মলহারে পিচকারী দিলে বিশেষ ফণ দর্শে।

ক্রাল্ক-ক্লোক্স।—মল নিঃসারণে অক্ষমতা; গর্ভবতী স্ত্রীলোকাদগের ও প্রসবের পর অল্কের পেশীর শিথিলতা বশতঃ প্রায়ই এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইরা থাকে।

ক্রাব-ফস। — কঠিন রক্তাক্ত মল, উহার সহিত জঞ্চালের ন্যার শ্লেমা লাগিয়া থাকে; বুদ্ধাদগের রোগে বিশেষতঃ তাহাদের নিরুৎদাহ, শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন বর্ত্তমান থাকিলে বিশেষ ফলপ্রাদ।

লেভ্রাম সলেহা ।—কঠিন, গ্রন্থিল, ও কথন কথন রক্তের রেথান্ধিত মল; নরম মল নি:সাবণেও কট্ট; নেট্রম-স্লফ অধিকমাত্রায় খাওয়াইলে বিরেচকের ক্রায় কার্য্য করে, মলের সহিত অধিক পরিমাণে ছুর্গন্ধি বায়ু নি:সরণ।

লেউন ফ্রন।—শিওদিগের কোষ্ঠকাঠিন্ত, সময়ে সময়ে আবার অভিসার; পথ্যের সহিত ৬,৭ মাসের শিগুদের দিনে ৩।৪ বার ৫-১০ গ্রেশ মাত্রায় এই ঔষধ থাওরাইলেও স্থন্দর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে; গ্রহ্মার কোঠকাঠিন্ত।

কিলিশিক্ষা।—অন্তের মল নি:সারণে অক্ষমতা; <u>মল কতকটা</u> বাহির হইয়া আবার ভিতরে বায়; অসম্যক পরিপোষণ জন্ম শিশুদের কোষ্ঠবন্ধ। মলন্বারে ক্ষতবৎ, স্থাচিবিদ্ধবৎ বা তীর বিদ্ধবৎ বেদনা। গণ্ডমালাগ্রস্ত বা পুয়্যাবশীল রোগীর কোষ্ঠকাঠিয়া; মশ্তকে প্রচুর দ্বন্দ্র।

মিন্তন্ত্রা ।— কোঠ পরিক্ষার রাথার জন্ম অনেককেই নিয়মিতরূপে বিরেচক বিটকাদি (cathartic pills) সেবন করিতে দেখা যায়; অনেককের এরূপ ধারণা বদ্ধুল হইরাছে যে, কোঠ থোলাসা রাথা চাই-ই (bowels must be kept open); কি কারণে কোঠকাঠিয়া জিম্মিগছে, সে দিকে একেবারেই লক্ষ্য নাই কিন্তু কোট খোলাসা রাথিতেই ব্যস্ত; এরূপ করা বড়ই ভূল এবং দোষের; অনেক সময় বিরেচক ঔবাদি ব্যবহারের ফলে অস্তের অবস্থা আরও থারাপ হইতে দেখা গিয়াছে; স্বাভাবিক নিয়মে কোঠ পরিক্ষার হওয়াই সক্ষোৎকুট; অনেক সময় আহার্য্যের দোষে কোঠকাঠিয়া জম্মিয়া থাকে; এরূপাবস্থায় বিবেচনা পূক্ষক আহার্য্য দেখে কোঠকাঠিয়া জম্মিয়া থাকে; এরূপাবস্থায় বিবেচনা পূক্ষক আহার্য্য দ্বত্যের পারবর্ত্তন করিলে স্বভাবতঃই কোঠকাঠিয়া দুর হয়; পুনঃ প্রীক্ষার কলে দেঘা গিয়াছে যে, যেথ'নে এলোপ্যাথিক মতে বিরেচক ঔবধেও কোন কল হয় নাই, সেথানে স্থনিক্ষাভিত বাইওকেমিক ঔষধ ২-১ মাজা বাবহারেই বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে। এই রোগে ব্যায়াম, শীতল জলে স্থান, ভ্রমণ এবং শরীরের অবস্থা দুটে ফল মুলাদি ভক্ষণে বেশ কল পাওয়া যায়।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) জনৈক ৩০ বংসর বয়স্ক, আলস্ম প্রবণ (যাহারা বসিয়া বসিয়া কাল কাটায়, বেশী চলাফেরা করেনা) ব্যক্তি কতিপয় সপ্তাহ যাবং কোঠ-কাঠিক রোগে ভূগিতে থাকে; পিচকারী অথবা বিরেচক ঔষধ ব্যতীত কিছুতেই মল নির্গত হইত না; কঠিন, ছোট ছোট গুটুলে মল বছ কটে নির্গত হইল; যক্তের নিজ্ঞিনতা ও পিত্তপ্রাবের অপ্রচুরতা রোগের কারক বলিয়া দিকান্ত হয়; ক্যালী-মিউর ৬×, দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যত্ বৈকালে থাইতে দেওগা যায়; প্রথম মাত্রা ব্যবহারের পর্যদিন প্রাতে স্পাভাবিক রূপ মল নির্গত হয়; কিছু দিন এহরপে উক্ত ঔষধ ব্যবহারে রোগী ভাল হয়।

- (২) ২৬ বংসর বয়স্কা ভনৈক স্ত্রীলোকের প্রসবের ৩ মাস পর কোষ্ঠ-কাঠিন্স স্নোগ জন্ম; বিরেচক ঔষধে কোন ফল হয় নাই;মলের কাঠিন্স ও ভন্মতা ছিল; বহু আয়োসে মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরার মল দারের ভিতর চুকিয়া পাড়ত; দিলিশিয়া ৩০ × প্রত্যত প্রাত্তে ও বৈকালে ২ দিন মাত্র ব্যাহার করার রোগ আবোগ্য হয়।
- (৩) ১১ বৎদর বয়য় য়ৢ ফি উলা ধাতুর জনৈক বালকের জনাবিধি কোঠকাঠিয় ছিল; বালকটি অভিশন্ন বোকা ছিল; ভাছার একটা ভাইও বোকা (হাবা) প্রকৃতির ছিল; রোগিটার ৩৪ সপ্তাহ মধ্যেও বাহ্য হছত না; কিছুদিন নেটুম-মিউর ৩০ × ব্যবহার করার রোগ সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়। হানিমা!নের শিশ্ব ডাঃ গ্রস্ এই রোগিটার আরোগার বিবহণ প্রকাশ করিয়াছেন।
- (৪) ১১ বংশরের আর একটী বালকেরও এই রে'গ ছিল; বালকটির শরীর শীর্ণ, অন্থিচশানার ছিল এবং মস্তক চইতে প্রচুর ঘর্মপ্রার চইত; মলত্যাগকালে অতিশয় কুঁথিতে কুঁথিতে কঠিন বুগদাকার মলকতকটা ব'হির হইয়া প্রনরায় ভিতরে প্রবেশ করিত; সিলিশিয়া ৩০ × সপ্তাহে ১ মাত্রা করিয়া ৪ সপ্তাহ কাল প্রদান করা যায়; ঔষধ সেবনকাল পর্যায় উত্তম পুষ্টিকর থালাও মধ্যে মধ্যে পিচকারী ছারা অন্ত্র ধৌত করায় রোগী আরোগ্য হয়।
- (1) ২: বৎসর বয়য় এক ব্যক্তিব গদমা কোষ্ঠ নাঠিত ছিল; এজয় প্রতাহই সে বিরেচক ঔষধ সেবন করিত; নতুবা তাহার বাহ্যি হইত না;

কালী-মিটব ৬× কয়েক দিন মাত্র ব্যবগার করায় তাহ র নিয়মিতরপে কোষ্ঠ পরিদার হইতে থাকে; এই ঔষধ ৮ মাস ব্যবগার করায় তাহার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

Coryza—কোরাইজা!

(মস্তকের প্রতিশ্যায় ; মাথার সদি) (চিকিৎসা)

কালী-মিউর ।—খেতবর্ণ, গাঢ়, অম্বচ্ছ প্রেম্মা নিংসরণ। নাসি-কার শুদ্ধ দিছি। ভিব্যায় খেতাভ কচাবর্ণের লেপ সহকায়ে নামাববোধক প্রতিশ্রায়। নাসিকাব গশ্চাৎভাগে ও তালুতে ৬ ক্ষতান্তব্য ও জ্বালা।

নেউ্ মানিউর :—নাগিকা ইইতে জলবং প্রাব নিঃসরণ।
বিমৃক্তি শীতল বাতাসে ও শ্রমে বৃদ্ধি; শীতল বাহা প্ররোগ উপশম।
(প্রতিশায় দ্বইব্যা)।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১১) ১৮ বংসর বয়য় জনৈক রমণী ১০ বংসর যাবং কোরাইঞা রে'গে ভূগিভেছিলেন। সপ্তাহে ছইবার করিয়া ভাষার রোগ প্রভাারত হইত এবং ২।১ দিন পর্যায় স্থায়ী হইত। রোগের ভোগকালে পৃষ্ঠে শীতামুভব ও পিপাসা বিদ্যান থাকিত। ছপুর ১০টা হইতে ১২টা পর্যায় সকল লক্ষণ বৃদ্ধি পাইত। নাসিকার আব এত অধিক ও জলবং ছিল মে রোগিণীকে ক্ষমালের পরিবর্জে ভোয়ালে বাবহার করিতে হইত। সর্জনের হাতা জালু ব্যবহারে উপশ্য বোধ হইত। বর্ধাকাল, কুল্লাটিকা

শীতলপদ, উষ্ণতা ও উষ্ণগৃহে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি জ্বনিত। রোগের ভোগকালে এরপ প্রবল ইাচি ছইত যে বাড়ীর সকলেই তাহা শুনিতে পারিত। ১৮০৯ সনের ২২শে অক্টোবর রোগিণীকে নেট্রাম-মিউর ১২ × পাঁচটা পাইডার দেওয়া হর এবং প্রতি তৃতীর দিন বৈকালে একটা করিয়া পাউডার থাইতে বলা হয়। ৫ই নবেম্বব রোগিণী প্রকাশ করেন যে, এই ঔষধ সেবনে তিনি অনেক ভাল আছেন। এখন রোগ প্রকাশ পাইলে ১ ঘন্টা কাল মাত্র স্থামী হইত। তখন এ ঔষধই সপ্তাহে মাত্র একবার করিয়া আইতে বলা হয়। ১৮৯০ সনের জান্ত্রয়ারী মাসে রোগিণী বলেন যে, গত ১০ সপ্তাহ যাবৎ তিনি এত ভাল আছেন যে বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে তান কখনও এরূপ ভাল ছিলেননা। অনেক দিন পর ঠাণ্ডা লাগায় ঐ বোগ পুনরায় মৃহ আকারে দেখা দেয়। এই ঔষধ দেওয়ায় উচা আরোগ্য হয়।

Consumption—ক্নজাম্পান। ক্ষুক্সেন্স্কাকাস।

এই রোগে রক্ত হইতে ক্দক্দে এক প্রকার অস্বাভাবিক পদার্থ
সঞ্চিত্র হয়। ইহাকে 'টিউরারকেল' বলে। এই রোগে ফ্দক্দে ক্ষত
ও পূব জারায়া ফুদক্দের ক্ষয় ও ক্ষতি হইতে থাকে। এইজন্ত ইহাকে
ক্ষয়কাস বলে। সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে যন্ধা প্রায়ই আরোগ্য
হয়না। বিভামাতার এই রোগ থাকিলে সম্ভান-সম্বৃতিতে বর্তীয়া থাকে।
সকল বয়দেই এই রোগ জারাতে পারে, কিন্তু সহরাচর ১৮ হইতে ২২বৎসর
বয়সেই বেলী হইয়া থাকে। সর্বানা দূর্বিত ধুম ও ধূনিপূর্ণ বায়ু সেবন,

সেঁতনেঁতে স্থানে বাস, অপুষ্টিকর ক্রব্য ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পুনঃ প্রান প্রসাব, অতি নৈথুন ও অন্তাভাবিক নৈথুন প্রভৃতি কারণে শরীর শীর্ণ হইরা পড়িলে সহজেই এই রোগ প্রকাশ পাইরা থাকে। প্রথমে শুক্ষ কাসি, দামান্ত পরিশ্রমেই শ্রাসকট, অনস্তর প্রেল্পা বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেমান্রাব, নাড়ীর বেগের বৃদ্ধি, সন্ধ্যার প্রাকালে গাত্রভাপেরবৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাম। এইরূপ অবস্থার মাসাবিধি বা বৎসরাবধি থাকিরা দিতীয়াবস্থার পরিণত হর। দিতীয়াবস্থার অধিক পরিমাণ হরিদ্রা বর্ণের শ্লেমা নিঃস্ত হয়। এই শ্লেমা জলে ভাসে ও কথন কথন ইহার সাহত রক্ত মিশ্রিত থাকে। রাত্রিকালে অল জর ও অধিক পরিমাণ ঘণ্মন্ত্রাব হয়। কাহার ও বা উদ্বামর জন্মিরা থাকে। এইরোগে ফুস্কুসের শিরা ছিল্ল হইয়া অথবা অভিশন্ন অবসন্ধতা বশতঃ মৃত্যু ঘটিরা থাকে। বন্ধান্তিত্ব বাক্তিদিগের সংশ্রব যতদ্র ত্যাগকরা যায় ততই ভাল। উহাদিগের উচ্ছিই ভক্ষণ, একত্রে শন্তন ইত্যাদি সর্বাদা পরিত্যাজ্য। বন্ধান্ত ডাক্ষিক কর্ত্র্য।

বাইওকেমিক প্যাথলজি অনুসারে ক্ষররোগের কারণঃ---

বাইওকেমিক প্যাথলজি অনুসারে এইরোগ কোনপ্রকার জীবাপু হইতে উৎপন্ন হয় না (কোনপ্রকার জীবাপু হইতে রোগের উৎপত্তি বাইওকেমিটরা একেবারেই স্বীকার করেন না')। পুন: পুন: ধুম ও ধুলি ইণ্যাদি পূর্ণ বায়ু নি:শ্বননে অথবা বাতাতপের হঠাৎ পরিবর্ত্তদে (Sudden nhange of temperatue of atmosphere) কুসকুসের বিধানোপাদানের (cellular stucture of the lungs) বিনাশ বাক্ষর হয়। যদি কুসকুসন্থিত রক্ত এই ক্ষর বা বিনাশের শীঘ্র পরিপূরণ করিয়া উঠিতে না পারে, তবেই এইরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে

পিতামা গাব ফুসকুদের এই দোষ থাকিলে সন্থান-সংহতিতেও উহা বর্তিতে পারে। এই দথায় কেহ যেন বাঝবেন না যে পিতার ক্ষয়কাশ থাবিলে পিতা হইতে এই ক্ষয়কাশ পুত্রপোত্রাদিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে অথবা পিতামাতার শরীর হইতে ক্ষয়রোগের শীবাণু সন্থান-সন্থাতিক্রমে বর্তিয়া থাকে। বথার ভর্থ এই যে, যদি পুর্বোক্তকারণে কোনও গ্রন্তির পরিপাক ও পরিপোষণ শক্তি হাস হইয়া থাকে, অথবা যদি তাহার শ্বাস্থ্যের নিশ্মাণবিকার অথবা নিঃশ্বসিত ব্যুদ্ধ প্রহীতাশাক্তর ব্যতিত্রম ঘটিয়া থাকে, তবে এই প্রকার ধাতুর রোগীর সন্থানগণেরও প্রক্রপ শ্বাস্থ্যের নিশ্মাণ ও ক্রিয়াবিকার ঘটিবার সম্পূর্ণ সন্থাবনা।

নিমোক্ত প্রকারে ক্সফ্সের উপাদান পদার্থের কর বা বিনাশ বটিয়া থাকে। যথা,—(১) প্রাকৃতিক নিংমে ক্সক্সের উপাদান পদার্থের যে কর সংঘটিত হইয়া থাকে, যদি শারীরিক রক্ত শীঘ্র সেই করের পূরণ করিতে না পারে (failure of the blood to furnish materials to build it up as fast as it is thrown off by the natural procese of waste, (২) যে সকল লাবণিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া এলুমেন, ফাই ব্রিণ, তৈল এবং অভ্যান্ত জান্তব পদার্থ সকল শরীরের নির্মাণকার্য্যে ব্যবস্থাত হইয়া থাকে সে সকলের স্ক্রতা ঘটিলে এই সব জান্তব পদার্থ ধ্বংশ বা বিগলিত হইয়া ক্সক্সপথে নিঃসরণ কালে ক্সক্সের বিধানোপাদানের বিনাশ ঘটাইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ফুফ্র্সের টিশু ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে "টিউবার-কিউলোসিদ্" বা "থাইসিদ" যে নাম ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে, তাহতে কিছু আদে যায় না। কিন্ত ফুদফ্রের ধ্বংশপ্রপ্ত বিগলিত আন্তব পদার্থের ভিতর যে জীবাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাকেই এই রোগের কারণ বলা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে (To call it

Tuberculosis or Pthisis does not help matters any, and to ascribe the cause of this condition to the microbe found in this decaying mass of fermented matter is science gone mad! [কোনও পদাৰ্থ বিগলিভ (decomposed) চইলে তাহার ভিতর হীবাৰু আপনা হইছেই ক্লে, কিন্তু এই জীবাৰুই বিগলনের কারণ নহে]।

(চিকিৎসা)

হিন্দ্র না হাল প্রাণ কট। শুক্ষ, গলক গুরুনকর কাসি, বায়ু কুজনলীর প্রদাহ বশতঃ এই কাসির উদ্রেক। কাসিতে কাসিতে বক্ষে কতবং বেদনা। ফুসফুস হইতে ফেণিল, উজ্জ্বল লোহিত রক্তশ্রাব। রক্ত মিশ্রিত শ্লেমা নিষ্ঠীবন। শরীরের বে কোন স্থান হইতে উজ্জ্বল লোহিত-বর্ণ রক্তশ্রাব হইলে ফির-ফস অতি উৎকৃষ্ট ঐষধ

বোগের কোনও বিশেষ কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না, এরপ অবস্থায় এই উষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে। সকল প্রকার ক্ষয় রোগেই ক্ষয় নিবারণ ও বলকারক উষধ স্বরূপ মধ্যে মধ্যে ইহা দেওয়া কর্ত্তর। যক্ষাগ্রস্ত রোগীশের পুরাতন কাসি। কাসিতে কাসিতে অগুলালের স্থায় প্রেমা উঠে। যক্ষাগ্রস্তদের প্রভূত ঘর্মপ্রাব।

ব্যাক স্বল্ফ —রক্তমিশ্রিত, পূষ্বৎ, ও সহত্তে উঠিয়া আইসে এরূপ শ্লেমা প্রাববিশিষ্ট ক্ষয়রোগ।

ন্যাট নি উল্লাল পরিষার জলবৎ, ফেণিল ও রক্তাক্ত শ্লেমা নিষ্ঠীবিত হটলে ফিরম ফলের সহিত পর্যায়ক্রমে ও অধিক মাত্রায় ব্যবহার

Croup—কুপ।

ঘুংড়ি কাসি।

স্বর্থন্থ এবং কণ্ঠনালীর লৈমিক ঝিল্লীর প্রদাহ বশতঃ ক্লাক্তিম ঝিল্লী উৎপন্ন হইলে ও তজ্জ্জু স্বাসকটাদি উৎপন্ন হইলে তাহাকে ক্রুপ বলে। ক্রুপ এবং ডিপথিরিয়া একই কারণ হইতে উৎপন্ন হইনা থাকে উভরের পার্থক্য এই যে, ক্রুপরোণে লেরিংস্ ও ট্রেকিয়ার গ্রৈমিকঝিল্লীভেই ত্নশ্লেষ্ঠ শ্লেমা সঞ্চিত ও নিবন্ধ থাকে পক্ষান্তরে ডিফ্ থিরিয়ায় থাইমংস ম্যাও ও টিন্সাবে শ্লেমিকঝিল্লী আক্রান্ত হইন্না থাকে। রক্তে কালী মিউরের অভাব হইলে, ইহার অগাৎ কালী-মিউরের সহিত রাসাম্যণিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ অর্থনিক পদার্থ সমূহ তুশ্ছেল্থ ঝিল্লীর আকারে শ্রীর হইতে নিজ্ঞান্ত হইন্না থাকে। ইহাকেই ক্রুপ বলে। স্কুতরাং এই রোগে কালী মিউরই প্রধান ঔষধ। ইহা প্রয়োগ করিলে অভাবের পূরণ করিয়া শিঘ্রই এই রোগে আরোগ্য হইন্ধ থাকে।

ক লী- ছিল উল্লাল ইং। কুপ রোগের প্রধান ঔষধ। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে গলার ভিতরে স্ত্রবৎ পদার্থ জ্বিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ ও ফ্রিম-ফল সহ পর্যাধ্রক্রমে ব্যবহার্য্য।

াফল্লম-ফজা ।—জর্-লকণে কালী-মিউরেব সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। ক্রত ও আয়াসিত শ্বাস-প্রশাস ।

ব্যান্ধ-ক্লোব্র ।—কালী-মিউর ও ফির-ফলে উপকার না দর্শিলে ক্যান্ধ-ফ্লোর ও ক্যান্ধ-ফদ দিবে।

ক্যান্ধ-সাক্রক —পীড়ার তৃতীয় অবস্থায়, লক্ষণের সহিত মিলিলে ইহা ব্যবহার্য্য। ব্যান্ত্রী-ফস।—রোগা অভিশন্ন বিশমে চিকিৎসাধান হইলে এবং রোগীর প্তনাবস্থার আশস্কা জন্মিলে স্নায়বীর গুর্বল্ডা। কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা।

চিকিৎসিত রোগী।

- ৈ কুপ রোগের বহু রোগী চিকিৎসা করিয়া অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে যে ঠিক সময়ে প্রোগ করিলে ফিরম ফস ও ক্যালী মি ইর ব্যতীত অপর কোনও ঔষধের আর আবশুক করে না। ফিরম-ফস দ্বারা হ্বর, ও ক্যালী-মিউর দ্বারা সৌত্রিক ঝিল্লী হ্রাস প্রাপ্ত হয় ক্যালী-মিউর উষ্ণ জলের সহিক মিশ্রিত করিয়া কুলি করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে।
- (१) १ বৎসরের : টী বালকের যখনই উত্তর পূর্ব্ধ দিক হইতে তীর বায়ু প্রবাহিত হইত তথনই রুজিম বিল্লী বিশিষ্ট ক্রৃপ রোগ জন্মত এই বালকের একবার অতিশর কঠিন আকারের প্রকৃত ক্রৃপ রোগ জন্ম। রোগিটীর জর ও কুকুরের কাসের শব্দের হায় উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট যন্ত্রণাকর কাসি বিহ্যমান ছিল। হোমিওপ্যাণিকমতে প্রচলিত বাবস্থের ঔষধ সকলই ব্যবহার করা হইয়া ছিল, কেন্তু তাহাতে কিছুই ফল দর্শে নাই। রাজিকালে রোগীর অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িত। এই সময় রোগীর কঠিন কাসিও অন্থিরতা এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত যে, তাহার আত্মীয় স্বজন বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। এই অবস্থায় হোমিওপ্যাণিমতে হিপার-সলফার দেওয়া হইয়াছিল। এখন উহা বদ্ধ করিয়া ২ ঘন্টা পর পর পূর্ণমাত্রায় কালী-মিউর দেওয়া হয়। কয়েক মাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিবার পরই শ্রেমা তরল ও কুকুরের কাসির শব্দের হ্যার কাস একেবারে দূর হয় এবং তৎপর অবশিষ্ট রজনী রোগিটী স্থিবভাবে নিজা যায়। পরদিন প্রাত্তে নিজা হইতে নীরোগভাবে লে উত্থান করে (স্প্রশার)

কালী-সলক।—কাস সহকারে আঠ। আঠা, পীতবর্ণ বা জনবৎ
পূষ্মর প্রাব নিঃসরণ। সন্ধ্যার প্রাকালে বা উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি। শীতপ
বিমৃক্ত বায়ুতে উপশ্ম। কাসিতে কাসিতে কতকটা শ্লেমা বাহির হইরা
আইসে, কিন্তু পূনরায় ভিতরে যায় ও উহা গিলিয়া ফেলিতে হয়। কুপের
ভাষ় উচ্চ, স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাস, তৎসহ গল-নলীতে গ্রন্থান্ত্রব।

কালী-ফস।—স্বরষয়ের উপদাহ বশত: কাস ও উহাতে কতবৎ বেদনা। গাঢ় পীতবর্ণ, লবণাক্ত এবং হগৃষি শ্লেমা প্রাব। বক্ষে বেদনা।

ন্যাত-সলফ।—বক্ষঃস্থলে বিদীণবং যাতনা সহকারে কাসি, এজস্ত ছইহাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিতে হয়। গাঢ়, রজ্জ্বং লম্বমান এবং পীতাভ সবুদ্ধ বর্ণের শ্লেমা আবনিশিষ্ট কাসি।

সিলিশি হা।—শীতল পানীয়ে কাসের বৃদ্ধি। যক্ষাগ্রন্তদিগের প্রাতঃকালীন কাসি। শুইলে বা প্রাতঃকালে শ্যা হইতে উঠিলে কাসের বৃদ্ধি। হুর্গন্ধি নিষ্ঠিবন, জলপুর্ণ পাত্রে উহা ফেলিলে পাত্রের তলদেশে ভূবিয়া যায়। ক্ষয় কাস দ্রাইব্য।

ক্যান্ধ-ফ্রোক্স।—আলজিহ্বার বিবৃদ্ধি জন্ম গলার অভান্তরে সুড়্সুড়ি জন্মিয়া কাসের উদ্রেক। কাসি সহকারে কৃদ্র কৃদ্র হরিদ্রা বর্ণেব শ্লেম্মা থণ্ড পরিভাক্ত হয়।

ন্যাউ-মিউর।—বিশেষ বিবরণ "ক্ষম্ম কাসে অষ্টব্য।

ক্র্যান্ধ-কর্স।—ডিম্বের খেতবর্ণ পদ।র্থের ন্যায় আওলালিক শ্লেমা প্রাব। সকল প্রকার ক্ষয় কাসের রোগীদিগের পক্ষে অন্তর্মার্তী ঔষধ শ্বরূপ ইছা ব্যবহার করা কর্ত্ব্য।

ক্যান্ধ-স্পান কাসি সহকারে জলের ন্তার, পৃষবৎ শ্লেমা প্রাব (চিকিৎসিত রোগী)

(১) ১৮ মাসের একটা শিশু হার্টিতে পারিত না, মন্তকের অন্থি অসংযোজিত ছিল এবং তাহার এক প্রকার কষ্টপ্রাদ, হ্রন্থ, গলার অভ্যন্তরে কণ্ডু য়নকর গুদ্ধ কাসিও ছিল। একেব রেই শ্লেমা উঠিত না। একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করেন, কিন্তু তাহাতে তাহার কোন কল হয় নাই। নিরাশ হইয়া তাহার পিতামাতা বাই৪কেমিক ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছু ক হন। তাহার পিতা চিকিৎসককে বলেন যে "যদি এই ঔষধে উহার কাসি আরোগ্য হয় তবেই ব্ঝিব যে এই চিকিৎসা-প্রণালী অতিশয় বিজ্ঞানসম্মত।' ফম্ফেট অব লাহমের স্বল্পতা হইতে এই কাসি উদ্ভ হয়, ইহা স্থির কার্যা ক্যাক্ষ-ফ্স ব্যবস্থা করাযায়। ৩ সপ্তাহ মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করায় তাহার কাসি সম্পূর্ণক্ষপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় এবং শিশুটী হাটিতে আরম্ভ করে।

- (২) ডাঃ চ্যাপম্যান বলেন যে নিউমে।নিয়া এবং প্রাদাহিক আরে সচরাচর একপ্রকার শুক্ষ, হ্রস্থ এবং গল-ক গুয়নকর কাসির উদ্রেক দেখা যার। এই প্রকার কাসে ফিরম-ফস ব্যবহারে কোন ফল না হইলে নেট্রম মিউর প্রেরোগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বহু রোগীতে ইহার ফলবতা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। ইহা সেবনের পর রোগীর ২।১ বারের বেশী কাস উঠে নাই।
- (৩) ছুইজন রোগীর ভয়ানক আক্ষেপিক কাস ছিল। কাসের অ'ক্ষেপিক প্রকৃতি দেখিয়া ম্যাগ-ফস ৪× ও ৬× দেওয়া য়ায়। রাত্রিকালে, ভুইলে ও শাতল বায়ু নিঃশ্বসনে এই কাস বর্দ্ধিত হইত এবং উঠিয়া বসিলে উপশ্যিত হইত। ছুইটা রোগীই বক্ষস্থলে অ'টে আ'ট (tightness) অমুভব করিত। বিতীয় রোগীর কাসিবারকালে মূত্র নিঃস্ত হইত। পুর্বোক্ত ওঁষধে অভি সম্বর ছুইটি রোগীই ভাল হয়।
- (৪) ডাঃ ফিলারের একটা ছর্দম্য কালের রোগিণীর কালিবার কালে মুত্র নিঃস্ত হইত। ফিরম-ফল ব্যবহারে দত্তর উহা আরোগ্য হয়। ডাঃ স্প্লার এইরূপ লক্ষণাপন্ন জনৈকা রমণীর রোগ এই ঔষধ স্থারা অভি অল্লকালের মধ্যে আরোগ্য করেন।

করিলে রক্তপ্রাণ নিগারিত হয়। পরিশ্রণের পর অভিশয় র্বেলতা। বক্ষংস্থলে তরল শ্লেম্মার ঘড় ঘড়ি। লোণাদেশে পীড়ার বৃদ্ধি। ফেণিল শ্লেমা নিন্তীবন বিশিষ্ট পরাতন কাসি। ফেণিল নিষ্ঠীবন যুক্ত পরাতন ক্ষয়কাস।

সিলিশিইন — রোগের প্রবর্ধিত বা শেষ অবস্থায় ংহা একটা অত্যাবশুক ঔষধ। প্রভৃত, সবুজাভ পীতবর্ণের বা তর্গন্ধি পুষের জায় গাঢ় মিষ্ট যাদবিশিষ্ট সবল শ্লেমা নিষ্ঠিবিত হইলে ইহা অংশু প্রয়োগ করিবে। প্রভৃত নৈশ ঘর্মা; জর; পদতলে জালা প্রভৃতি ইহার অপর প্রয়োগ লক্ষণ কোষ্ঠবন্ধতা। অশিয় ওগন্ধি পাদ ঘর্ম। ঘড় ঘড়ি শক্ষবিশিষ্ট কাস ও সহজে অধিক শ্লেমা নিঃসরণ।

কালৌ-সল্ফ।—এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক শ্লেমা প্রাব বিশিষ্ট ক্ষর কাস। কাসিতে কাসিতে কতকটা শ্লেমা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে ষায় ও রোগীকে উহা গিলিয়া ফেলিতে হয়। শুক্ষ, থস্ থসে ত্বক

কালী মিউর।—গাঢ়, সাদা শ্লেমা; জিহ্বার খেত বা পাংশুটে খেতবর্ণের লেপ।

কালী-ফাস।—খনখাস, পচা গগন্ধযুক্ত শ্লেম। অভিশয় শীর্ণভা গুর্মলতা ও অবসমতা।

ন। তি সকাফ। —পুষবং শ্লেমা নিঃসরণ এবং এই ঔধধের আর আর লক্ষণ বিষ্ণমান থাকিলে ইছা বাবস্থেয়

প্রাপ্র — ছাগগর, গোগর, ম্বত, ছাগমাংস, আঁইস বিশিষ্ট টাট্কা মৎস্থ, মাংসের ধুস, গোধুম, ছোলা, মুগের ডাইল, পটোল, সজিনা স্থপথা। কডলিভার অয়েল উপকারী। ঈষৎ উষ্ণ বা শীতল জলে মান এবং শাশ্রু ধারণ (গোপ দাঁড়ি রাখা) হিতকর। যে যে জিনিষে অজীর্ণ জন্মে তাহা পরিত্যাজ্য। রাত্রিজাগরণ ও অতিপরিশ্রয় এবং জ্বীসহবাস সম্পূর্ণ নিষিশ্ধ।

Cough—কঃফ।

কাসি।

কাসি স্বাং কোন রোগ নছে. অন্ত রোগের লক্ষণ যাত্র। গলরোগ, পাকস্থলীর ক্রিয়া বকার, যক্তের রোগ, ফুসফুসের রোগ প্রভৃতির সহিত ইহা সংস্ট থাকে। সাধারণতঃ ঠাগু৷ বাতাস লাগিয়া এই রোগ জ্বিয়া থাকে। কাসি সাধারণতঃ ছই প্রকার, তর্ল ও গুক্ষ।

(চিকিৎসা)

কালী মিউল্লা– জিহ্বায় খেত অথবা পাংশুটে বর্ণের লেপ সহকারে উচ্চ সশন্ধ কাসি। এই কাসি আমাশয় (প্রমাক্) হইতে উঠে বলিয় বে'ধ হয়। গাঢ়, তশ্ছেন্ত ও হয়ের ক্রায় খেতবর্গ শ্লেমা নিঃসরণ। তকণ, থকথকে ত্পিংকফেব ন্তায় কাসি কুপের ন্তায়, উচ্চ শন্ধ বিশিষ্ট কাসি সহকারে জিহ্বায় খেতবর্ণের লেপ। কুপ বা ঘুংড়ি কাসির ন্তায় স্বরভঙ্গ। কাসিবার সময় অফিগোলক চুটিয়। পড়িবে বলিয়া বোধ হয়।

ফি ন ফি স — তরুণ খুসখুসে ও ষর্মাকর কাসি সহকারে ফুসকুসে ক্ষতবং বেদনা। কাসিলে একটুকুও শ্লেমা উঠে না। খাস-নলীর উত্তেজনার উদ্ভিক্ত খুসখুসে কাসি। ঠাণ্ডা লাগার দরুণ শুষ্ক উচ্চ কাসি। কাসিতে কাসিতে বক্ষে বেদনা, কিন্তু কিছু মাত্র শ্লেমা উঠে না।

ম্যাপা-ফস। — ছপিংকফে আক্ষেপিক লক্ষণ বিশ্বমান থাকিলে কালী-মিউরের সহিত পর্য্যাঞ্জমে। আক্ষেপিক কাসি। শ্লেমাপরিশ্রু আক্ষেপিক কাস। কাসিতে কাসিতে ফুসফুসে বেদনা। উষ্ণ পানীর গ্রহণে ক্ষণস্থায়ী উপশম। জিহ্বার লেপ দেখিলে এই ঔষধ নির্বাচনে বিশেষ গোলযোগ হর না। ইহার জিহ্বালক্ষণ দেখুন।

Delirium—ডিলিরিয়ম্, প্রলাপ।

কোন কোন রোগে মন্তিক্ষের ক্রিয়া বিক্বত হইয়া মনের বিশৃঙ্খলা ও বাক্যের যে অসংলগ্নতাদি স্বন্মে, তাহাকে প্রলাপ বা ডিলিরিয়ম বলে !

(চিকিৎসা)

কালী-ফল - সম্প্রপায়ীদিগের রোগ। ভয়, নিদ্রাহীনতা, অন্থিরতা এবং সন্দিশ্বতা। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের প্রলাপ বকা, কল্লিত বস্তু দশস বিষয়ক প্রলাপ। স্থাট-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে।

স্মাট- সিউর। — ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। যে কোন সময়েই পীড়া হউক না কেন, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা, হস্ত-পদের বিকেপ, বিষয় হুইতে বিষয়ান্তয়ের প্রলাপ ও জিহ্বায় ফেণিল লালা বিশ্বমান থাকিলে ইহা দ্বিধা না করিয়া প্রয়োগ করিবে। কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

ফিব্র ম-ফস।—জর থাকিলে অপর কোন ব্যবস্থের ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

(চিকিৎসিত রোগী)

- (:) ডিলিরিয়মট্রিমেন্সের একটা রোগা দেখিতে ডাঃ স্থলার আছত হন। নেট্রম-মিউর প্রয়োগে রোগা শ্বায় সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়।
- (২) নেট্ন-মিউরের বিষয় লিখিবার কালে বর্ণিত হইয়াছে বে, ইহার সাহায্যেই দেহস্থিত প্লল সর্বত্ত সমানরূপে সঞ্চালিত হয় রক্তে এই পদার্থের সম্মতা ঘটিলে স্থানে স্থানে জলীয়াংশের ন্যুক্তা ঘটে। এইরূপে যদি কোথাও জলীয়াংশের অভাব হইয়া মস্তিক্ষের নিয়ভাগে ইক্ত জলীয়াংশের বৃদ্ধি হয়, তথন উক্ত অধিক পরিমাণ জলের চাপে স্বায়ুমগুল পীড়িত হয়

এবং, এজন্ত নানারণ মান্তিক ও স্বায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাকেই ডিলিরিয়মট্রিমেন্স বলে। স্থতরাং অভাবের পূরণ করিয়া নেটুম-মিউর এই রোগে বিশেষ উপকার দশাইয়া থাকে।

Dentition—ডেণ্টিশন, দন্তোদাম কন্ট।

ক্রাছ-ফস।—দ্যোদাকালীন যাবতীয় উপসর্গের ইছা প্রধান ঔষধ। দ্যোদামে এবং হাঁটা শিথিতে বিশ্ব। মন্তকের অন্তিগুলি শীপ্র শীপ্র জোড়া লাগে না। যে সকল স্ত্রালোক পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাপর হর্মল সন্তান প্রস্ব করেন গর্ভাবস্থায় মধ্যে মধ্যে ভাঁহাদেরও এই ঔষধ থাইতে দেওয়া অবশু কর্ম্বর।

আ। স ফস। - দন্তোত্তেদকালীন দড়কা ও থিচুনির প্রধান ঔষধ। ক্যাছ-ফদ দহ জলে গুলিয়া পুনঃ পুনঃ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ফিব্রম ফস।—জর থাকিলে ক্যাল্ক-ফল সহ ইহা ব্যবহার্য।

ক্যান্ত । — দন্তের আবরক পদার্থের। enamel of teeth)

সল্লভার অর্থাৎ দম্ভ উঠিয়াই ক্ষমপ্রাপ্ত হইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

সিলি'শ্বা।—দন্তোৱেদকালে মন্তকে প্রত্ত ঘর্ম থাকিলে কাহ ফন নহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

লেউ ম-মিউর।—জাগ্রত বা নিমিতাবস্থায় মূথ হইতে গালা নিঃসরণ।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) ২৮ মালের ২টা শিশুর উত্তপ্ত গাত্ত, আরক্ত গণ্ড (গাল) চকু বেল ছুটিরা পড়ে, প্রসারিত চকুতারা এবং অন্থিরতা ও ছুটফটানি ছিল। ফিরম-ফন ৬× বিচুর্ণ হলের সহিত প্রতি ঘণ্টার ঘণ্টার দিতে শ্বাবন্থ। করা হয়। প্রথম মাত্রা ঔষধ সেবনের পরই বেশ স্থানর ফল দেখা যার। কারণ ঔষধ সেবনের কিছুক্ষণ পরই শিশু ঘুমাইরা পড়ে ও তাহার গাণের আরক্ততা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। করেক ণাত্রা ঔষধ সেবনের পরই শিশুর যাবতীয় উপদাহকর লক্ষণ তিরোহিত হয়।

(২) ১৮ মাসের ১টা শিশুর করেকটী মাত্র দাঁত উঠিয়াছিল। দেই ক্ল, কবৃত্রের বক্ষেরস্থায় বক্ষ, হাঁটিতে অসামর্থ্য এবং অস্থির (হাডের) কোমলতা ও বিবর্দ্ধনের অভাব ছিল। ক্যাল্থ ফল ০× বিচূর্ণ দিনে ৩ বার করিয়া ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে কডলিভার অয়েল সেবনের বিধিও দেওয়া যায়। ৩০ মাত্রা ঔষধ সেবনের পর রোগীর ষাবভীয় লক্ষণেরই উপকার দেখা যায়।

Diabetes Mellitus. ডায়েবিটিস মেলিটঃস-বহুমূত্র।

বন্ধ্য ধাতৃ-দোষ জনিত এক প্রকার রোগ। স্নায়্মঙলের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিয়াই এই রোগ জন্মে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত স্থরাপান, গুরুতর মনোকষ্ট বা শোক, মন্তক বা মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্তি, অধিক মিষ্ট বা খেতসারমর দ্রব্য starch) আহার, শারীরিক পরিশ্রমাদির পর উত্তপ্ত শরীরে শাতল জলপান প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। এই রোগে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ মূত্র প্রাব হয়। মূত্রে চিনি থাকিলে এই রোগকে মন্ত্রমহ বা ডায়েবিটির মিলিটার ও চিনি না থাকিলে তাহাকে মৃত্রমেহ বা ভারেবিটিল ম্পুরিরাস্ বলে। মুত্রমেহে, মুত্রে অধিক পরিমাণ ইউরিরা থাকে। প্রশাব করিবার পর মৃত্রে পিপীলিকা পতিত হইলে চিনি আছে বলিরা জানা বায়। কোঠকাঠিত, অকের কর্কশতা (থস্থলে ভাব), ছণিবার পিপালা, প্রথমে বিলক্ষণ কুধা, কিন্তু রোগের র্দ্ধির শহিত শ্বার মন্দত শরীরের অভিশর হর্মলভা ও শীর্ণভা, পদের ফীতভা, স্থানে কেন্দুরন ইভ্যাদি ইহার লক্ষণ। বহুমূত্রে যক্ষা, কোড়া, কার্ম্বন্ধন, ছানি প্রভৃতি উপসর্গ জ্বিতে পারে।

(চিকিৎসা)

শেক্ত আ-সালক।—ইহা এই রোগের সর্বপ্রধান
লক্ষণামুসারে অপর কোনওওঁষধ ব্যবস্থের হইলেও প্রত্যাহ ইহার ২,৪ মাত্রা
দেওরা বিধের । সশর্কর মৃত্র।

কালৌ-ফস।—ইহা মন্তিক:ও সায়ুর ছর্জনতা দূর করে। এজন্ত এই রোগের ছর্জনতায় ইহা সবিশেষ উপযোগী। শর্করাবিহীন রোগ। অদ্যা কুধা।

ফিব্রহা ফস।— জর, নাড়ীর ক্রততা ও শরীরের কোনও স্থানে বেদনা বা প্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইছা ব্যবহার্য।

ক্রাছ-ফল — গুলর্মতা, পিপাসা, মুখের ও জিহ্বার শুছতা, শিথিল ও কুঞ্চিত উদর, লবণ ও মাংসাহারের আকান্তাযুক্ত শর্করাবিহীন রোগে ইহা উপকারী। শর্করাস্রাবী রোগে ফুসফুস পীড়িত হইলে ইহা ব্যবস্থেয়।

কালী-ভিউন্ন।— অধিক পরিমাণ এবং শর্করাবিশিষ্ট মৃত্রস্রাব। অতিশুর হর্মণতা ও নিদ্রালুতা।

লেন্দ্র-মিউর।—শর্করাবিদীন বহুসূত্র। অদ্যা পিপাসা, শীর্ণভা নিল্লা ৫ কুধাহীনভা, অভিশয় হুর্ক্লভা ও নৈরাশ্র।

মন্তব্য।

নেট্রম-ফল, ফিরম-ফল, কালী-ফল এবং নেট্রম-দলফ এই রোগের প্রধান ঔষধা তর্কলতাও অভিক্ষুধায় কালী-ফল কখনও বিফল হয় না।

অভিশর পিপাসা, শীর্ণতা ও আশা-শৃত্যতার নেট্রম মিউর দিলে আশাতীত ফল পাওরা মার। তই বা ততোধিক ফক্ষেটের লক্ষণ বিশ্বমান থাকিলে ঐগুলি একত্র মিলাইরা দেওরা যাইতে পারে। কিন্তু নেট্রম-সলফ ও নেট্রম-মিউর কথনও একত্র মিশাইরা দিবে না. পৃথক পৃথক জলের সহিত গুলিরা দিবে। অতিশর শীর্ণতা ও ক্ষুধাহীনতা থাকিলে, ক্যাক্ষেরিয়া ফদ দিলে অভিউত্তম ফল দর্শে। অধিকাংশ সমরই দেখা যার যে অজীর্ণতা ও যক্তের ক্রিয়ার 'বক্তিই এই রোগের প্রধান কারণ। এরপ স্থলে নেট্রম-সলফ ও কালী মিউর ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগীর অমনোষ থাকিলে নেট্রম-ফল ও ক্যাক্ষ-ফল দেওরা কর্তব্য।

পথ্য পথ্য—এই রোগে শর্করা বা শর্করা সংযুক্ত দ্রব্য এবং তৈল ও ঘ্রতাক্ত দ্রব্য একেবারেই নিষিদ্ধ। অধিক আহার সর্বতোভাবে বর্জনীয়। দিনের মধ্যে ১৬ বার লঘু আহার করিবে সে-ও ভাল, তথাপি এককালে অধিক আহার করিবে না। ঘোল ও নালা প্রকার ফল উপকারী। অন্ত কোন প্রকাবের চিকিৎসায়ই বহুমুত্রে তত স্ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু খুব সাবধানতা ও স্থবিচেনার সহিত বাহওকেমিক ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবস্থা করিলে অতি চমৎকার ফল পাওমা যায়।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১) ৪২ বৎসর বয়স্বা জনৈক রমণীর ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৪ গ্যালন (৩ সের ১০ ছটাকে ১ গ্যালন) মুত্রস্রাব হইত; স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১০৪০ ছিল; অভিরিক্ত স্বামী সহবাসের ফলেই এই রোগ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়; লক্ষণ দৃষ্টে, নেট্রম-সলফ, নেট্রম ফস ক্যালী-ফস ও ম্যাগ্রেশিয়া-ফস এই ৪টি ঔষধ, যখন যেটার প্রয়োজন তথন সেটী ব্যবহার করিয়া ৩ মাস মধ্যেই রোগিণীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা হয়; ইহার পর ৩ বৎসর মধ্যে ভাহার রোগ আর প্রভ্যাবৃত্ত হয় নাই:

- ২) শাল্রাজের সেরিফের রিপোর্টে জানা যায় মে তাঁছার জ্ঞাতসারে ছইটী ভারাবিটিলের রোগী নেট্র সলফ ৬× সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য ছ: রাছে।
- (৩) ডা: E. B. Rankin এর রিপোর্টে প্রকাশ, নেট্রম ফস ৬× প্রয়োগে ১টী রোগীর ক্ষ্ধা. পিপাসা ও শীণ্ডায় বিশেষ উংকর্ষ সাধিত হংরাছিল।
- (৪) ডা: স্পলারের নিকট স্কটলগু ও ইটালীর ২ জন ডাক্তার জানা-ইয়াছেন যে, কেবলমাত্র নেট্রম সলফ দ্বারা তাঁহারা ডায়াবিটিসের ছুইটী রোগা সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রেরিভ সংবাদে কেহই রোগীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন নাই
- (৫) ডা: Coilhol M. D. কতকগুলি স্নায়বিক কারণে উৎপন্ন ডামেবিটিসের রোগী নেট্রম-সলফ ও ম্যাগ্রেশিয়া-ফস দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন; সকল রোগীতেই উক্ত ছই ঔষধ ১ ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হইয়াছিল

Diarrhoea—ডায়েরিয়া,

অতিসার, উদরাময়

(চিকিৎসা)

ফিল্রম ফলন।—মলে অপরিপাচিত দ্রব্যের বিশ্বমানতা; পুনঃ পুনঃ জলবং, তরল মলস্রাব সহকারে জর এবং পিপাসা; মলের বর্ণ দৃষ্টে অপর কোনও ঔবধ বাবস্থের হইলে ইছার সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে; উদরামরের প্রারম্ভাবস্থার মলম্বার দিয়া প্রচ্র পরিমাণ গরম জলের পিচকারী দিলে বিনা ঔষধেই অধিকাংশ সময়ে উপকার দর্শিরা থাকে; ঠাণ্ডা লাগিরা এই রোগ জিমিলে এই ঔষধেই বিশেষ ফল দর্শে।

ন্যাট্র ম-কস। — অমাধিক্য জন্ত পীড়া জন্মিয়া থাকিলে; সব্ধবন, অমগন্ধি মল; পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাপন্ন শিশুদিগের দন্তোৱেদকালীন উদরামর; মলে ক্রমির বিশ্বমানতা; জিহ্বার পশ্চান্দিকে পীত বর্ণের লেপ; অপক্রফল ভোজন জনিত বা গ্রীশ্বকালীন অভিসার।

ক্রাক্স-ফস।—শিশুদিগের দক্তোদ্ধেদ কালীন অতিসারের ইছ।
একটা মূল্যবান ঔষধ; মলের বর্ণ ও প্রকৃতি দৃষ্টে অপর কোনও ঔষধ
ব্যবস্থের হইলে উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে; গণ্ডমালা ধারুর শিশুদিগের অতিসার; শিশুদিগের ও বালকদিগের অতিসারে, বিশেষতঃ
ভূক্তদ্রব্য পরিপাচিত না হওয়ার দক্ষণ পরিপোষণে ব্যাঘাত জন্মিয়া
রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে প্রায় সকল রোগীর পক্ষেই ক্যান্থ-ফস,
ফিরম-ফস, বা নেট্রম ফস উপযোগী হইয়া থাকে। উক্ত, জলবৎ, তুর্গদ্ধি
ও প্রভূত মল সশব্দে নিঃস্তে হইলে এই ঔষধে চমৎকার ফল দর্শে।

্ কালী-মিউর।—ফেকাশে, খেতাত বা কর্দমের স্বায় বর্ণ বিশিষ্ট

ভরণ মণস্রাব (কালী-সলফ)। টাইফয়েড্জরে পুর্ব্বোক্ত প্রকারের মল লক্ষণে। ভৈলাক্ত বা বসাময় দ্রব্য ভোজনের পর খেত বা পিচ্ছিল মলস্রাব জিহ্বায় খেতবর্ণের লেপ। রক্তাক্ত বা আঠা আঠা মলস্রাব

কালৌ-ফল।—পচা, হুর্গন্ধি মলপ্রাব। চাউল ধোয়া জলের স্থায় বর্ণ বিশিষ্ট মলপ্রাব। অতিশয় হর্জনতা ও অবসরতা বেদনা সংযুক্ত বা বেদনাবিহীন অতিশয় হর্জনতা।

কাক্রী-সাল ফা।— ছরিদ্রা বর্ণ, জলবং তরল, অথবা আঠা আঠা শ্লেমা সংষ্কুক মলবিশিষ্ট অভিসার। কথন কখন অস্ত্রে (নাড়ি ভূড়ি) খালধরাও বিদ্যুখান থাকে। জিহ্বা মূলে পীতাভ লেপ।

নেট্রাম মি ভিন্ন —জনবং, স্বচ্ছ, আঠাল মল বিশিষ্ট্র অথবা অতিরিক্ত লবণ সেবন জনিত উজ্জল শ্লেমা-স্রাব।

স্থাউ-সক্ত ।-- গাঢ় সব্জবর্ণ পৈত্তিক মলস্রাবী অতিসার; পুরাতন প্রাতঃকালীন অভিসার। শীত্র আর্দ্র ঝতুতে বৃদ্ধি।

কাৰে ফ্লোক্স।—পৃষাক্ত অথবা পৃষ ও রক্তপ্রাবী অতিসার।

স্মাপ-হ্রুস।— আগ্নান, উদর বেদনা অথবা আক্রেণিক বেদনা বংযুক্ত অভিসার। বাহ্যিক উকাপ প্রদানে উপশম। মলের বর্ণ দৃষ্টে অপর যে ঔষধ ব্যবস্থের হয় ভাহার সহিত পর্যায়ক্রমে ইহা ব্যবহার করিবে।

াত্র স্বৈশিক্সা — শিশুদিগের অতিসার। মলে অতিশয় হুর্গন্ধ;
টিকা দেওয়ার পরবর্তী অতিসার, তৎসহকারে মন্তকে প্রভৃত অমগন্ধি ঘর্মা
এবং কঠিন, উন্ধান্ত ফীত উদর।

চিকিৎসিত রোগী।

(১) ২ মাসের ১টা শিশুর নিম্নলিখিত লক্ষণ সংযুক্ত অতিসার ছিল।
যথা:—বেদনা সংযুক্ত অতিসার, বালিসের উপর অবিরাম মন্তকের সঞ্চালন,
উর্দৃষ্টি বিশিষ্ট চকু, জিহ্বার প`তাভ কটাশে বর্ণ, শুশুপানে সময় ২

- (২) ডা: লিপি ১টা প্রাত্তংকালীন অতিসারের রোগী নেট্রম-সলফ
 ধারা স্থানররূপে আরোগ্য করেন। তাহার নিয়োক্ত লক্ষণ ছিল:—
 প্রাত্তে জাগরিত হওয়া মাত্র হঠাৎ অত্যা বেগের সহিত মল ও বায়ু
 নিংস্ত হইত। নিংসরণ কালে মল চতুর্দিকে ছিটকাইয়া পড়িত
 সি এম (c, m.) শক্তির ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল।
- (৩) ডা: Goullon ২ বংশরের পুরাতন : চী অভিসারের রোগী ক্যাক্সলফ প্রয়োগ করিয়া আয়োগ্য করেন। রোগীর জিহ্বার লেপ ও মলের প্রকৃতি দেখিতে ফল চটকাইলে যেরূপ হয় সেইরূপ ছিল।

- (৪) একটা রোগিণীর বছদিন বাবং প্রত্যন্ত প্রান্তে নড়া করিবা মাত্রই মলবেগ হইত। ডাঃ এলেন নেট্রম সলফ ৬× প্রয়োগ করিরা উহা আরোগ্য করেন।
- (৫) বছদিনের প্রাতন অতিসারের ১টি রোগীর অতি প্রতাবে অধিক পরিষাণ মল সবেগে হড় হড় করিরা বাহির হইত। নেট্রম-সলফ ৬ × ব্যবহারে এই রোগী ভাল হর।

Diptheria—ডিফ্ থিরিয়।

বিল্লীক প্রদাহ।

এই বোগে গণার মধ্যে এক প্রকার কত ও ওপ্ছেম্ব পর্দা জন্মে। এই
পর্দা ক্রমণঃ বিস্তৃত হইরা মুখ, নাসিকা ও ফুসফুসের উপরিভাগ পর্যায়
প্রসারিত হর। এতৎসহকারে জর ও নানাপ্রকার সাম্বীয় লক্ষণও
বিষ্ণমান থাকে। ইহা অতীব সাংঘাতিক রোগ; স্থতরাং শীল্প শীল্প
ভিকিৎসক ডাকা কর্তবা। (কুপ ক্রইবা)।

(हिकिৎमा)

विन्द्राक्ष क्या क्या व्याप्त व्यापत व्याप्त व्यापत व

কালী ভিত্তির ০× ।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। রোগ প্রকাশিত হওরা মাত্র ফির্ম-ক্ষের সহিত পর্ব্যারক্রমে ব্যবহার করিলে আর কোনও ঔষধের প্রয়োজন হর না। এক মাস জলে ১০।১৫ গ্রেপ কালী-মিউর মিপ্রিত করিয়া পুন পুনঃ কুলি করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। লেটাম মিউল্ল।—জনবৎ পদার্থ বমন বা বিরেচিত হইলে এই ঔষধ অবশ্র ব্যবহার্য। মুধমওলের পাঞ্রতা ও স্ফীততা; তন্ত্রালুতা এবং মুধ হইতে প্রভূত লাগা নিঃসংগ।

লেটাম সক্রহা—বমিত পদার্থের সবুজবর্ণ ও তিজ্ঞান্বাদ থাকিলে প্রধান ঔষধের সহিত পর্যান্বক্রমে দিবে।

কালী-কস।—রোগের যে কোন অবস্থার অভিশর ত্র্বলতা, অবসরতা ও সাংঘাতিক লক্ষণ সকল, যথা নাড়ী লোপ, গাত্রের শীতলতা প্রভৃতি, বিশ্বমান থাকিলে ইহা দিবে। এই রোগের পরবর্তী কৃষলে, যথা দৃষ্টির ত্র্বলতা, নাকা নাকা কথা বলা ও কোন অসের পকাঘাত জন্মিলেও ইহা ব্যবহার করিবে।

ক্র্যাক্স-ক্রোক্স। ক্রিকিৎসা বা অসাবধানতার ফলে পদা ধাসনদী (ট্রেকিয়া) পর্যন্ত বিভৃত হুইয়া পড়িলে ক্যান্ত-ফলের সহিত্ত
পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে।

ক্যাৰ হ্ৰুক্তন।—খাস-নলী পৰ্য্যস্ত পৰ্দা প্ৰদাৱিত হইরা পড়িলে ইহা ব্যবহার্য্য।

লেট্র-ফজা — জিহ্বার মূলদেশ, টজিল বা উপরের তালুতে সম্বের স্থায় পীতবর্ণ লেপ জ্বিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য।

ডাঃ স্পলার বলেন 'টিস্থ রেমিডি ব্যবহারকালে অপর কোন ঔষধ
যথা চুলের জল, কার্কালক এসিড, বরফ জল প্রভাত কিছুতেই ব্যবহার
করা কর্ত্তবা নহে। কেননা এতহারা টিস্থরেমিডির ক্রিয়ার ব্যাঘাত
ভামিতে পারে " এই রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মার্ক-সাম্বেনাইড্ ৩০
প্রায় অমোদ ঔষধ। ইহা অর্ছ হইতে ১ ঘণ্টাস্তর ব্যবহার্য্য।

(চিকিৎসিত রোগী)।

(১) একটা পূর্ণবিকশিত ডিফ্থিরিয়াক্রান্ত শিশুর নিয়োক্ত শব্দশ বিশ্বমান ছিল। যথা:—গ্রন্থির বিবর্জন; আলজিহ্বা এবং কোষণতালু সম্পূর্ণরপে বিলী বারা আর্ড চোক গিলিতে অভিশর কট্ট এবং অভিশর বলকর। কালী-মিউর ৬× প্রতি ২ ঘণ্টা অস্তর ব্যবস্থা করা বার। শরদিন অবস্থা অনেক ভাল দেখাযার। ৪ দিনে তাহরে যাবতীর গল-লক্ষণ বিদ্রিত হর ইহার পর ক্যাত্ত-ফ্ল প্ররোগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

- (২) ১৪টা ডিফ্থিরিয়ার রোগী চিকিৎসাকালে ব্যাণী মিউর ৩ × প্ররোগে অন্তান্ত ঔষধ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট কল পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্ররোগে অতি সম্বর্ট বিল্লী হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনের সঙ্গে ২ ইহার কুলিও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কুলির সঙ্গে বিল্লীও বাহির হইয়া আইসে। এই ঔষধ ব্যবহার কালে মধ্যে মধ্যে ফিরম-ফনও দেওয়া বিধের, ইহাতে সকল রোগীতেই আলাভীত কল পাওয়া বার।
- (৩) ওক্তেনবার্গ সহর হইতে কাওপর মাইল দুরবর্তী এক গ্রামে ১টা শিশু এই রোগাক্রাম্ব হর। রোগের প্রারম্ভাবস্থা হইতেই ভাষার কঠদেশ আক্রাম্ব হয়। এলোপ্যাথিক মতে ভাহার চিকিৎসা হয় ও শিশুটী মারা যার। ঠিক ঐ সমর ঐ গ্রামের অপর এক বাটাতে আর একটা শিশুরও এই রোগ লয়ে এবং ভাহারও পূর্ব্বোক্ত রোগিটার স্থায় উপসর্গ সমূহ বিশ্বমান ছিল। এই শিশুর পিতা ডাঃ স্থসলারের নিকট আসিরা ভাহার চিকিৎসা করণার্থ আছ্বান করেন। ভিনি মূল রোগের কস্ত কালী-মিউর এবং কঠের (pharynx) উপসর্গের ক্ষম্বউহার সহিত পর্যায়-ক্রমে ক্যান্থ-ক্রম ব্যবস্থা ক্রেন ২ দিন পর শিশুটার পিতা চিঠিছারা ভাক্তারকে জানান যে শিশুটা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইরাছে
- (৪) বিগত গ্রীমকালে ১টী ডিফ্থিরিরার রোগিণী দেখিতে আহত হই। গলা পরীক্ষা করিলে সাধারণ গলকত বলিরা অনুমান হর। এক্ত ক্যান্ত-সলফ ব্যবস্থা করা যার এবং ইহাছারা শীম্রই বিশেষ ফল দেখা না

গেলে বৈকালেই আবার খবর দিতে বলি। অপরাহ্ন ৪ টার সময় জ্ব ও বাক্শক্তির ব্যতিক্রম প্রকাশ পার। বিশেষ সাবধানভার সহিত গলা পরীক্ষা করিলে টব্দিলের উপর একটি কটালে বর্ণের আবরণের मा पर्ता मुद्दे रहा। এইক্ষণ পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও কালী-মিউর ৩ × ব্যবস্থা করা হয়। রাজি ৯টার সময় আবার রোগী দেখিতে যাই। তথন তাহার অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন দেখা বার নাই। বিশেষতঃ এখন সে নুভন উপসর্গের কথা প্রকাশ করে। বলে যে, ভাহার গলা ১ইতে অবিরাম কি যেন উঠিতেছে। মনে করিলাম ইচা বোধহর কলোদাম (ওয়াটার ব্রাশ)। এজন্ম করেক মাতা নেট্রম-ফদ ব্যবস্থা করিলাম। किंदु हेशर७७ (कान क्ष इत्र नाहे। এक्श अविष्टे दक्षनीत क्श शृर्त्वाक ছই ঔষধ চালাইতে বলি। পরদিন প্রাতে রোগিণীর অবস্থা আরও খারাপ দৃষ্ট হইল। পদা আরও ছড়াইয়। পড়িয়াছে ও টন্সিল ছইটি পূর্বাপেশা অধিকতর ক্ষীত হইয়াছে দেখা গেল। গলা হইতে যে শ্লেমা ক্ষরণ হইতেছিল ভাহাও স্থগিত হয় নাই দেখিলাম। এইদিন রোগিণীকে ৩ বার দেখিতে বাই। শেষে, রাত্রিকার পূর্বোক্ত ঔষধ নিম্ন ক্রমে (ox) वावहारत्रत वावश कतिया চलिया याहै। भद्र मिन खार्ड ব্যোগিণীকে দেখিতে গেলে তাহার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আর একজন ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধ দিতে আপনার মত হয় কি ?' রোগিণীর অবস্থা তথন বাস্তবিকই অতিশর সঙ্কাপর হইরা উঠিয়াছিল। এই সময় হঠাৎ আমার মনে হয়, 'অবিরাম গলা চইতে কিছু বেন উঠিতেছে" এ শক্ষণটা নেট্রম-সলফে আছে। তথন নেট্রম-সলফ ২০০ × একমাত্রা প্রদান করি। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রোগ-লক্ষণের विष्णव পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এই ঔষধ পুনরায় প্রয়োগ করায় রোগিণী मञ्जूर्व चार्याभा रन।

- (৫) সাংখাতিক প্রকারের ডিফ্থিরিরার বখন উপর্ক্ত ব্যবস্থের ঔষধ প্রয়োগ করিরাও কোন ফল লাভ করা যার নাই তখন কালী-ফদ এবং কালী মিউর (কখন নেট্র-মিউর সহ এবং কখন ব। উহা ছাড়াও) পর্যারক্রেমে ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাওরা গিরাছে।
- (৬) ডাঃ স্সলার এই রোগের পরবর্তী পক্ষাঘাতে কাণী-ফ্র বাতীত অপর কোন উৎক্লাই ঔষধ আছে বলিয়া মনে করেন না।
- (१) জনৈক ব্ৰতীর গণ ক্ষত, টিন্সিলের আরক্তা ও ফীততা এবং ক্ষর লক্ষণ বিভ্যান ছিল। দেড়দিন পর্যান্ত ৩ ঘণ্টা অন্তঃ ফিরম-ফস দেওরা যার। ইহাতে একটু উপশম বোধ করিলে ঔষধের প্রয়োগে ক্ষান্ত থাকা বার। কিন্তু তৎপর আবার অন্তথ বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী দেখিতে যাওয়া হয়। এখন দেখা গেল, ডিফ্থিরিয়ার পর্দার ভায় পর্দা বারা দক্ষিণ দিকের টিন্সিনটী আবৃত হইয়াতে। এখন পূর্বের ক্রায় আবার ফিরম ফস বাবস্থা করা হয়। পর দিন দেখা গেল পর্দা প্রায় বিদ্রিত হয়াছে, টান্সলের আরক্ত তা এবং ফ্রীততাও অনেক কমিয়াছে। তখন ঐ ঔষধই ৪ ঘণ্টা পর পর সেবন করিতে বাবস্থা দেওয়া যায়। পর দিন গলার অভ্যন্তরে সামাক্ত একটু পর্দা মাত্র দেখা গেল। এইক্ষণ আরও দীর্ঘকাল অন্তর ঔষধ সেবনের বিধি দেওয়া হয়। তৎপর দিন রোগেণী সম্পূর্ণ নিরাময় হন।
- (৮) ৫ বৎসরের ১টা বালকের জর, আরক্ত মুখমঞ্জল, আরক্ত গণ্ড, এবং টন্সিলের, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকেরটার আরক্তনা ও ক্ষীততা ছিল। দক্ষিণ দিকের এই টন্সিলটার মধ্যতাগে একটা থোবার স্থায় (একটা শিকের মত) পর্দাও ঝালতেছে দৃষ্ট হইয়াছল। এই পর্দাতীর টন্সিলের সহিত সংযুক্ত স্থানটা দেখিতে ক্ষণাভ ছিল। মুখ হইতে হুর্গন্ধও বাহির ইইভেছিল। এই রোগীকে প্রথম ফিরম-ফ্স দেওয়া যায়। পর দিন টক্ষিণটা পরিক্ষার হইয়াছে দেখা গেল, কিন্তু গণ্ড-নালীর পশ্চাক্ষিকে উক্ত

রূপ পদা দৃষ্ট হইল। তথন এই ঔষধ ৪ ঘণ্টা অ**ন্তর সেরনের বিধি** দেওরা হয়। তৎপর দিন ভাহার আর কোন উপদ্রব ছিল না।

(৯) দেড়বংগরের ১টা শিশুর ডিফ্থিরিয়ায় ফিরম-ফ্র ১২ x ও কালী-মিউর ৩ x পর্যায়ক্রমে ঘন ঘন প্রয়োগ করার আতি সম্বর খাসকট ও আর আর উপদ্রবের শাস্তি হটয়া রোগ নির্দোষরূপে সারিয়। গিরাছিল।

Dizziness—ডিজিনেস্। শিরোঘূর্ণন। ভোটিগো দ্রম্ব্য)

ক্যাক্স-ক্রম ১×।—সামবিক প্রকৃতির রোগীর পী লক্ষণের বিশ্বমানতা না থাকিলে, নিয়ক্রমে আহারের অব্যবহিত পর ইহা দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কালী ফ্রন্স ৩×।—ইহা সর্বপ্রকারের শিরোপূর্ণনেই বিশেষ ফল প্রদ।

Dropsy—ভূপসি-শোথ।

(বৃক্কের রোগ এফব্য)

সকের নিমে জল সঞ্চিত হইয়া শরীরের যে স্টাততা জন্মে তাহাকে শোধ বলে। শোথ স্বয়ং কোন রোগ নহে, অক্স রোগের উপসর্গ বিশেষ। ইহা একাঙ্গীন বা সর্বাঙ্গীন হইতে পারে। স্থান-ভেদে ইহার বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে। যথা:—মন্তিকে জল সঞ্চিত হইলে তাহাকে মন্তকের বৃক্তে হইলে বক্ষোদক এবং উদরে সঞ্চিত হইলে উদরী বলে। রক্তের

জনীয়াংশ শিরার ভিতর হইতে বাহির হইরা ত্বের নিমে সঞ্চিত হইলেই উহাকে শোথ বলে। পদ ও তল পেটেই সাধারণতঃ শোথ বেশী দেখা যার। শোথাক্রান্ত স্থানে অঙ্গুলী দ্বারা টিলিদিলে নিম হইরা পড়ে এবং পরে আবার পূর্ণ হইরা উঠে। সাধারণতঃ হুদ্রোগ, যক্তবের পীড়া, বুককের (kidney) পীড়া, প্লীহা ও রজ্ঞাবের বিশৃত্থলা হইতে এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

কালী-মিউল্ল — হড়োগ, ষকতের রোগ অথবা বৃক্ষের (কিড্নি) রোগ হইতে সমুৎপন্ন শোধে শক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ইহাতে অভি উত্তম ফল দর্শে। শোধের জলে অথবা প্রস্রাবের সহিত নির্গত শেরার শুলুবর্ণ এবং জিহ্বায় শুলু বর্ণের লেপ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য। শুণুপিণ্ডের তুর্বলতা হইতে উৎপন্ন রোগে হৃংপিণ্ডের দৃপ্দৃপ্থাকিলে এই শুর্ধ কালী-ফ্সের সহিত পর্যায়ক্রমে দিবে। পিন্তনিঃসাকক প্রণালীর (bile-duct) অববেধ্য জ্বনত শোধে জহ্বার শ্বেত বা পাংশুটে শ্বেত বর্ণের লেপ থাকিলে ইহা ফ্লপ্রদ।

লেউ ম সলক ৩ × 1—সাধারণ শোণ। ইয়া এই রোগের
প্রধান ঔষণ। আভ্যন্তরিক যন্ত্রের বা অকের শোপেও ফলপ্রদ। ক্রও।
লেউমিমিউর।—প্রায় সকল প্রকার সাধারণ শোপেই এই
ঔষধ নেট্রম-সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।
ক্রপ্ত।

ক্যান্ধ-সন্দেক ও ফিব্রুম ফ্রুস .—রক্তহীনতা, রক্তশ্রাব, পরিপোষণের ব্যান্তি প্রভৃতি কারণে শোপ অন্মিলে এই ছই ঔষধ উপকারী। ক্যাৰ-ক্ষোক্ত ।—ছডোগ জনিত শোথে জদপিথের কোনও গহাবের বিভৃতি জন্মিলে ইয়া বিশেষ উপকারী। কুছন, শুরুদ্রব্য উত্তোলনের চেষ্টা প্রভৃতি কারণে কুরগু ক্ষিলে ইয়া ফলপ্রদ।

काली-जलक ।-इति है किवादित भववर्षी (भाष ।

মন্তব্য

মাঝে মাঝে উক্তলতে সান বা উক্ত জলহারা গা মোছান অভিশন্ন উপ কারী। যাহাতে দর্ম আৰু বিবর্দ্ধিত হন্ন সেই সকল উপান্ন অবলম্বন করা বিহিত। এই রোগে জল খাইতে নাই বলিয়া যে প্রচলিত সংস্থার আছে তাহা অমাত্মক। তব্দণ রোগে অন্তর্ম পথা বিবে। আর প্রাতন রোগে পৃষ্টিকর অবচ সহজে পরিপাক হন্ন এক্রপ পথা দেওলা কর্ম্বন। প্রাতন রক্তশালীর অন্ধ, মুগের ডাইল, শলাক্ষ কুক্ট ও কচ্চপের মাংস, সন্ধিনা, কাঁকরোল, মানকচু, গাজোর, পটোল বেতাগ্র, বেশুন, প্রভৃতি তরকারী হিতকারী। অন্ধ দ্বব্য, নৃতন তপুল, চিনি, শুড়, লবণ, শুক্ষ শাক ও দিবানিদ্রা অভিশন্ন অহিতকর।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ৮ বংশরের ১টা বালিকা ডিফ্ থিরিরা ও স্থালা টিনা হইতে আরোগ্য লাভের পর হঠাং কোন পরিদৃশ্রমান কারণ ব্যতীত শোধপ্রত হয়। তাহার মুখমগুল ও পদব্বের স্থীততা ছিল। মৃত্যুলাৰ হাল প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উহাতে এবু মেনও ছিল। কিছু ক্রত, কিন্তু ক্র্যা, নিজা ও মল বাভাবিক ছিল। এই রোগিনীকে ৩টা ঔবধ দেওয়া হইয়াছিল। এই রোগিনীকে ৩টা ঔবধ দেওয়া হইয়াছিল। একোনাইট উহার অম্বতম। কিন্তু ইহাছারা কোন ফলই পাওয়া বার নাই। শোধ ক্রমণঃই বাড়িতে গাগিল, মৃত্রও ক্রিডে লাগিল। এখন ইহা

দেখেতে খোলা ও পরীক্ষার অধিক পারম: প এলুমেন পাওয়া গেল। এথন কিড্নিতে চাপ দিলে বেদনাও বোধ করিত। সময় সময় প্রলাপ বকিত। নেট্ন-মিউয় দেওয়া যায়। হহাতে ১৪ দিনেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ। হয়।

- (২) ৪ বংশরের একটা বালকের স্থালে টিনা রোগের পর শোথ জন্ম। লক্ষণারুদারে ডিজিটেলিস, এপিস, আস ও এপোসাইনম ব্যবহার করা হইয়ছিল, কিন্তু উহাতে কোন ফল হয় নাই। ২৪ ঘণ্টায় অতি সামায় মাত্র মৃত্রজাব হইত শেষের ২ দিন একেবারেই মৃত্র নিঃসারিত হয় নাই। এখন শোথ সক্ষাক্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছল ও নড়াচড়া একেবারেই বন্ধ হইয়াছিল (শোথ এতই বাড়িয়াছিল)। এই অবস্থা দৃষ্টে নিট্রম-মিউর ২ ঘণ্টা অস্তর ব্যবস্থা করা হয় ইহাতে সম্বর্ত গ্রহুত মৃত্রজাব হইয়া বালকটা আরোগ্য হইয়াছিল।
- (০) ডাঃ Goullon কালী-ামটর দ্বারা একটা পদের এবং নিয়াক্ষের ফাঁততা বিশিষ্ট রোগাঁ নিম্নোক্ত লক্ষণ দৃষ্টে আরোগ্য করিয়াছিলেন। লক্ষণ বথ:—পদের ও নিমাক্ষের কোমলতা বিশিষ্ট হর্দম্য ফাঁততা, পরে এই ফ্যনের কঠিনতায় ও চাপে ব্যথিতকায় পরিণতি কিন্তু আরক্ততার এভাব। ফাঁত স্থানের চুলকানি। অবশেষে এই স্থানের মোমের স্থায় উজ্জল শ্বেতাভা ধারণ। পরে ফাঁত স্থানের সকাল বেলা হ্রাস প্রাপ্তি ও সন্ধাকালে বৃদ্ধি লক্ষণ ছিল।

l)ysentery—িড্রেসেণ্টি। আমরক্ত, রক্তাতিসার।

বৃহৎ অন্তের (Large Intestine) ক্ষত সংযুক্ত প্রদাহকে রক্তামাশর বলে। নাভীর চ্যারাদকে বেদনা, কুন্থন এবং আম ও রক্তসংযুক্ত মণস্রাব ইহার প্রধান লক্ষণ। কথন কথন মলপ্রাবের পরিবর্ত্তে কেবল আম ও রক্তন মাত্র পরিত্যক্ত হইরা থাকে। উৎকট আকারের রোগীর গাত্র চইতে এক প্রকার বিশেষ মুর্গন্ধ বাধির হইরা থাকে। রোগ কঠিন হইলে হিকা, অসাড়ে মল নিঃসরণ, হস্ত-পদের শীতলতা ও প্রলাপ বিভয়ান থাকে এবং অভিরিক্ত কুম্বন বশতঃ কাহাম্মও বা হালিশ বাহির চইয়া পড়ে। শুক্রপাক্তরব্য ভোজন, গরমের পর হঠাৎ ঠাওা অথবা ঠাওার পর হঠাৎ গরম লাগিয়া সাধারণতঃ এই রোগ ক্রমিয়া থাকে। শিশুদিগের উদরামর এবং হাম নিলোপের পর্যও এই রোগ প্রকাশ পাইতে পারে।

(চিকিৎসা)

স্যাক্তে বিশ্বা হা তি বাব প্রাণ প্র মান্তান ও আক্ষেপবং বেদনার সংযুক্ত রক্তাতিসার। উঠাপ প্রয়োগ ও সন্মুথদিকে ক্বনীর্য হইলে বেদনার উপশ্ব। অভিশন্ধ কুম্বন ও প্নঃ পুনঃ মলপ্রান্ত। গরম কলের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া মলঘানে পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কালী-কি ভার।—প্রথম ইইতে চিকিৎসা করিলে এই ঔষধের সভিত পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফস বাবহার করিলে স্ট্রনায়ই রোগারোগ্য করা যাইতে পারে। পুন: পুন: মলবেগ, কুন্থন এবং ভয়ন্তর উদর বেদনা বিশিষ্ট রক্তাতিসার। আঠা আঠা মালন দীত ও পুষ্বৎ শ্লেমাস্রাব:

হিচরতা হচতা।—জর ও প্রাদাহিক বেদনা দর উপশমার্থ কালী-মিউরের সহিত প্রধায়ক্রমে। উত্তপ্ত ও জলবং মল।

কালৌ হাজন।—পচা, গর্গন্ধ বুক্ত মল এবং শুক্ষ জিহবা। মলধার দিয়া উচ্চল লোহত রক্তপ্রাব। রোগী প্রশাপ বকে। উদরের স্ফুরিতা। প্রবল কৃত্বন

ক্যান্ত-তলহা । —পূব ৎ শ্লেম অথব, ১ক্তমিশ্রিত শ্লেমা প্রাব। কালী-মিউবের পর এই ঔষধ ভাল খাটে।

भथा। भथा।

শীতল জল, বেলের মণ্ড, শটার পালো এরোরট, থালি, চিড়ের সরবৎ বোল প্রভৃতি এই রোগে ভপথা জর ন' থাকিলে ভাতের মণ্ড, গন্ধ-ভাদাি রার ঝোল, শিং ও মাণ্ডরমাছের ঝোল, থানকনি পাভার ঝোল, প্রভৃতি পথা দেওয়া বার। কমলা লেবুও দাড়িম (ডালিম) এই রোগে আতশ্য উপকারী।

চিকিৎসিত রোগী।

- (১) ডাঃ হংক্রক ১টী রক্তাতিসারের রোগীকে ক্যাক্সলফ C. M,
 শক্তি প্রয়োগ করিয়া অনেক উপশমিত করেন। ঐ রোগ গরে গৈতিক প্রকৃতির অভিসারে পরিণত হইলে নেট্র্য-সলফ C. M. শক্তি ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করেন।
- (১) জনৈক রোগিণীর ভয়ন্তর কুন্থন, পেটকামড়ানি এবং অবিরত মল ও মূত্রবেগ ছিল। যথনই উদর বেদনা উপাহত হইত তথনই উঠিয়া বিদ্যা সমূধদিকে অবনত হইয়া পাকিতে হইত। উষ্ণ জল ব্যতীত আর কিছুতেই বেদনা উপশ্যাত হইত না। ম্যাগ ক্স ২০০× ৩ মাত্রা ব্যবহারেই স্কল উপদ্রব দূর হইয়াছিল।
- (৩) ডাঃ লিওনার্ড ম্যাগ-ক্ষপ বারা একটা রক্ষাতিসারের রোগাতে আশ্চর্যা ক্ষণপ্রাপ্ত হণ্যাছিলেন। রোগীর লক্ষণ এই:—লক্ষণদৃষ্টে মার্ক-কর বিশেষ উপযোগী মনে করিয়া উহাই বাবস্থা করা হয়। উহাতে মললক্ষণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল কিন্ত উদর বেদনা উপশমিত না হহয়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইডেছিল; এমন কি, বেদনার মৃদ্ধি পর্যান্ত জান্মবার উপক্রম হইয়াছিল বেদনা উদর অপেকা মলবারে বেশী ছিল। মলত্যাপ কালে বেগ নিতে পেশীর প্রবল আক্ষেপ বা সঙ্কোচন জান্মত। ম্যাগ-ক্ষপ উক্ষ জালের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেওরা যার। ইহাতে

৩০০ বাইওকেমিক চিকিৎসা-প্রদর্শিক।।

এত ফ্রত বেদনা কমিয়া যায় যে, মর্ফিয়ার হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকসনও এত শীঘ্র ফল পাওয়া যটিত না। ১ মাত্রা ঔষধ সেকনেই কোগী আবোগা হয়।

Dysmenorrhoea—ডিস্মেনোরিয়া। বাধক বেদনা; কফ রজঃ

ঋতৃকালে উদরে অত্যন্ত বেদনা জন্মিলে তাহাকে রজঃশূল বা বাধক বেদনা বলে। জরায়্র অত্যান্ত বেদনার তার এই বেদনাও কোমরে ও তলপেটে অত্মভূত হইয়া থাকে। বাধক বেদনায় সাধারণতঃ বেদনা সহকারে অতি অল্প পরিমাণ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও অধিক পরিমাণ রক্তও স্রাব হয়। কোন কোন স্ত্রীলোকের বাধক সহকারে সর্বাঙ্গে বেদনা, উদরের বাম পার্শ্বে বেদনা এবং বমন বা বমননেচছার ভাব বিজ্ঞমান থাকে। অতি মৈথুন, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, শ্বেত প্রাণ্ধর প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। বাধকদোষ বশতঃ বন্ধ্যাত্ম জনিয়া থাকে। স্করাং এই রোগ জন্মিলে শিল্প শীল্প চিকিৎসা করা সঙ্গত। উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বহু স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্মদোষ দূর হইয়া প্রভ্ রক্ষা হইয়াছে।

চিকিৎসা

ফিল্লাম-ফস ১২ × 1—মুখমগুলের আরক্ততা, ক্রুতনাড়ী, কখন কথন অপরিপাচিত দ্রব্য বমন সহকারে ভয়ঙ্কর বেদনাসহ উজ্জ্বল লোহিত রক্তপ্রাব। বিল্লীক পদার্থপ্রাবী বাধক বেদনা। ঋতুকালে জরায়ুতে অতিশয় রক্তসঞ্চয়; যোনির শুষ্কতা ও অতিশয় স্পর্শানুভবতা। এই প্রকার

লক্ষণ বিশিষ্ঠ স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন রোগে ঋতুর পুর্বে ফিরম-ফস ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কালী-ফস ও ক্যান্দ-ফলের সহিত পর্যায়ক্রমে এই উষধ ধৈর্য্য ধরিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে। অতিশয় আক্রেপিক বেদনা থাকিলে ম্যাগ্রেশিয়া-ফস অবশ্রুই দিবে।

বাদেশ বিদ্যা হা সি ২ — বাধক রোগে অতিশয় আকেপিক বেদনা থাকিলে ইহা প্রধান উষধ। ঋতুপ্রাবের কিছু পূর্বের বা প্রাব সহ বেদনার প্রকাশ। উষ্ণুতার উপশম। বেদনাকালীন উক্ষজ্ঞলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন, এবং যতদুর গরম সহ্য করা যায় তত গরম জলের সহিত করিয়া কেবন, এবং যতদুর গরম সহ্য করা যায় তত গরম জলের সহিত করিয়া তাহাতে নেকড়া খণ্ড ভিজাইয়া নিমোদ্রে (জরাযুর উপর) পটী দিবে।

কালৌ ফল ৩ × ।—পাগুর মুথাক্ততি অশ্রন্তাবপ্রবণ এবং সহজে জোধের আবেশ হয় এরপ সায়বী এপ্রকৃতির রোগিণীদের বাধকে বিশেষ উপযোগী ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে দিবে। উজ্জ্বল লোহিত বা মলিন লোহিত রক্তপ্রাব।

ু(চিকিৎসিত রোগী)

- (১) একটা রোগিণীর ভয়ত্বর বেদনা বিশেষ্ট বাবক ছিল হোমিও-প্যাথিমতে এই রোগে ব্যবহার্য্য কোনও ওষধ ব্যবহার করিতে বাকী ছিল না। কালী-ফদ ৬× সেবনে তাহার রোগ স্থায়ীরূপে আরোগ্য হয়।
- (২) ২২ বংসর বয়য়া জনৈক রমণী যৌগনের প্রারম্ভ ছইতে প্রতি
 মাসেই রক্তঃশ্লে ভূগিতে ছিলেন। রক্তঃশ্রাবের করেক ঘণ্টা পূর্বর ছইতেই
 জরাষু কোমর এবং উক্তে ভয়য়য় বেদনা হইত। রক্তঃশ্রাবের প্রথম দিন
 বেদনার এত প্রাবল্য থাকিত যে, উহা প্রায় অসহ্য বলিয়া মনে ছইত এবং
 হিষ্টিরিয়া জিমিবে বলিয়া আশকা ছইত একবার এই বেদনার সময়

আমাকে ডাকা হর। গিয়া দেখি রোগিনী শুইয়া আছেন, গরম জলে পা
চুবাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তলপেটে ফ্লানেল গরম করিয়া সেক দেওয়া
হইতেছে। কিন্তু ইহাতে বেদনার লাঘব কিছুই হইতেছে না। ইহা দেখিয়া
তৎক্রণাৎ আমি য়্যাগ-ফ্লম ৬× বৃহৎ মাত্রায় থাইতে দিলাম। অর্জ্বঘন্টার
পূর্ব্বেই বেদনা দূর হইল। আবার আর একমানা দিলাম। ঔবধ দিতে না
দিতেই রোগিনী স্কুছ হইলেন এবং রজ্ঞারা আর্ছ্ক হইল। পরের
মালে ঋতুপ্রাবের পূর্ব্বিদিন এই ঔবধ ৩ বার এবং ঋতুর ৩ দিন
প্রত্যাহ ২ ঘন্টা অস্তর ইহা ব্যবহার করিতে ব্যবহা দিলাম। এই
মালে আদ্বো বেদনা হয় নাই। তৎপরত্তী মানেও এই ঔবধ এই প্রকারে
থাইতে ব্যবহা করিলাম। ইহার ফলে রোগিনীর আর কোন উপদ্রবই
উপস্থিত হয় নাই ৩ বংসর যাবৎ ভালই আছেন।

- (৩) এক রোগিণীর প্রতি ঋতুকালে ১ হইতে ২ ইঞ্চি লম্বা ১টী পর্দা নির্গত হইত। ঋতু কালীন লক্ষণ:—রজ্ঞাবিত হইবার পর তলপেটে তীব্র তির-বিদ্ধবৎ বেদনা, উষ্ণজ্জলের ব্যাগ উদরে প্ররোগ করিয়া বক্র হইয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ উপশম প্রাপ্তি। বেদনার তীব্রতা কমিলে পর ২।১ দিন পর্যান্ত অবিরাম মৃত্র বেদনার অবস্থিতি এবং তৎপর দিন অথবা তৃতীয় দিন পূর্ব্বোক্ত প্রকার পর্দা (মেম্বুণ) নিঃসরণ। একবার ঋতুপ্রাবের পর আমি তাঁহাকে ক্রমান্বরে ২ দিন প্রাতে ও রাত্রে ম্যাগ-ফল C. M. শক্তি থাইতে দেই। পরবর্তী মাসে ঋতুকালে তাঁহার বেদনা থুব কম হয়রা ছিল। ইহার পরের মাসে বেদনা একেবারেই ছিলনা, কিন্তু পূর্ববৎ পর্দা নিঃস্ত হইয়াছিল।
- (৪) ডাঃ Whittier প্রায় ৬ মাস পর্যান্ত কালী-ফস প্রয়োগ করিয়া ১টা ১৫ বৎসরের পুরাতন বাধকের রোগিণীকে আরোগ্য করেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসার এবং স্থপ্রযুজ্য ছোমিওপ্যাথিক ঔষধে ভাহার

কোন ফলই দশে নাই। রোগিণীর নিমোক্ত লক্ষণ সমূহ বিগুমান ছিল:—
ন্তনের এত ব্যথিততা যে কাপড়ের চাপও অসহ্য বোধ চইত। ঋতুকালে
তলপেটে যোচড়ানবং বেদনা এবং যোনিদ্বার দিয়া উপরস্থ সকল বাহির
হুইরা পড়িযে এরপ আবেগ অমুভব ছিল। ঋতু প্রবাহিত হুইবার পরহ
বেদনার প্রাবল্য জন্মিত। বেদনা যখন চঃমে উঠিত, তখন নিমোদর
হুইতে উপরের দিকে পাকস্থলী পর্যান্ত এক প্রকার তাঁত্র আক্ষেপিক
বেদনা সঞ্চারিত হুইত। যখনই এইপ্রকার বেদনা উপস্থিত হুইত
তখনই পিত্ত অথবা ফেণিল অমু পদার্থ (কখন কখন রক্তসংযুক্ত) বমি
হুইত। প্রথমে একপ্রকার মাথাধরা ছিল, পরে উহা বাম চক্ষুর উপর
স্থায়ী হয়। বখন মাথাধরা উগ্র আকার ধারণ করিত তখন অলুস্থানের
বেদনার মৃত্তা থাকিত এবং যখন মাথাধরা একটু কম থাকিত তখন
অলুস্থানের বেদনার প্রাবল্য জন্মিত

- (৫) আর এক রোগিণীর করেক বৎসরের পুরাতন বাধক বেদনা ছিল;
 প্রতি মাসেই ঋতুকালে তাঁহার জরায়ু হইতে ১—২ ইঞ্চি লখা পর্দা নির্গত
 ছইত। আব প্রবাহিত হইবার পরই এ রো:গণীরও তলপেটে ভরঙ্কর বেদনা
 উপস্থিত হইত এবং গরমজলের ব্যাগ পেটে স্থাপন করিয়া বক্র হংরা
 ভইয়া থাকিতে হইত। বেদনা ১ দিন মাত্র পাকিয়া তৎপর দিন অংবা
 তৃতীয় দিন পুর্বোক্তরূপ পর্দা নির্গত হইত। ঋতুর পর এই রোগিণীকে
 ১ মাত্রা ম্যাগ-ফ্রন্স লে শুঞ্চাকারে থাইতে দেওয়া যায়। পরবর্ত্তী মাসিক
 ঋতু তত কন্তপ্রদ হইয়াছিলনা পরে এই উয়্থই ২ দিন মাত্র জলের সহিত
 প্রাত্তে ও রাত্রে থাইতে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরবন্তী ঋতুকালে
 পূর্বোক্তরূপ পর্দা নির্গত হইয়াছিল বটে কিন্তু বেদনা মোটেই হয় নাই।
- (৬) অন্ত এক রমণীর ঋতুকালে পাকস্থলীর অভ্যস্তরে ভয়ঙ্কর তিরবিদ্ধবং সাযুশ্লের ন্থায় বেদনা হইত। এই বেদনা ১ — ২ দিন স্থায়ী

হইত। বেদনা পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া ঘৃড়িয়া আসিয়া পাকস্থলী প্রদেশে নিবদ্ধ হঠত। উষ্ণ দেক ও চাপে এই বেদনা একটু উপশ্যিত হইত। মান্ত-ফস ১০ এম্ ১ মাত্রা সেবনেই উহা সম্পূর্ণক্রপে আরোগ্য হয়; আর কথনও প্রকাশ পায় নাই।

Dyspepsia — অগ্নিমান্দ্য।

(আমাশয়ের বিশৃখলা দ্রষ্টব্য)

Ear, Diseases of—কণ রোগ।

(চিকিৎসা)

ফিল্লাম ফল।—প্রাদাহিক অবস্থায় জর ও বেদনা থাকিলে।
দপ্নপ্কর ওজালাকর বেদনা। চিঙিক ারাবা স্চিবেধবং বেদনা।
বাহ্য ইষ্ণতায় ও আভ্যস্তরিক শাতলতায় বেদনার উপর্শম। কর্পে নানা
প্রকারের শব্দ। কুইনাইন সেবনের পরবর্ধী কর্ণনাদের স্থায় কর্ণনাদ।
প্রতি হৃৎস্পুন্দনে কর্ণের ধমনা সকলে দপ্দপ্। কণ্রের প্রতিন প্রদাহ
জন্ম ব্ধিরত। কর্ণের প্রধাবন জন্ম ঘণ্টা ধ্বনির স্থায় শব্দ।

ব্যাকনী- ি উল্লালি । তালি তালি বা বালি পুরু হইয়া বিধিরত। উৎপন্ন হইলে ইছা অতি উংক্ট ঔষধ। ইষ্টিকিয়ান টিউবের ফাততা বশতঃ অথবা কর্ণ-মূল গ্রন্থির ফাতত, বশতঃ বধিরতা। নিঃখাস-প্রখাসের সময় অথবা কোনও বস্তু গিলিবার কালে কর্ণে চড় চড় বা কড় কড় শকা। গল গ্রন্থির বা কর্ণ গ্রন্থির ক্ষাত্তা বশতঃ কর্ণ বেদনা। জিহ্বায় গেত বা পাংগুটে খেতবর্ণের লেপ। মধ্য-কর্ণের প্রতিশ্রায় জ্ঞ খেতব্ণের প্রাব নিঃসর্ণ। বাহ্য বা আভ্যন্থরিক কর্ণের প্রাতন প্রদাহ।

কালী-ফস।—সায়বিক হ্র্লেডা জনিত কর্ণনাদ ও ঝার্ডা।
সায়শক্তির অভাব জনিত ব্ধিরতা। মন্তকে নানাপ্রকার শব্দ, হ্র্লেলতা ও
গোলমাল। কর্ণে ক্ষত ও উহা হইতে হর্ণন্ধ, পাতলা রসাণি করণ।
কর্ণের শীর্ণতা, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের।

ম্যাগ-ক্ষস।—অভিটারী স্নায়র হর্বলতা বশতঃ বধিরতা বা শ্রুতি ক্ষীণতা। কালী-ফসের লক্ষণ বিশিষ্ট রোগে উহা প্রয়োগ করিয়া উপকার না হইলে ম্যাগ-ফস ব্যবহার করিবে। স্নায়বীয় প্রকৃতির কর্ণশূল। কর্ণের স্নভাস্তরে ও চতুর্দ্দিকে স্নায়শূলের স্থায় বেদনা।

কালী-সলফ।—কর্ণশূল সহকারে পাতলা হরিদ্রাবর্ণ প্রাব নি:সরণ।
কর্ণের প্রতিশ্রায় সহকারে পাতলা পীতবর্ণ অথবা হরিতাভ পৃষ্প্রাব (অপিচ,
প্রতিদিন এই ঔষধের লোশন দ্বারা আভ্যস্তরিক পিচকারী প্রদান)।
কর্ণের নিম্নে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবং বা স্থাচকাবিদ্ধবং বেদনা। টিম্পোনিক কেভিটির
ফীততা বশত: বধিরতা।

ক্যান্ত্র-ফ্রস। — বাহ্ কর্ণে শীতলভামূভব। কর্ণের চতুদ্দিকস্থ অন্থিতে আঘাতিতবং বেদনা। গগুমালা ধাতুর শিশুদিগের কর্ণশূল ও তৎসহকারে আমবাতের লক্ষণের বিশ্বমানভা, ও গ্রন্থির স্ফীতভা। পুরাতন কর্ণপ্রাব (ওটোরিয়া)।

নেট্র-মিউর ।—কর্ণ গহবরের ক্ষীততা বশত: বধিরতা ও জলবং প্রাথ নিস:রণ। কুইনাইন সেবনের পরবর্ত্তী কর্ণনাদ নিবারণে ইহা বিশেষ উপযোগী। জিহ্বায় প্রভূত জলবং ও ফেণিল লালা।

ক্যান্ত্র-সলফ।—পীতবর্ণ গাঢ় পৃযন্তাব সহকারে বধিরতা। কখন কথন এই পুষের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। এই ওষধ প্রয়োগ করিলে পুযন্তাব বন্ধ হয়। সিলিশিয়ার সহিত তুলনা করুন। সৈলিশিয়া।—কর্ণের বাহ্নগহররের (এক্সটার্ণ্যাল মিট:স)
প্রাদাহিক ক্ষীততা। কর্ণ হইতে হুর্গন্ধি পূথ নিস:রুণ। ইষ্টেকিয়ান টিউবের
ক্ষীততা ও প্রতিশ্রায় সহকারে শ্রুতি ক্ষাণতা ও এই ঔষধের বিশেষত্ব
জ্ঞাপক প্রাব নি:সরণ।

নেট্রস-ফ্স।—বাহ্ কর্ণেক্ষত ও উহাতে পাতলা সরের ন্থায় মামড়ি। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য। কর্ণের আরক্ততা, উত্তপ্ততা ও সর্বাদা কণ্ডুয়ন এবং তৎসহকারে আমাশয়ের বিশৃষ্থালা ও অম্ল রোগ।

(চিকিৎসিত রোগী)

- (১) একটি রোগীর দক্ষিণ কর্ণের অভ্যস্তরে বেদনা জন্মিয়া পরে স্রাব নির্গত হইতে থাকে ও অবশেষে বধিরতা জন্ম। স্রাব নির্গত হইবার পর কর্ণ-নলী খুব সরু হইয়া পড়ে। স্রাবের প্রকৃতি তন্তুময় (flaky) ছিল। কালী মিউর ৩× কথেক দিন ব্যবহার করায় স্রাব বন্ধ ও ১ সপ্তাহ মধ্যেই, শ্রুতিশক্তির পুন: প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। একন, পলস, মার্ক সল, হাইড্রাস ও সলফার সেবনে বিশেষ কোল ফল হইয়াছিল না।
- (২) ৯ বংশর বয়য়া ১টা বালিকার বিধরতা জন্মে। রোগের ইতিহাস
 এই:—৫ বংশরের পূর্বে তাহার মাঝে মাঝে প্রবল জর ও তংশহ মাথাধরা
 ও কর্ণশূল উপস্থিত হইত। ইহার পরই গ্রীবার পেশর ক্ষীততা ও আড়প্টতা
 উৎপন্ন হইত। প্রথম প্রথম এইরূপ রোগের স্থিতি কাল এক একবার
 ১-৩দিন থাকিত কিন্তু রোগ যতই পুরাতন হইতে লাগিল রোগের স্থিতিকাল
 ও তীব্রতা ক্রমেই বাড়িতে থাকিল। আমি যথন প্রথম রোগা দেখিতে
 ঘাই তথন রোগিণী প্রায় ০ সপ্তাহ যাবং শ্যাগত ছিল ও ইহার
 ৩ বংশর পূর্বে হইতেই তাহার শ্রুতিক্ষীণতা জন্মিয়াছিল। তাহার অবস্থা
 জানিবার জন্ম তাঁহার সহিত আমাকে চেঁচাইয়া কথা কহিতে হইত।

আমি তাহাকে প্রথমে ৩ মাস পর্যান্ত প্রত্যাহ কম মাত্রায় কালী-মিউর ৩×
৩ বার ও ম্যাগ-ফস ৬ × ৩ বার করিয়া সেবন করিতে বিধি দেই।
পরে প্রত্যেক ঔষধ প্রত্যাহ ২ বার করিয়া ব্যবহার করিতে বলি। ইহার
পর স্থানর ফল দেখা যাইতে লাগিল। রোগিণীর যে পূর্বের জরের
আবেশ ইত্যাদি হইত তাহা একেবারেই বন্ধ হইল এবং শ্রুতিশক্তির উৎকর্ষ
জন্মিয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল।

- (৩) ডাঃ Weanstall ৩টা রোগীর মধ্য-কর্ণের তরুপ প্রদাহ জনিত উচ্চ জ্বর, উগ্র কর্ণবেদনা ও প্রশাপ, ফিরম-ফদ ৩× —১২× প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ।
- (৫) স্ক্রফিউলাধাতুর একটা বালিকার দক্ষিণ কর্ণ হইতে কটাবর্ণের বির্দ্ধিও চর্গন্ধ প্রাথ নির্গত হইত। কর্ণ-নলের বাহুহুংশে ১টা মাংসল বির্দ্ধিও (গ্রোথ) ছিল। ৮ সপ্তাহ যাবৎ সে এই কর্ণে কিছুই শুনিতে পাইত না। কালী-সলফ ১২ × ব্যবস্থায় ২ সপ্তাহ মধ্যেই প্রাবেব হুগন্ধ একেবারে দূর হয় এবং পূর্বোক্ত পলিপাসটা ক্ষিয়া ক্লফ্রবর্ণ, শক্ত একটা শুটির মত হয়। ইহার পর প্রতি তৃতীয় দিবস ২ মাত্রা করিয়া উক্ত ঔষধ সেবনে রোগ সম্পূর্ণন্ধপে আবোগ্য হয়।
- (৫) ৪ মাসের ১টা শিশুর কান পাকিয়াছিল। এক কান হইতে ক্ষতকর, হুর্গন্ধি পাতলা পূষ নি:স্ত হইত। এই পূষ চন্দের যে স্থানে লাগিত তথায়ই এক প্রকার উদ্ভেদ (ফুস্কুডি, ইর:প্সন) উৎপন্ন হইত। কালী-ফস ৬× প্রতি ৬ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়। ৩ মাসে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

Eczema — পামা।

(চর্ম্মরোগ দ্রষ্টবা)

কালী-মিউর।—শিশুদিগের মন্তক ও মুখমগুলের শব্ধবিশিষ্ট শামা। মৃত্র-বন্ধের বিকার বশত: উৎপন্ন শামা রোগ। ত্বক হইতে এবুমেনের স্থায় রস আব ও তৎসহ জিহ্বায় শুল্র বর্ণের লেপ।

Endocarditis – হৃদন্তর-বেষ্ট-প্রদাহ।

(হুদ্রোগ-দ্রম্বব্য)

Enuresis — অবারিত মূত্র।

(মৃত্র যন্ত্রের রোগ দ্রস্টবা)

ফিরম-ফস।—মুত্রমার্গের মৃথ-রোধক পেশীয় ত্র্বলভা জনিত অবারিত মৃত্রপ্রাব। নিজাকালে শয্যায় মৃত্রভ্যাগ, বিশেষতঃ শিশুদিগের। পেশীর ত্র্বলভাজনিত স্ত্রীলোকদিগের রাত্রিকালীন শয্যায় মৃত্রভ্যাগ; প্রতি কাসেই মৃত্র নির্গত হয়।

ক্যাল্ক-ফস।—শিশু ও বৃদ্ধদিগের অবারিত মূত্রত্যাগ। লক্ষণের সহিত সাদৃশু থাকিলে এই রোগে কালী ফসও ব্যবহৃত হয়।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ৩৪ বংসর বয়স্ক। জনৈক স্ত্রীলোক প্রায় ৩ বংসর যাবং এই রোগে ভূগিভেছিলেন। রাত্রিভে তাঁহার মূত্রবেপ ধারণে ক্ষমতা ছিল, কিন্ত দিনে পারিতেন না। দিনে যখনই বেগ জন্মিত তখনই অনিচ্ছায়
অধিক পরিমাণ মূত্র নির্গত হইত। আর আর বিষয়ে তাঁহার স্বাস্থ্য মন্দ
ছিল না। ফিরম-ফস ৬× দিনে ৪ বার করিয়া সেবনে রোগ আরোগ্য
₹য়।

- (২) একটা রোগার অবারিত মৃত্র কালী-ফস সেবনে আরোগ্য হয়। এই রোগীকে দিনে ৩।৪ বার করিয়া এই ঔষধ দেওয়া হইয়ছিল। আর একজন ৬০ বৎসর বয়য় বৢদ্ধের অবারিত মৃত্র ও sphincter পেশীর পক্ষাঘাত জনিত রোগ এই ঔষধে অতি সত্তর আরোগ্য হইয়ছিল।
- (৩) ক্যান্ধেরিয়-ফস ব্যবহারে এই রোগাক্রান্ত বহু রোগী আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। শিশু ও বৃদ্ধদের অবারিত মৃত্রে ইহা specific বা অমোঘ ঔষধ বলিলেও প্রায় অত্যুক্তি হয় না; ৬ বৎসর বয়স্ক এক বাল-কের এই রোগ কিছুতেই আরোগ্য না হওয়ায় শেষে ক্যান্ধ ফস ৩× প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর এক এক মাত্র। দেওয়ায় অতি শীঘ্রই উপকার হয়। ৭৯ বৎসরের এক বৃদ্ধের এই রোগও ক্যান্ধ-ফস ৩ × ৩ ঘণ্টান্তর এক একবারে ৪টি করিয়া ট্যাবলেট ব্যবহার করায় ৬ সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

Epilepsy — এপিলেপ্সি। মুগী, অপস্থার।

হঠাৎ মূর্চ্চা বা সংজ্ঞাশৃত্যতা এবং পেনাসমূহের আক্ষেপ এই রোগের পরিচায়ক লক্ষণ। রোগের আক্রমণ উপস্থিত হওয়া মাত্র চৈতন্ত ও শক্তির বিলোপ জন্মে। রোগী দাঁড়ান থাকিলে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যায়। সাধারণতঃ রোগের আবেশের পূর্ব্বে রোগী চিৎকার দিয়া থাকে। রোগের ভোগকালে অঙ্গ প্রভাঙ্গের অভিশব্ধ আক্ষেপ (spasm), তুর্বলভা, ভয়, ক্রোধ, ক্রিমি, রক্তাধিক্য, অভিশব্ধ মানসিক এবং শারীরিক উত্তেজনা ও মুথের বিকৃতি জন্মে। কপাল কুঞ্চিত এবং চক্ষু স্থির ও অক্ষিপুটের নিম্নগত হয়। এজন্ম চক্ষুর খেতাংশ মাত্র দেখা যায়; অক্ষিগোলক ঘূর্ণিত, চক্ষুর তারা প্রসারিত ও আলোক-জ্ঞান বিবর্জিত হয়। বাহু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত. খাস আয়াসিত ও ক্ষত্মপ্রায় হইয়া উঠে। দস্তে দস্তে ঘর্ষণ, জিহ্বা দংশিত ও মুখ হইজে কেণা নির্গত হয়। রোগের আবেশের পর গভার নিদ্রা জন্মে। কুলদোষ, অভিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনা এবং স্ত্রালোকদিগের ঋতুর গোলযোগ এই রোগের উদ্দীপক কারণ।

(চিকিৎসা)

কালীমিউর।—ইহা এই রোগের প্রধান প্রষধ। খেত স্থবা পাংশুটে খেত লেপারত জিহ্বা। চর্মা-রোগাদি বসিয়া যাইবার ফলে পীড়ার উৎপত্তি।

ফিরম ফস।—মস্তকে রক্তের প্রধাবন সংযুক্ত মূর্চ্চায় এই রোগের প্রধান ঔষধ কালা-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

কালী ফুস।—আক্ষেপ ও হস্ত-পদাদির খেঁচুনি। হস্তপদাদির আড়ন্টতা; মস্তকের পশ্চাদিকে অবনতি, মৃষ্টিবদ্ধতা ও দাত লাগা। ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত পরিচালনা জন্ম রোগের আক্রমণ। খেঁচুনির উপশম না হওয়া পর্যান্ত উষ্ণ জলের সহিত পুনঃপুনঃ ম্যাগ্য-ফুস প্রদান করা একান্ত কর্তব্য।

ম্যাগ-ফস।—হস্ত-মৈথুনাদি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত পরিচালনার কুফলে উদ্রিক্ত রোগ।

নেট ম-সলক । —ক্বিজনিত রোগে, এই রোগের প্রধান ঔষধ কালী-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। সিলিশিরা।—রাত্রিকালে বা শুক্লপক্ষের প্রারম্ভে রোগ উপস্থিত হুইলে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(চিকিৎসিত রোগী)

- (১) ৪৫ বংসর বয়য় জনৈক ব্যক্তির ১৮৮৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এক প্রকার চয়্ম রোগ প্রকাশ পায় এবং ১৮৮৯ সনের আগন্ত মাসে বিলুপ্ত হয়। ঠিক এই সনেব নবেম্বর মাস হইতেই লোকটার মধ্যে মধ্যে ম্র্ছার আবেশ হইত। ফিটের পূর্বের তাহার মৃথমণ্ডল পাত্রু বর্ণ ধারণ করিত পরে উষ্ণতা অন্তভ্ভব এবং তংপর মস্তক পৃষ্ঠে বেদনা ও পাকস্থলীতে জালা অন্তভ্ভব সহকারে থিচুনি (pasm) আরম্ভ হইত। নকা, বিউফো, আর্স. প্রভৃতি ঔষধে কোনও ফল হইয়াছিল না। অতঃপর বিলুপ্ত চয়্মরোগের কৃফলে এই রোগ জন্ময়াছে মনে করিয়া কালী-মিউর ৬×ব্যবস্থা করা যায়। ৬ দিন ঔষধ ব্যবহাব করিবার পর আব ঐ রোগের আবেশ জন্ম নাই।
- (২) ৪২ বংশর বয়য় একটা লোক ৩৫ বংশর যাবং মৃগী রোগে ভূগিতেছিল। কোন প্রকার চিকিৎসায় কিছুই হইয়ছিল না। এই রোগীকে প্রভাহ প্রাতে ক্যাল্ক ফদ ৪ গ্রেণ কিঞ্চিৎ জলের সহিত, এবং ম্যাগ-ফদ ও কালা-ফদ প্রত্যেকটা ১২ গ্রেণ ২টা পৃথক মাসে অর্দ্ধ মাদ জলে মিপ্রিত করিয়া পর্যায় ক্রমে সমস্ত দিনে সেবন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া য়ায়। একমাদ পরই বিলক্ষণ উপকার দেখা গিয়াছিল। এইরূপে ঔষধ ব্যবহারের পর, মাদে একবারের বেশা আর রোগের আবেশ হয় নাই। উক্তরূপে আরও কতক দিন ঔষধ ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণ আরোগা হইয়াছিল।

Epistaxis—এপিদ্ ট্যাক্দিস্। নাদিকা হইতে রক্তপাত।

ক্ষিব্রম-ফস।—নাদিকা হইতে উজ্জ্বল-লোহিত রক্তপাত বিশেষত: শিশুদিগের।

কালী-ফস।—বৃদ্ধ ও হর্মণ ব্যক্তিদিগের রোগ। পচা, কুষ্ণবর্ণ বুক্তপ্রাব।

Erysipelas—ইরিসিপেলঃস। বিসর্প।

চর্মের কোন অংশের প্রসারণনাল প্রদাহকে বিসর্প বলে। বিসর্প গ্রই প্রকার। স্বয়স্ত্রত (ইডিওপ্যাথিক) ও আভিঘাতিক (ট্রমেটিক)। স্বয়স্ত্রত বিসর্প শরীরগত কারণ হইতে উৎপর হয় এবং সাধারণতঃ মুখমগুলে ও প্রীবাদেশে প্রকাশ পায়। আভিঘাতিক বিসর্প উপঘাতে জন্মে, স্তরাং শরীরের যে কোন স্থানে প্রকাশ পাইতে পারে। চর্মের প্রদাহিত ও প্রসারিত আরক্ততা, ফীততা, স্পর্শবেষ ও জালা এবং যাতনাজনক আরুষ্ঠতাইহার প্রধান লক্ষণ।

এই রোগে রোগাকান্ত স্থানের চর্ম্মের বর্ণ আরক্ত বা বেগুণি থাকে, কিন্তু চাপিলে সাদা হয়, এবং পুনরায় ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্ব বর্ণ প্রাপ্ত হয়। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় কম্প, অবসন্নতা, শিরংপীড়া, জ্বর এবং বমন, অভিসার অথবা কোঠবদ্ধ থাকে; অনস্তর কৃদ্র কৃদ্র কোদা জন্মে ও তাহা হইতে এক প্রকার পীতবর্ণ আব নিঃস্ত হয়। ইহা সংক্রোমক রোগ।

চিকিৎসা।

বিশ্বম কস—প্রথম বা প্রাদাহিক অবস্থায় জর, জারক্তভা ও বেদনা নিবারণের ইহা সর্ব্ব প্রধান ওবধ। গোলাপি বর্ণের বিসর্প। আভাস্তরিক ও বাহা প্রযুজা।

নেট্রম-সলফ-পিত্ত বমন, বা তংপরিশূন্নতা, ও ত্বকেব বেদনাকর ক্ষীত্তা, মহণতা, চাকচিক্য, আরক্ততা এবং সিড্সিড্বা ঝিড্ঝিড্অফুভবে ইহা প্রধান ঔষধ।

কালী-মিউর।—জলবং রদপূর্ণ বিদর্পের ইহা প্রধান ঔষধ।
ফির-ফদ সহ পর্য্যায়ক্রমে।

কালী-সলফ।—ফোস্কার ন্তায় বিদর্পে নৃতন চর্ম উৎপাদন করিতে অদ্বিতায়।

নেট্র ম-ফস।—নেট্রম-সলফের ভার লক্ষণ।

চিকিৎসিত রোগী

- :>) ৫৬ বংসর বয়স্ক একব্যক্তির মুখমগুলের বিসর্পে পর্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও নেউম-সলফ সেবন, ফিরম-ফসের স্থানিক প্রয়োগ এবং মধ্যে মধ্যে কালী-মিউর সেবনে আরোগ্য হইয়া ছিল।
- (২) জনৈক বিধবার এই রোগ জন্ম। রোগিণীর উচ্চ গাত্রোন্তাপ, প্রলাপ এবং অভিশন্ধ দৌর্বল্য ছিল। জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। তাহার মুখমগুল এবং মন্তক এত ফীত হইন্নাছিল যে, চকু একেবারে বন্ধ হইন্না গিন্নাছিল। এতৎসহকারে তীব্র বেদনাও ছিল। ফিরম-ফস এবং নেট্রম-সলফ পর্য্যায়ক্রমে ২ ঘণ্টাস্তর ব্যবহার করান্ন অভি-আশ্চর্য্য ফল দর্শে। ২ মাত্রা নেট্রম-সলফ প্রয়োগ করিবার পরই কতকগুলি পিত্ত বমন হন্ন এবং সমগ্র লক্ষণেরই উপশম দেখা যান্ন। ক্ররের

বেগ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে পর ফিরম-ফস পূর্ব্বোক্তরপে পুন: পুন: পুর্যায়ক্রমে না দিয়া মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা হইত। ৪৫ দিনের মধ্যেই রোগিণী সম্পূর্ণ স্থত হইয়া রাভিমত সাংসারিক কাজকর্ম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

Eye, Diseases of—চকু রোগ।

চিকিৎসা।

কিরম-কস। — চক্ষু প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায়, বেদনাও আরক্ততা থাকিলে, পূব্ জন্মিবার পূর্বেই ইহা ব্যবহার্যা। চক্ষুতে জালা। অক্ষি-রোলকে বেদনা, নড়িলে উহার বুদ্ধি এবং নাতল জলে ধুইলে উপশম। চক্ষুর পাতায় দানার ন্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাড়কা, চক্ষুত্তে বালুকণা থাকার ন্থায় অন্তভ্ব। ৬×বা ১২×চূর্ণের লোশন স্থানিক প্রয়োগ।

কালী-মিউর।—চক্ষ্-প্রদাহের দিগীয়াবস্থায় খেত অথবা সবুজাত পীত বর্ণের শ্লেমা প্রাব হইতে থাকিলে কালী সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে। চক্ষ্য ক্ষত, তৎসহকারে চক্ষ্র পাতায় খেত অথবা পীতাত মামড়ি (কালী-সলফ)। রেটিনার প্রদাহের দিতীয়াবস্থা। চক্ষ্র পাতায় ক্ষ্মুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা, তৎসহকারে চক্ষ্তে বালুকণা বিশ্বমানতার ন্থায় অন্তত্তব। ফির-ফস সহ পর্যায়ক্রমে। ফোফা হইতে বিস্তৃত অগভীর ক্ষত্তের উৎপত্তি।

কালী-সলফ।—চক্ষ্ প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় পীত অথবা সবুজাভ বা পীত বর্ণের আঠ। আঠা কিংবা জলবৎ আব নিঃস্ত হইলে (কালী-মিউর)। চক্ষ্র পাতায় পীতবর্ণের মামড়ি। ছানি। অক্ষি মুকুরের (crystaline lens) অস্পষ্টতায় ক্যাট-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে। কালী-ফস।—কোন পীড়ার পর দেহের সর্বাঙ্গান দৌর্বল্য নিবন্ধন দৃষ্টি দৌর্বল্য। অপ-টিক নার্ভের আংশিক ক্ষয় হেতু অন্ধতা। কোন পীড়াকালে স্নায়্মণ্ডলের ক্রিয়ার বৈষম্যস্ত্রক প্রসারিত অক্ষি-তারা, কটমট করিয়া বা হাঁ করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকা। পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত হেতু চক্ষুর পাতার পতন। ডিফথিরিয়ার পরবর্ত্তী তির্ঘাক-দৃষ্টি (টেরা)।

ম্যাত্রেশিয়া ফ্সা ।—চক্ষ্ব পাতার পতনে কালী ফ্স সহ পর্যায়ক্রমে; চক্ষ্র যে কোন পীড়ায় আলোকে অতিশন্ন দ্বেষ ও সঙ্কুচিত অক্ষিতারা থাকিলে; দৃষ্টির বিভ্রম; চক্ষ্র সন্মুখে ক্ষ্তু ক্রুত্র বিন্দু বা নানাবর্ণ
দেখা; অপটিক স্নায়্র ছর্বলভাবশতঃ দৃষ্টিদৌর্বল্য; চক্ষ্র স্নাযুশ্ল;
উষ্ণভায় এই বেদনার উপশম এবং শীতলভায় বৃদ্ধি; আক্ষেপিক তির্যাক্দৃষ্টি এবং পাতার স্পন্দন।

নেট্রা-মিউর ।—অশ্রাবী প্রণানীর অবরুদ্ধতা সহকারে চক্ষ্ইতে জলবৎ, পরিষ্কার শ্লেমা বা অশ্র প্রাবিত হইলে ফির ফস সহ পর্যায়-ক্রমে; চক্ষ্ হইতে যে প্রাব নিংস্ত হয় উচা লাগিয়া ত্বকে ক্ষত বা ফোষ্টা জন্মে; অক্সিপুটের দানাময় পীড়কায় অশ্রন্তাব বর্ত্তমান বা উহার অবিছানানতায়ও ইহা ব্যবস্থাত হয়; কণিয়ায় শালা দাগ বা চিহ্ন; চক্ষ্র সায়শূলের সহিত অশ্রন্ত বের বিছ্যমানতা; কণিয়ায় ফোষ্টা।

ক্যাল্স-সলক ।—চক্ষুর প্রদাহে গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেমাস্রাব; কর্ণিয়ার গভীর ক্ষত ও উহা হইতে এই ঔষধের বিশিষ্ট পূযস্রাব; কর্ণিয়ায় ক্ষোটক; অক্ষিত্রণ; রেটিনার প্রদাহ; কঞ্জাংটাইভার (চক্ষুর শ্বেত মণ্ডল) প্রদাহে গাঢ়, পাতবর্ণ পূযস্রাব লক্ষণে; সিলিশিয়ার সহিত তুলনা করুন।

সিলিশিয়া।—চক্ষুর গভীর ক্ষত; গাঢ়, পীতবর্ণ প্রাব বিশিষ্ট

চকু প্রদাহ (ক্যাত্ম-ফস)। অঞ্জনী; অক্কি ত্রণ; চকুর পাভার চারিদিকে কুদ্র কুদ্র ক্ষোটক; পাদ-ঘর্ম বিলোপের পরবর্ত্তী দৃষ্টি-দৌর্মবা।

নেট্রম-ফস।—চক্ষর প্রদাহ সহকারে স্বর্ণের বা সরের স্থার পীতবর্ণ প্রাব নিঃসরণ; প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতাদ্বর লাগিয়া থাকে; ক্রিহ্বার ও তালুর বর্ণ এবং অম লক্ষণ বিভ্যমান থাকিলে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী; অন্তের উপদাহ (ইরিটেশন) বা ক্রমির বিভ্যমানতা বিধার তিথ্যক দৃষ্টি; গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের চক্ষু প্রদাহ (স্থানিক প্রয়োগণ্ড উপকারী)।

নেট্র মা-সলক ।— যক্তের ক্রিয়া-বৈষম্য নিবন্ধন চক্ষুর পীতবর্ণ।
ক্যাল্প্র-ফস।—চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক লক্ষণে ও চক্ষুর সায়ুশ্লে
ম্যাগ-ফদ দ্বারা উপকার না দশিলে; আলোকে বিদ্বেষ; দিত্ব দৃষ্টি;
(একটা বস্তুকে তুইটা দর্শন); এই লক্ষণে ম্যাগ-ফস ও উপকারী।

ক্যাল্প-স্থো নির্দর্শন ; কণিয়ায় দাগ ; খেত মণ্ডলের প্রদাহ ; ছানি।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) একব্যক্তি ৩ মাদ বাবৎ দক্ষিণ কণিয়ার প্রাণাষ্ট রোগে ভূগিছে ছিল; প্রদাহ সমগ্র কণিয়ায় ব্যাপ্ত ছিল; রোগিটী কেবল মাত্র আঙ্গুল দেখাইয়া গুণিতে বলিলে গুণিতে পারিত; সামাল্য বেদনা, আলোকাতঙ্ক এবং চক্ষ্র আরক্ততা ছিল; Pupil বা চক্ষ্র তারা সঙ্কৃচিত ছিল; এট্রোপিন প্রয়োগ করিলে উহা ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া শাজ্রই আবার সঙ্কৃচিত হইয়া পড়িত; অরম্ মেট ও সিনেবার ব্যবহার করিয়া কোন ফল পাওয়া বার নাই; কালী-মিউর ৬× সেবনে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।

- (২) কালী-মিউর ব্যবহারে ৪।৫টা রোগীর কণিয়ার ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।
- (৩) ৭২ বৎসর বয়য়া এক জীলোকের বছ দিন যাবত চকু হইছে বিদাহী (যাহা লাগিয়া ক্ষত জন্মে) অঞা নিঃস্ত হইত; চকুতে জালাও ছিল, প্রাতে ৮ টার সময় হইতেই জালা ও অঞালাব আরম্ভ হইত এবং স্থ্যান্ত পর্যান্ত এক ভাবেই থাকিত; অঞা লাগিয়া নাসিকার হই পার্ম দিয়া ক্ষত ও উদ্ভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল; এই সব লক্ষণ আসে নিকেও আছে; কিন্তু ডাঃ স্থানার প্রভৃত অঞা প্রাবং নেট্রম-মিউরের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মনে হওয়ায় আসে নিক ব্যবহার না করিয়া উহাই ব্যবস্থা করা হয়; প্রায় ১ মাসে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।
- (৪) ৮ বংসর বয়স্কা এক বালিকার উৎকট আকারের কঞ্চাংটাইভিটিস রোগ ছিল; সে আলোর দিকে একেবারেই তাকাইতে পারিত না। প্রথমে একজন সাধারণ চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহাতে কিছুই হয় নাই। এই রোগ প্রকাশ পাইবার কয়েক বংসর পূর্ব্বে তাহার হাম (ফেরা, লুন্তি) জন্মিয়াছিল। উহারই কুফল হইতে এই রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মে। ক্যাল্ক-কার্ব্ব প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে কোনই ফল না হওয়ায় এবং শেষে গলার গ্রন্থির ক্ষীততা, চক্ষুর প্রাবের ছগ্মের সরের ভায় পীতবর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় নেট্রম ফ্রন্স প্রত্যহ ৩ বার করিয়া দেওয়া যায়। এক সপ্রাহেই রোগ আরোগ্য হইয়াছিল।
- (৫) ডা: Kock একটা রোগীর চকু রোগে ফিরম-ফস ও ক্যান্ধ-সলফ ব্যবহার করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছিলেন। রোগীটার লক্ষণ:—একথণ্ড কাঠের আঘাত লাগিয়া রোগের স্বস্টি হইয়াছিল। চকুর খেত মণ্ডলের ক্ষীততা ও আরক্ততা এবং অক্ষিপ্টের (পাতার) উপদাহিতা ছিল। উহার ফলে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা জন্মিয়াছিল। কর্ণিয়াও অমুজ্জন (ঘোরাল, dim)

ছিল। চক্ষু পরীক্ষা করিয়া কোন বাহ্ বস্তু উহাতে আছে দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু চক্ষে কোন বাহ্ বস্তু প্রবেশ করিলে যেরপ জালা হয় সেইরপ জালা ও অবিরাম অশুস্রাব ছিল। রোগীকে সর্বাল চক্ষ্ বান্ধিয়া রাখিতে হইত। ক্ষুণা উত্তম এবং নাড়া স্বাভাবিক ছিল। প্রথমতঃ ১ সপ্তাহ পর্যান্ত ফিরম-ফস প্রতি ২ ঘণ্টান্তর দেওয়া যায়। ইহাতে জ্ঞালাকর বাধা ও অশু-স্রাব অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির কোনই উৎকর্ষ হইয়াছিল না। এক্স হিপার সলফ ১ সপ্তাহ পর্যান্ত প্রয়োগ করা হয়; তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় ক্যান্ত-সলফ প্রতাহ ৩ বার করিয়া সেবন করিতে বিধি দেওয়া হয়। ইহার ১ সপ্তাহ পর রোগী হাসিতে হাসিতে আসিয়াবলে যে, সে এখন কিছু কিছু দেখিতে পায়। তখন চক্ষ্ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, কর্ণিয়া অনেকটা পরিক্ষার হইয়াছে। এখন হইতে উক্ত ঔষধই। ক্যান্ত-সলফ) প্রতাহ প্রাতে ও রাত্রে এক একবার করিয়া সেবনের বিধি দেওয়া হয়। ৩ সপ্তাহে কর্ণিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয় ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

- (৬) ১৬ বৎসরের এক যুবভার পুনঃ পুনঃ প্রভাবর্কনশাল keratitis রোগ ছিল। বামচক্ষুর প্রদাহ, আলোকাতক্ষ, কর্ণিয়ার কতকটা অপরিচ্ছন্নভাও আরক্ত রক্তবহা নাড়ী দ্বারা আকৌর্ণ ছিল। ক্যাল্ক-ফস ব্যবহারে রোগ আরোগ্য হয়।
- (৭) একটা রোগার, চক্ষুর অভিরিক্ত ব্যবহারে উৎপন্ন, বছবিধ উপসর্গ নেউম-মিউর ব্যবহারে আরোগ্য হইয়াছিল।

Felon—ফেলন, আঙ্গুলহাড়া। (এবসেস দেইব্য)

ফিরম-ফস।—প্রারম্ভাবস্থায় উত্তাপ, বেদনা ও জরের উপশমার্থ।
সিলিশিয়া।—আঙ্গুলহাড়ায় পূযোৎপত্তির সম্ভাবনা হইলে ইহা
অবশু প্রয়োগ করিবে। কেননা ইহা আশক্ষিত পূয্প্রাব জন্মাইয়া শীঘ্র শীঘ্র নৃত্তন নথ নিশ্বাণে সহায়ত। করে।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) জনৈক পোষাক নিশ্মাতার আঙ্গুলহাড়া রোগ জন্মে। ফিরম-ফস প্রতি ২ ঘণ্টাস্তর ব্যবহার করায় বিশেষ উপশম ক্রন্মে এবং রোগিণী রোগমুক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া পুনরায় পূর্ববৎ দেলাইয়ের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। হস্তের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে রোগ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়। এখন ফিরম-ফস না দিয়া সিলিশিয়া ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতেই রোগ আরোগ্য হয়, আর প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

Fever, Simple—ফিভার, সিম্পল। সামাত্য জ্বর।

(কারণ)

রক্তন্থ ফিরম-ফসফরিকম নামক পদার্থ অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই অক্সিজেন দ্বারাই শরীরের সমস্ত বিধান (টিস্ন) পরিপোষিত হইয়া থাকে। কোনও কারণে দেহস্থ রক্তে এই ফিরম-ফসফরিকেমের ন্যুনতা ঘটিলে দেহস্থ বিধান সমূহে পর্য্যাপ্তরূপে অক্সিজেন সরবরাহ করিবার নিমিত্ত রক্ত স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা ক্রতত্ত্ব সঞ্চালিত হয় (কেননা, ইহা সহজেই অমুমেয়, যে কাজ কোনও নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিতে দশজন লোকের প্রয়োজন তাহা তদপেক্ষা কম লোকের সেই সময়েই সম্পন্ন করিতে হইলে নিশ্চয়ই ক্রতত্ত্ব কার্য্য করার প্রয়োজন)। রক্ত, এই কারণে ক্রতত্ব সঞ্চালিত হওয়ার ধমনী সকলের সহিত সংঘর্ষণে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। এই উত্তাপই জর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রক্তকে ক্রতত্বর সঞ্চালিত করিতে হইলে হুংপিণ্ডের ক্রিয়াও ক্রতত্বর হওয়া আবশ্রক। হুংপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রতত্বর হওয়ায়, নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং হুংপিণ্ডের ক্রত ক্রিয়া নিবন্ধন শারীরিক হর্মলতা উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত ফিরম-ফসফরিকমের অভাব কখন বা মুখ্যরূপে (directly) এবং কখন বা গৌণরূপে (indirectly) হইয়া থাকে। কোনও প্রকার প্রাদাহিক পীড়ায় ইহার অভাব মুখ্যরূপেই হইয়া থাকে। তখন ফিরম-ফসফরিকমই একমাত্র ঔষধ। যথা সময়ে এই ফিরম-ফসফরিকমের অভাব পরিপূরিত না হইলে শাঘ্রই আবার দেহে কালী-মিউরিয়েটিকমের অভাব ঘটে। কেননা, দেহে প্রত্যেক লাবণিক পদার্থের এরূপ সম্বন্ধ যে, ষদি ইহার কোনও একটার অভাব ঘটে, তবে উহা তৎক্ষণাৎ অপর কোনও সম্বন্ধযুক্ত লাবণিক পদার্থ হইতে অংশ বিশেষ গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে প্রথম অভাবটী যথাসময়ে পরিপূরিত না হইলে, দেহে নানা প্রকার লাবণিক পদার্থের অভাব হেতু নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে জর হইতে প্রীহা, ষক্বতাদির বিক্বতি ও বিবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

দিতীয়তঃ, গৌণরূপে ফিরম-ফসফরিকমের অভাবের কথা :—নেট্রম-সলফের বর্ণনাকালে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইহার অর্থাৎ নেট্রম-সলফের সাহায্যেই জল সমস্ত বিধানে পরিব্যাপ্ত ও উদৃত্ত জল দেহ হইতে নিঃসারিত হয়। গ্রীম্মকালে. সূর্য্যোত্তাপে সমৃদ্র, হ্রদ, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে জল বাষ্ণীভূত হইয়া বায়ুর সহিত মিপ্রিত হইয়া বায়ুর জলীয় বাষ্পের (water vapour) পরিমাণ বন্ধিত করে। নিঃশ্বসিত বায়ুর সহিত প্রথমতঃ এই জ্লীয় বাষ্প ফুসফুসে, অনস্তর রক্তবহা নাড়ীতে প্রবেশ করে। রক্তস্থ নেট্রম-সলফের সহিত অক্সিজেনের, এবং অক্সিজেনের সহিত জলের নৈকট্য আকর্ষণী সম্বন্ধ আছে। একারণ, স্বস্থদেহে মুখ্যত: নেট্রম সলফের সাহায্যেই দেহস্থ জল শীঘ্রই অপসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি রক্তে অত্যধিক পরিমাণে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি হয়, এবং নেট্রম সলফ নিঃশ্বসিত বায়ুর সহিত যথেষ্ট অক্সিজেন না পাওয়া বশতঃ এই অভিরিক্ত জল দূরী-করণে অসমর্থ হয় তবে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস হইয়া পড়ে। এখন কাজে কাজেই নেট্রম-সলফ রক্তস্থ ফিরম-ফসফরিকম হইতে অংশ বিশেষ গ্রহণ করিতে বাধা হয়। স্কুতরাং স্পষ্টই দেখা গেল, রক্তে জলীয় ভাগের বুদ্ধি হইলে এবং শীঘ্রই ঐ অতিরিক্ত জল দেহ হুইতে অপস্ত না হইলে প্রথমে ফিরম-ফসফরিকমের অভাব ও ওৎপর আবার অন্তান্ত সন্ট ষ্থা কালী-মিউর বা নেট্রম-মিউরের ও অভাব ঘটিতে পারে। একারণে, জরে বাইওকেমিক চিকিৎসায় এই সকল টিগু রেমিডির প্রয়োজন।

এলোপ্যাথেরা জর চিকিৎসা-কালে প্রায়শঃই কুইনাইন ব্যবহার করিয়া থাকেন। কুইনাইনে অতি অল্প পরিমিত ফিরম-ফস ও নেট্রম-সলফ তুইই আছে। কুইনাইনের এই তুই উপাদানই জরের প্রকৃত ঔষধ, কিন্তু কুইনাইন নহে। কুইনাইনে, পূর্ব্বোক্ত তুই উপাদান ব্যতীত, আরও অন্তান্ত জ্ব্য আছে। কুইনাইন একপ্রকার বিষ বিশেষ। অতিরিক্ত পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহারের ফলে অধিকাংশ সময় বধিরতা ও অন্ধতা জ্বিয়া থাকে। বাইও-কেমিক চিকিৎসকেরা অভাবেরই পরিপূরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এরূপ কেম্বত ঔষধ ব্যবহার করেন না যদ্ধারা দেহের কোনও বিধানের ধ্বংস্

সাধিত হয়। কি প্রকারে জ্বাদিতে ঘর্ম উৎপাদিত হয় তাহা কলেরার নিদান তত্ত্বে দ্রন্থবা।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—সকল প্রকার জরেরই ইহা প্রধান ঔষধ। ক্রত নাড়ী, উচ্চ গাত্রোত্তাপ ইত্যাদি। প্রাতিশ্রায়িক, আমবাতিক বা প্রাদাহিক জরে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলে তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে। জরামুভব থাকিলে রোগের সকল অবস্থায়ই ইহা ব্যবহার্য্য।

কালী-মিউর।—ইহা জরের দিতায় ঔষধ। জিহ্বায় গাঢ়, শ্বেতবর্ণের লেপ। কোষ্ঠবদ্ধতা।

কালী-ফস।—উচ্চ গাত্রোত্তাপ; দ্রুণ, বিষম নাড়ী, স্নায়বিক উত্তেজনা ও হর্বলতা সংযুক্ত স্নায়বিক প্রকৃতির জরে ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

কালী-সলফ। — সন্ধাকালে জরের বা গাত্রোত্তাপের বৃদ্ধি।
ফিরম-ফস ব্যবহার সত্ত্বে যদি প্রচুর ঘর্ম আব না হয় তবে তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে ইহা ব্যবহার্য্য। রক্তের বিষ গ্রন্থতা বিশিষ্ট জর।

নেট্রস-মিউর।—চক্ষ্ অথবা নাসিকা হইতে জলবং প্রাব সংযুক্ত হে ফিবার। ফিরম-ফদ সহকারে পর্য্যায় ক্রমে। পূর্ব্বাহ্ন ১০।১১ টার সময় জরের উপস্থিতি।

Fever Intermittent দবিরাম জুর।

চিকিৎসা।

নেট্রম-সলক । সবিরাম জরের সকল অবস্থারই এই ঔষধ
উপযোগী। পৈত্তিক লক্ষণ বিছমান থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ। (কম্পজর
বিশিষ্ট রোগীর কখনও ডিম্ব হগ্ধ, ঘোল, বসাময় এবং মংশ্র প্রভৃতি
গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্ব্য নহে)।

ফির্ম-ফস। জরলক্ষণে এবং অপরিপাচিত দ্রব্য বমন করিলে এই রোগের প্রধান ঔষধ নেট্রম-সলফ সহ পর্য্যায়ক্রমে।

কালী-ফস-অভিশয় ছর্বলতা এবং প্রচুর ঘর্ম লক্ষণ থাকিলে।

কালী-মিউর ।—জিহ্বায় খেত বা কপিশাভ খেতবর্ণের লেপ থাকিলে অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

নেট্রম-মিউর।—সবিরাম জরে জলীয় লক্ষণ বিজ্ঞমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়। অভিশয় পিসাসা ও ওঠে জর ফোট। কুইনাইন অপব্যবহারের পর ইহা প্রয়োগ করিলে দেহ হইতে উহা বহির্গত হইয়া ষায়।

ম্যাত্রেশিরা ফস।—পায়ের ডিমে খলী থাকিলে নেট্রম সলফ সহ পর্য্যায়ক্রমে।

নেট্ম-ফস ।—সবিরাম জরের সহিত অম অথবা রুমির লক্ষণ, যথা অমুব্যনাদি এবং নাক খুঁটা বর্তমান থাকিলে।

ক্যাল্স-ফস।—শিশুদিগের পুরাতন সবিরাম জ্বে মধ্যে মধ্যে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসিত রোগী।

- (১) ৩৮ বংসর বয়য় এক ব্যক্তির জ্বের শীতাবস্থায় দর্মা, হস্ত-পদে ছিরকর বেদনা, কর্ণনাদ, শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা ও কপালে তীত্র বেদনা বিশিষ্ট শিরংপীড়া ছিল। বেদনার সঙ্গেই জ্বর আসিত, রাত্রিতে অতিশয় দর্মপ্রাব হইত বটে কিন্তু তাহাতে তাপের লাঘব জ্বিত্র না। জ্বিহ্বায় খেত বর্ণের লেপ ও ক্ষুধামান্দ্যও ছিল। ২ ঘণ্টাস্তর কালী-মিউর সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে শরীরের বেদনা ও অবশতা ব্যতীত আর আর সকল লক্ষণই হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং অভ্যন্ত পাদ ঘর্ম্মের বিলোপ জ্বেম। ইহা দেখিয়া প্রত্যহ ২ মাত্রা করিয়া ১ সপ্তাহ্ন পর্যান্ত সিলিশিয়া ব্যবস্থা করা যায়। ইহার ফলে পাদ-ঘর্ম্ম পুনঃ প্রকাশিত্র হয় ও রোগীর যাবতীয় লক্ষণ তিরোহিত হয়।
- (১) এক ব্যক্তির উচ্চ জর (১০৪ ডিগ্রী), সর্বাঙ্গীন গুর্বলতা পেনীতে চর্বলকর বেদনা, মাথাধর। ও ক্ল্যামান্দ্য ছিল। ফিরম-ফস ১২× ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ইহাতে কোনও উপকারই লক্ষিত হয় নাই বরং রোগী আরও খারাপ অনুভ্ব করে বলিয়া প্রকাশ করে। তখন উক্ত প্রধই ৬× ক্রেয় ব্যবহার করাঃ অতি ক্রত উপকার দর্শে।
- (৩) ঢাকার স্থবিখ্যাত শরকারী উকিল স্থগীয় রায় ঈশরচক্র ঘোষ বাহাত্বের ১৬।১৭ বৎপরের এক পুত্র জ্বর ও তৎসহ আমবাত রোগে শ্যাগত কাতর হয়। সহরের প্রধান ২ এলোপ্যাথিক ডাক্তার ও কবিরাজ্ঞ দ্বারা প্রথম চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ঘটনাক্রমে মদীয় বাইওকেমিক চিকিৎসার এই পুস্তক তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। ইহার পূর্বে বাইওকেমিক চিকিৎসার নামও তাঁহার শ্রুতি গোচর হইয়াছিল না। পুস্তকের ভূমিকা পাঠ করিয়া এই অভিনব চিকিৎসা প্রণালীতে তদীয় পুত্রের চিকিৎসা করণার্থ আমাকে আহ্বান করেন। রোগার

স্থান বিকল্পনাল বেদনা (যে বেদনা এক স্থান চইতে অন্ত স্থানে নজিয়া চড়িয়া বেড়ায়) সন্ধির স্ফাততা ও সন্ধ্যাকালে উপচয় বিশেষতঃ প্রত্যন্থ সন্ধ্যাকাল চইতেই উত্তাপের বৃদ্ধি এবং জিহ্বায় হরিজাবর্ণের লেপ এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে পর্যায়ক্রমে ফির-ফস ১২ × ও কালা-সলফ ৬ × ২ ঘণ্টাস্তর সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিন ঔষধ সেবনেই সেদিন আর জর আসে নাই এবং সন্ধির স্ফাততার ও অনেক লাঘব জন্মে। ৫।৭ দিন শ্রষধ সেবংনই রোগী সম্পূর্ণ অরোগ্য হইয়াছিল।

(৪) ভাওয়াল সাতাইশ নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচক্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ১৫৷১৬ বৎসর বয়স্কা কন্তা প্রায় ১ বৎসর যাবৎ ম্যালেরিয়া জরে ভগিতে থাকেন। প্লীহা ও যক্ত নাভির নিম পর্যান্ত বাড়িয়া পড়িয়াছিল। পাঞ্ছু বা কামলা প্রকাশিত হইয়াছিল। চকুর খেতমণ্ডল সম্পূর্ণ হবিদ্যাবর্ণ স্বাঙ্গান শোথ, পিপাসা, পৈত্তিক অভিসার, আবার মধ্যে ২ কোঠবদ্ধ মুখক্ষত এবং স্বরভঙ্গও বিভাষান ছিল। তুপুর ১টা—২ টার সময় প্রভাহ শাঁত হইয়া জর আসিত এবং রোগিণীর সম্পূর্ণ অরুচিও বিভ্যমান ছিল। ঢাকার প্রধান প্রধান ডাক্তার কবিরাজ প্রায় ৫।৭ মাস পর্যান্ত ইহার চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রও ফল দর্শে নাই। রোগিণী যথন আমার চিকিৎসাধীনে আসেন তখন তাঁহার শার্ণতা ও চর্কলতা এত অধিক ছিল যে তাহা দেখিয়। চিকিৎসায় কোন ফল হইবে তাহা কখনও মনে করি নাই। যাহাহউক, প্রথম দিন আমি তাহাকে ১ মাত্রা মাত্র আর্স ৩০ খাইতে দেই ও সিয়েনোথাস মূল অরিষ্ট প্লীহা ও যক্তের উপর দিনে ৪ বার করিয়া মালিস করিতে ব্যবস্থা দেই। পর্দিন গিয়া দেখি স্বরভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বিদ্রিত হইয়াছে এবং শোথও অনেকটা কমিয়াছে। তথন অগ্য কোনও ঔষধ না দিয়া রোগিণীর চিত্তরঞ্জনার্থে তুইদিন ব্যবহারের জন্ত ৪টী স্থগার অব্মিল্পের পাউডার দিয়া আসি। উক্ত ২দিন পর আবার রোগিণীকে দেখিতে যাই। ভখন নেটুম-সলফ ৬× (৪ গ্রেণ মাত্রায়) দিনে ৩বার করিয়া সেবন, ৩'৪ দিন পর পর > দিন করিয়া আস ৩০ সেবন এবং প্রভাহ সিয়োনাধাস মালিসের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ইহাতে ৩ সপ্তাহ মধ্যে রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিলেন। প্লীহা ও যক্ত এই অল্পসময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

Fever Typhoid—টাইফয়েড ফিবার, সন্নিপাত জুর।

ফিরম ফস।—প্রারন্তাবস্থার শীত ও উত্তাপ প্রভৃতি লক্ষণে। যতক্ষণ প্রাদাহিক অবস্থা বিজ্ঞমান থাকে ততক্ষণ অপর কোন ব্যবস্থের ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা। অতিশয় হর্মলতা ও রক্তপ্রাব।

কালী মিউর।—সারিপাতিক জরের ইনা প্রধান প্রথম।
ফিরম-ফদের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। জিহ্বায় খেত বা কটাবর্ণের
লেপ বা পাতলা পীতাভ মলস্রাব। উদরের ক্ষীততা ও অতিশয় স্পর্শামুভব।

কালী-সলফ।—সন্ধ্যার প্রাকালে রোগ ও উত্তাপের বৃদ্ধি,
মূহ বেগ বিশিষ্ট (ধীর) নাড়া (কালী ফস)। রক্তের বিষহষ্টতা।

কালী-ফস।—প্রচণ্ড প্রলাপ বা উন্মন্ততা সূচক লক্ষণের বিশ্বমানতা ও অভিশয় হর্মলতা। হর্গন্ধি মলস্রাব, নিদ্রাহীনতা, শাস-প্রশ্বাদে অতিশয় হর্গন্ধ, হংপিণ্ডের ক্রিয়ার অভিশয় হর্মলতা। মলাবৃত দন্ত। বাসি সরিষা বাটার ন্থায় লেপ বিশিষ্ট, শুষ্ক জিহ্বা। জিহ্বা উপরতালুতে লাগিয়াঃ থাকে; জিহ্বার শুষ্কতা বশতঃ কথার অস্পষ্টতা। নেট্রম-মিউর।—জলবৎ পদার্থ বমন, জিহ্বার পারিশুঙ্কতা, অঙ্গের স্পান্দন, নিদ্রালুতা, মৃত্প্রলাপ ও অচৈত্য প্রভৃতি উৎকট লক্ষণের বিগ্রমানতা।

ক্যাল্ফ-ফস।—আরোগ্যোলুথাবস্থায় ক্ষয়িত টিগুর পুনর্নির্মাণের নিমিত্ত রোগের ভোগ কালে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ভাঃ চ্যাপম্যান সানিপাতিক জরের চিকিৎস। কালে গুগুরারে প্রভূত গরম জলের পিচকারী দিতে সনির্ব্বন্ধ অমুরোধ করেন। উচ্চগাত্রোভাপ, ক্রত নাড়ী ও রোগের গাঁত ক্রমশঃ খারাপ ইইতে থাকিলে গুগুরারে গরম জলের পিচকারী প্রদান করিলে চমৎকার ফলদর্শে। কোষ্ঠ কাঠিন্ত বা উদরাময় বিভ্যমান থাকিলেও ইহাদারা বিশক্ষণ উপকার দর্শে।

এই রোগে ফিরম-ফস ও কালী-মিউর ৩× পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া আতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া সিয়াছে। জিহ্বায় bown coating থাকিলে বিশেষতঃ প্রলাপের বিভ্যমানতায় ও রোগের সাংঘাতিকভায় কালী-ফস ৩× প্রয়োগ করিবে। জিহ্বায় পীতবর্ণ চক্ চকে লেপ থাকিলে ম্যাগ-ফস ও স্থাট-ফস এবং আরোগ্যোল্মথ অবস্থায় ক্যাল্ম-ফস প্রয়োগ করিলে অতিশয় স্থাকল পাওয়া যায়।

Fever, Puerperal পিউরপারেল ফিবার সূতিকা জ্বন।

(গর্ভ ও প্রসব-বেদনা দ্রফীব্য)

Fever, Yellow ইয়্যালো ফিবার, পীতজ্বর।

(চিকিৎসা)

ফির্ম-ফস।—জর পাকিলে এই রোগের প্রধান ঔষধ নেটুম-সলফের সহিত পর্যায় ক্রমে ব্যবহার্য।

নেট্র ম-সলফ ।—সবুজাত পীত, কটা অথবা রুষ্ণাত পদার্থ বমন।
ভয়ন্বর পৈত্তিক লক্ষণের বিজ্ঞানত।। ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ।
লক্ষণের সাদৃশ্যে অপর কোনও ঔষধ ব্যবস্থের হইলে উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে
দিবে।

Fistula Ano — ফিফুলা-য়ানো, ভগন্দর, মলদ্বারে নালী-ক্ষত।

মল্বারের তুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানের মধ্যে একপ্রকার নালী-ঘা জনিলে তাহাকে ভগন্দর বলে; ভগন্দর তিন প্রকারের। যথা—(১) মল্বারের অভ্যন্তরের সহিত সংলগ্ন (এই প্রকার নালী ঘা হইতে মল, শ্রেষ্মা ও বায় নিংস্ত হয়), (১) মল্বারের বা সরলান্ত্রের সহিত অসংলগ্ন; (৩) বাহিরের ত্রুকর সহিত অসংলগ্ন। এই প্রকার ঘা সহজে গুকায় না। যক্ষা ও বহুমূত্রগ্রন্ত রোগীদের অনেক সময় ভগন্দর হইতে দেখা যায়।

ক্যান্ত্র-ফস।—এই রোগে অস্ত্র চিকিৎসা হইয়। থাকিলে তৎপর ব্যবহার্য্য। ভগন্দরের সহিত বক্ষোলক্ষণের বিশ্বমানতা, গুহুদ্বারে জালা ও দপ্দপ্। গুহুদারাভিমুথে কোনও ভারী বস্তু প্রচাপিত ইইতেছে এরপ অমুভব। প্রাতঃকালে শ্যা হইতে উঠিবার পর মল্লারে ক্ষতবং বেদনা।

সিলিশিয়া।—ভগনবের সহিত বক্ষোলক্ষণের বিজ্ঞমানতা।
ভ্রমণকালে সরলাম্রে তীব্র স্টা-ভেদবৎ বেদনা। উদর বেদনা, উষ্ণতায়
উহার উপশ্য। ক্ষতে পূয সঞ্চয়। (এই ছই ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার
করায় বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে ।

Gall stone — গল ফোন, পিত্ৰশিলা।

পিত্ত কোষের (Gall-bladder) ভিতর পিত্ত-রস জমিয়া প্রস্তারাকার ধারণ করিলে তাহাকে পিত্তশালা বা পাথরি বলে। এই শালা বালুকণার স্থায়, মটর প্রমাণ অথবা কপোত বা কুরুটের অণ্ডের স্থায়ও বড় হইয়া থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই এই পীড়ার আধিক্য দৃষ্ট হয়। পাথরি ষত্তদিন পিত্তকোষের মধ্যে থাকে তত্তদিন বিশেষ কোন উপদ্রব থাকেন; মধ্যে ২ পেটে ঈষং বেদনা অন্তত্ত হয় মাত্র। কিন্তু পাথরি পিত্ত-প্রণালীর মধ্য দিয়া বাহির হইবার কালেই সহসা অসহ্থ বেদনা হইয়া থাকে। দক্ষিণ কুক্ষিদেশে এই বেদনা অন্তত্ত হয় ও তথা হইতে উদরের বাম দিকে সঞ্চারিত হয়। পিত্তশিলার বেদনা সহসা উপস্থিত হয় কিছুক্ষণ অবিরাম ভাবে থাকে ও সহসা তিরোহিত হয়। পাথরি যত্তই বড় হয়, বেদনার তত্তই তাব্রতা জন্মে। কিন্তু উহা ছোট হইলে পিত্তপ্রাব বয় হয় না বটে কিন্তু উহার প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ধীরে ধীরে পাঞু বা কামলা এবং শোথ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।

ক্যাল্ক ফস।—শিলার পুনরুৎপত্তি নিবারণার্থে; পৈত্তিক ধাত্র রোগীদিগের বাতের প্রবণতা থাকিলে তাহাদিগের রোগে নেটুম সলকের সহিত পর্যায়ক্রমে। যক্তং-প্রদেশের বেদনায় নেট্রম সলফ অবশ্য ব্যবহার্যা।

ম্যান্থেশিয়া ফস।—অভিশয় বেদনা ও আক্ষেপ্ত (Spasm) থাকিলে। এই রোগে ক্যান্ধ ফস ৬× ও ম্যাগ-ফস ৬× একত্রে উষণ্ডলে গুলিয়া নেট্রম-সলফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন প্রয়োগ করিলে সত্তর বেদনা বিদ্রিত হইয়া থাকে। (কলিক দ্রষ্টব্য)।

Gastric derangements — গ্যাফ্রিক ডিরেঞ্জমেণ্টস, আমাশয়ের রোগ, পাকস্থলীর রোগ।

(চিকিৎসা)

ক্ষিরম ফ্সা।—আমাণয়ের ক্ষীততা, অভিশয় বেদনা ও স্পর্ণায়্থ-ভবতা সংযুক্ত আমাশয় প্রদাহ। অপরিপাচিত ভ্ক্তরতা বমন; শীতন পানীয় গ্রহণে বা আমাশয়-প্রদেশে উষ্ণ সেক প্রদানে বেদনার উপশম; সারিপাতিক অরের প্রারম্ভাবস্থায় উদরাময়ের বিশ্বমানতা থাকিলে ইহা অতি-শয় ফলপ্রদ; উদরাগ্রান (ক্ষীততা) সহকারে ভুক্ত পদার্থের স্বাদ বিশিষ্ট উদ্যার; আরক্ত ও উত্তপ্ত মুথ্মগুল সহকারে অগ্রিমান্দা; আমাশয় প্রদেশে স্পর্শ সহা হয় না; জিহ্বার লেপ দৃষ্টে অন্ত যে ঔষধ ব্যবস্থেয় হয় তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়; অগ্নিমান্দ্য সহকারে আঘাতিত বা দপ দপ কর বেদনা; পরিষ্কার জিহ্বা; কুধাহীনতা সহকারে জ্বরামূভব।

কালী-মিউর—সকল প্রকার আমাশয়ের বা পিত্তপ্রাবের বিশ্ভালায় জিহ্বায় খেত বা পাংশুটে খেত বর্ণের লেপ থাকিলে, বিশেষতঃ এই
লেপ প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; অপাক সহকারে যক্তৎ
প্রদেশে বেদনা ও গুরুত্ব; খেত লেপার্ত জিহ্বা; প্রলম্বিত অফিগোলক।
অতিশয় উষ্ণ পানীয় গ্রহণের ফলে আমাশয়-প্রদাহ জ্বিয়া থাকিলে অবিলম্বে
এই ঔষধ প্রদান করা কর্ত্বব); যক্ততের ক্রিয়ার শুরুতা সহকারে উদরাধ্যান;
বসাময় বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের পর অস্ত্রশুত্রব। কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত
অমিমান্য।

নেট্রম-ফদ। —অম ঢেকুর; জিহ্বার পশ্চান্তাগে, তালু ও তালুমূলে পাতলা, আর্দ্র সরের ন্থায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ; মুথের অমস্বাদ; অমগিদ্ধি ঢেকুর; আমাশয়ের ক্ষত; আহারের পর অম ঢেকুর সহকারে বেদনা; হদ্দাহ (ফির-ফদ সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য); অম অথবা রুমি জনিত আমাশয়ের বেদনা; অম লক্ষণ সহকারে কুধাহীনতা।

নেট্রা-মিউর।—অজীর্ণতা সহকারে মুখপ্রাসেক (মুথে জল উঠা);
মুথে জল সঞ্চয় সহকারে আমাশয়ে (<দনা অথবা পরিষ্কার, ফেণিল, জলবৎ
পদার্থ বমন; কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত অজীর্ণতা।

ক্যাল্ক ফস।—সকল প্রকারের অজীর্ণভারই মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ প্রদান অভিশয় উপকারী; ইহা ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিতে বিশেষ সাহায্য করে; বৎসামান্ত আহারের পর বা যৎকিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণের পর উদরে বেদনা জন্মিলে এবং অম লক্ষণ বিভ্যমান না থাকিলে ইলা অভিশয় ফলপ্রদ। আমাশয়ের অভ্যধিক বায়ু সঞ্চিত হইলে ইহা প্রায় অমোদ।

কালী ফস ৷—আহারের পরই আবার কুধার্মভব; সানিপাতিক জর বা অপর কেনে ক্ষয়কর রোগের পর কুকুরের মত ঘন কুধা; ভয় বা উত্তেজনা বশতঃ আমাশয়ে বেদনা।

কালী-সলফ।—আঠা আঠা, পাঁত লেপাবৃত জিহ্বা সহকারে অজীর্ণতা; আমাশ্য-প্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্বানুভব সহকারে আগ্নিমান্য; আমাশয়ে বেদনা ও মুখে জল সঞ্য় সহকারে অপাক জন্মিলে এবং নেট্রম-মিউর বা কালী-মিউরে কোন ফল না দিলৈ ইহা ব্যবহার্য্য; শূল বেদনার প্রায় উদর বেদনা।

ম্যান্থেশিয়া ফ্সা—আমাণয়ে আকেপিক বেদনা ও পরিষ্ঠার জিহবা। আমাশয়ে মোচড়ানবং বেদন!; বায়ু উদ্গারিত হয়, কিন্তু ভাহাতে কিছুই উপশ্ম হয় না। আমাশয়ে চর্বণবৎ বেদনা। আমাশয়ের সায়ু-শূল, বিফ পানীয় গ্রহণে ইহার উপশ্ম।

নেট্ম-সল্ফ।—পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে আমাশয়ের বিশৃভালা, মুথের তিক্তস্বাদ, তিক্ত জলীয় পদার্থ বমন, জিহ্বায় পবুজাভ কটা বা সবুজাভ পাংশুটে বর্ণের লেপ। রুষ্ণবর্ণ পিত্র মিশ্রিত মল; গাতে মুথের ভিক্তস্বাদ সহকারে আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা। যক্কতে স্থচিভেদ বা চিড়িক-মারার ভাষে বেদনা i

চিকিৎসিত রোগী

(১) এক যুবকের অস্বাভাবিক কুধা ছিল। তাহার এত কুধার উদ্রেক হইত যে প্রায় প্রতি ঘণ্টায়ই কিছু না কিছু থাইবার আবশুক হইত। কিন্তু এরপ আহার করা সত্তেও সে অভ্যন্ত হর্কালত। ও ক্লান্তি অমুভব করিত। জিহ্বা পরিষার ছিল এবং মল-মূত্রও সাভাবিক ছিল। মাত্র २ मिन काली-कम रमयत्नहे रत्रांशी ভाल हहेग्राहिल।

- (২) এক ব্যক্তির কেমন এক রকমের আশ্চর্য্য রোগ দেখা দেয়। কোন প্রকার অম (acid food) আহার্য্য গ্রহণের পরই তাহার ভয়ন্তর কম্প হইয়া জর উপস্থিত হইত এবং পরে দৌর্জন্যকর প্রভূত ঘর্মপ্রাব হইত। নেটুম-মিউর ব্যবস্থা করা হয়। ১৪ দিন পর রোগী সংবাদ দেয় যে তাহার আর পূর্ব্বোক্ত প্রকারের উপসর্গ উপস্থিত হয় নাই। উহার পব হইতেই অম পদার্থে তাহার আর কোন অস্থ্য জন্মে নাই।
- (৩) আর এক ব্যক্তির আহারের পরই আমাশয়ে (ইমাক) বিরক্তি কর জাল। জন্মিত এবং পুনরাচারের পূর্বে পর্যান্ত উহা বিশ্বমান থাকিত। আহারের ২।১ ঘণ্টা পরেই বেদনা বাড়িত, জিহ্বায় ফিকে ধূদর বর্ণের লেপ ছিল; স্বাদের কোন প্রকার বৈলক্ষণা ছিলনা; বাহ্যি স্বাভাবিকরূপ হইত, পিপাসা ছিলনা। পূর্ববর্ণিত জালা এত কন্ট্রদায়ক ছিল যে, তজ্জন্ত তাহাকে রাত্রে জাগরিত থাকিতে হইত। নেট্রম-ফ্স ব্যবহারে রোগী ভাল হয়।
- (৪) জনৈক ৪৪ বংসর বয়য় জমিদারের নিম্নোল্লিথিত লক্ষণ ছিল। যথা:—(১) মুথে প্রায় সর্ব্বদাই পিত্রের ন্যায় স্বাদ অনুভব (২) জিহ্বায় দথির ল্লায় লেপ ও উহার তিক্তায়াদ (৩) দিবসে, বিশেষত: আহারের পর বাম্পোলার, উহার তিক্তায়াদ বা স্বাদশূল্লতা, (৪) অকের পাপ্তরতা, (৫) ক্ষ্মা এবং পিপাসার অভাব, (৬) বিয়ার মদিরা, যাহা তাহার প্রিয় পানীয় ছিল তাহাতে বিতৃষ্ণা, (৭) সহজেই কম্পের উৎপত্তি, (৮) মন্তিক্ষের ক্রিয়ারও কত্তকটা বৈষম্য এবং এক চক্ষ্র উপর সর্ব্বদা গুরুভারের ল্লায় চাপামুভব, (৯) মল স্বাভাবিক, কিন্তু থাত্যের স্বল্লতা হেতু মলেরও স্বল্লতা। এই রোগীকে হোমিওপ্যাথিক মতে নক্ম ও পলসেটিলা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। দিনে তিন মাত্রা করিয়া নেট্রম-সলফ ৬× সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে ম্যাজিকের ল্লায় ফল দর্শিয়াছিল।

(৫) ৭০ বৎসর বয়য় জনৈক রুদ্ধের পুরাতন অগ্নিমান্দ্য রোগ ছিল।
ভাষার চেহারা অভিশয় শার্প পাঞ্র ছিল; কুখা মাত্রই হইত না।
আভিশয় অস্থিরতা ছিল। বাহ্যি পরিষ্কার হইতনা—সময়ে পাতলা, সময়ে
কঠিন হইত; জিহবায় পিজলাভ হরিদ্রাবর্ণের (brownish yellow)
লেপ, মুখে তিক্তাঝাদ, চকুর খেত মণ্ডলের নীলাভ-খেত বর্ণ, জকের
কুঞ্জিততা এবং আহারের পর পাকস্থলী প্রদেশে জ্বালাকর বেদনা বিশ্বমান
ছিল। রোগার লক্ষণ সম্হের বিষয় চিস্তা করিয়া পরিপোষণের
(assimilation) অভাবই তাহার রোগের কারণ স্থির করিয়া নেট্রম-সলফ
৬× দিনে তিন বার আহারের পূর্ব্বে সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এই
ঔষধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সায়ুশক্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে কালীফস ৬× ও দেওয়া হইত। প্রায় তিন সপ্তাহেই রোগীর যাবতীয় লক্ষণ
বিদ্বিত হইয়াছিল।

Glandular Affections.

গ্ল্যাণ্ডিউলার য্যাফেকসন্স-গ্রান্থর রোগ।

(চিকিৎসা)

কালী মিউর।—গ্রন্থি অভিশন্ত কঠিনাকার ধাবণ না করিলে ইহা প্রধান ঔষধ। স্কৃষিউলা-দোষ বশতঃ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। কণ্ঠ ও গণগ্রন্থির স্ফীতভা, মঃস্পাস; গ্রন্থির সকল প্রকারের স্ফাতভায়ই ইহা আভান্তরিক ও বাহ্য প্রযুক্তা। ক্যাল্য-ক্লোর।—গ্রন্থির প্রস্তারের স্থায় কঠিন ক্ষীভতা থাকিলে কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। স্ত্রীলোকদিগের স্তন-গ্রন্থির কঠিনতা। গ্রন্থির পুরাতন প্রদাহ ও অতিশয় কঠিনতা।

নেট্,ম-মিউর।—গ্রন্থির ক্ষীততা সহকারে অতিশয় জলীয় লক্ষণ,
যথা—প্রভূত লালাপ্রাবাদি বিশ্বমান থাকিলে ইহা সবিশেষ উপযোগী।
জলীয় লক্ষণ সহ লিক্ষেটিক গ্রান্থর ক্ষীততা। বসা-প্রাবা গ্রন্থির
(Sebaceous glands) ক্ষীততা, মংস্পেস, গল-গণ্ড।

ফিরম-ফস।—গ্রন্থির তরুণ ক্ষাত্তার জর ও বেদনার উপশমার্থ।
ক্যাক্ষ ফস।—গ্রন্থির পরাতন ক্ষাত্তায় ইহা প্রধান ওষধ।
গলগত্তের ইহা প্রধান ঔষধ। স্কুফিউলা ধাতুর রোগীদের গ্রন্থির ক্ষাত্তা।

সিলিশিয়া। —ক্ষীত গ্রন্থির পাকিবার উপক্রমে এই ঔষধ প্রদান করিলে নাদ্র নাদ্র প্যোৎপন্ন হয়। স্কুফিউলা ধাতু।

ক্যান্ধ-সলফ।—অতিরিক্ত পৃযস্রাব নিবারণার্থ।—ক্ষত প্রান্তের কঠিনতা থাকিলে ক্যান্ধ-ফ্লোর প্রয়োজন।

নেট্রম-ফস।—গলগণ্ডের সহিত জিহবা লক্ষণ ও অম্ল-লকণ বিঅমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়।

(স্ক্রফিউলা দ্রষ্টবা)

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) এক ব্যক্তিয় গল-গ্রন্থির (cervical glands) পুরাতন বিবৃদ্ধি ছিল। গ্রন্থি সমুহের এরপ ক্ষীততা জন্মিয়াছিল যে এজন্ম গলা নাড়িতে চাড়িতে প্রায় অসামর্থ্য জন্মিয়াছিল। এলোপ্যাথিক মতে ইহার ষত রকমের চিকিৎসা হইতে পারে তাহা বাকী ছিল না। নেট্রম-সলফ ৩× প্রতি ২ ঘণ্টান্তর ৬সপ্তাহ কাল সেবনেই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল।

Goitre—গলগণ্ড, ঘ্যাগ।

(চিকিৎসিত রোগী)

- (১) ১৩টা গলগণ্ডের রোগীকে নেট্রম-ফস ৩× প্রত্যুক্ত ত বার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়ছিল। ইহার প্রায় সকল রোগীরই ৩—৫ দিনে গলগণ্ড জনিত গুরুত্ব বা চাপ চাপ অনুভব (pressure) কমিয়া গিয়াছিল।
- (২) এক ব্যক্তির গল-গ্রন্থি ব্যাড়য়া কব্তরের ডিম্বের ন্তায় বড় হইয়াছিল। কালা-মিউর সেবনে উহা অনেকটা কমিয়া গিয়া একপ্রকার বন্ধর (uneven) কঠিনতা বিশিষ্ট স্ফীততা অবশিষ্ট হিল। কিছুদিন ক্যাল্ব-ফ্রোর ব্যবহারে উহা একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তির চক্ষর খেত-মণ্ডলের প্রদাহ জন্মে। তথন প্রবায় কালী-মিউর সেবনে উহা সারিয়া গিয়াছিল।

Gonorrhea — গনোরিয়া – প্রমেই।

মৃত্র-পথের শ্লৈদ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ (বেদনা ও স্ফীততা সংযুক্ত অবস্থা) জিমিয়া আব নিঃস্ত হইলে ভাহাকে প্রমেহ বলে। প্রমেহ সংক্রামক রোগ। ন্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে। ঋতুমতী বা তীব্র প্রদরাদি আবশীলা স্ত্রীসংসর্গ, অতি মৈথুন, প্রমেহগ্রস্ত ব্যক্তির বস্ত্র পরিধান বা তাহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও প্রমেহগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে এই রোগ জন্মতে পারে। অপবিত্র সংসর্গের ছই হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ রোগী লিঙ্গমুণ্ডে একপ্রকার বিশেষ কণ্ডুয়ন (চুলকানি) অমুভব করে। এই কণ্ডুয়ন লিঙ্গোখানকালে বদ্ধিত হইয়া প্রক্নত বেদনারূপে প্রকাশ পায়। মৃত্র ত্যাগকালে এই বেদনা অতান্ত বৃদ্ধি পায় এবং রোগের বৃদ্ধিতাবস্থায় প্রায় অসহ হইয়া উঠে। রোগ-লক্ষণ প্রথম প্রকাশের ২।৩ দিন পর মৃত্রনালী স্ফীত, আরক্ত ও আর্দ্র হইয়। উঠে, রেভ:বাহীনাড়ীতে (Spermatic cord) যে নাড়ী-গুচ্ছ অওবন্ন ঝুলান্নমান থাকে) টনটনে ও আকর্ষণবং বেদনা জন্মে এবং মৃত্র-ভাগের পর মৃত্রপথে জালা বোধ হয়। এই জালা এবং মৃত্রমার্গের ক্ষীতভা ও আরক্ততা দিন দিনই বর্দ্ধিত হয়। মূত্রমার্গ হইতে পূষবৎ যে আব নি:স্ত হয় তাহা প্রথমে স্বল্প, পাতলা, সাদা ও আঠা আঠা থাকে। উহা লাগিয়া মৃত্র-পথ বুজিয়া থাকে ও কাপড়ে দাগ লাগে। লিঙ্কমুণ্ড স্পর্শে ক্ষীত, উত্তপ্ত ও ব্যথিত বোধ হয়। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদাম হওয়ায় অত্যস্ত বেদনা জন্মে ও তজ্জ্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয় (এই লিক্ষোচ্ছাদকে কডি বলে)। সাত দিবদ পর আব অভিশয় বন্ধিত, গাঢ়ভর ও পীতাভ-শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং মূত্রত্যাগ ও লিঙ্গোদগমকালে বেদনা চরম সীমায় উত্থিত হয়। এইক্ষণ বেদনা সমগ্র মূত্র-পথে অমুভূত হয়। মূত্র-পথের এই প্রকার প্রবল প্রদাহ জন্ত মৃত্রনালী অভ্যন্ত সঙ্কৃচিত হইয়া পড়েও মৃত্রের ধারা বিভক্ত হইয়া প্রায়শঃই দ্বিধারে মৃত্রস্রাব হয়। এই দ্বিভীয়াবস্থা সাত হইতে চৌদদিবসকাণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

প্রাদাহিক লক্ষণ সকল হ্রাস পড়িবার শঙ্গে সঙ্গে মৃত্রভ্যাগকালীন ও লিঙ্গোদ্যামকালীন যন্ত্রণা কমিতে থাকে, কথন কথন বা উহা একেবারেই থাকে না কিন্তু তথনও পৃষ্প্রাবের কিছুমাত্র বিরাম না জন্মিয়া ক্রমে খেতাভ জাঠা জাঠা ও রজ্বুবৎ আকার ধারণ করে।

রোগের এই শেষোক্ত লক্ষণ সমূহ শাঘ্র শাঘ্র আরোগ্য প্রাপ্ত না হইয়া কিছুদিন থাকিয়া গেলে তথন ইহাকে লালামেহ বা গ্লাট (Gleet) কহে।

(চিকিৎসা)

কালী-মিউর ৩× ।—ইহা প্রমেহের প্রধান ঔষধ। এই রোগ কালে অঙ্গ-বিশেষের ফীততা থাকিলে ইহা প্রায় অমোঘ। গাঢ়, শ্বেড, বা পীতাভ শ্বেত্বর্ণের পূষ নি:সরণ। [লঙ্গ টিপিয়া অভ্যন্তরস্থ পূষ বাহির করিয়া ফেলা একান্ত অন্ততি; কেন না, ইহাতে প্রদাহ বৃদ্ধিপায় ও রোগারোগ্যে বিলম্ব ঘটে; সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রম সর্বতোভাবে বর্জনীয়]।

ফিরুম ফস।—প্রাদাহিক লক্ষণ বিভাগান থাকিলে অপর কোনও ব্যবস্থের ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

কালী ফস — শিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ ও ক্ষীততায় এই ঔষধ আভ্যস্ত-রিক ও বাহ্নিক প্রযোজ্য। মূত্র-দার দিয়া রক্তপাত।

ক্যাজ-সলক ।—রক্ত মিশ্রিত পূ্য বা পূ্যবৎ প্রাথ নিঃস্ত হইলে
এই ঔষধ ব্যবস্থের।

নেট্রম-মিউর ।—পুরাতন প্রমেহে স্বচ্চ, জলবং আব নি:সরণ; জলবং বিদাহী আব, লালামেহ। প্রমেহের পুরাতন অবস্থায় জ্বালা যন্ত্রণা ব্যতীত অল্প আল আব নি:সরণ; (ইহাকে লালামেহ বা গ্লীট বলে)। এই অবস্থায় ক্যাল্ব-ফ্স ও এই ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। নাইট্রেট অব সিল-ভারের পিচকারী দেওয়া হইয়া থাকিলে ইহা তদ্যোষ নিবারণ করিয়া থাকে।

ক্যাজ-ফস।—প্রমেহ সহকারে নিরক্ততা। লালামেহে নেট্রম-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে। স্বচ্ছ, আঠা আঠা, অগুলালের ন্যায় স্রাব।

নেট্রম সলফ। পুরাতন প্রমেহে গাঢ়. পীতাভ সবুজ বর্ণের স্রাব। প্রায় বেদনাহীনতা। ৩× ক্রম, প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রস্তিট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। আঁচিল।

কালী-সলফ।--আঠা আঠা, পীত সবুদাভ প্রাব। লাল্মেই। পীতবর্ণ পূযস্রাব।

সিলিশিরা।—দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রমেহে গাঢ় ছর্গন্ধি পূযস্রাব। সর্বাদা নাত নাত অমুভব, এমন কি শ্রমকালেও লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈত্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ।

নেট্র ফস ৩ × । স্থলার তাঁহার পুস্তকের শেষসংস্করণে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই রোগে ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। আমরাও এই রোগে পুন: পুন: ইহা ব্যবহার করিয়া এই বাক্যের সভ্যতা উপলব্ধি করিয়াছি।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ৭ • বংসর বয়স্ক একব্যক্তির মূত্রনালী হইতে ২ বংসর যাবং অল্ল ২ পরিষ্ণার শ্লেম্মা (mucus) নির্গত হইতেছিল। প্রস্রাব ত্যাগকালে ভয়স্কর জ্ঞালাকর ও খোঁচামারার মত বেদনা হইত। ক্যালী-সলফ. ক্যালী-মিউর এবং নেট্রম-মিউর প্রয়োগ করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে কোন ফল হইয়াছিল না। অবশেষে বেদনার প্রকৃতি দেখিয়া ম্যাগ-ফল ৬× ব্যবস্থা করা হয়। উহাতেই ১ মাসে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

- (২) একব্যক্তির ২ বৎসরের পুরাতন প্রমেহ ছিল। প্রাব পরিষ্ণার, স্বচ্ছ ও অবিদাহী (bland—অর্থাৎ এই প্রাব কোথাও লাগিলে চুলকাইতনা বা ক্ষত ও জ্বালা জন্মিতনা) ছিল। এলোপ্যাথিকমতে Nitrate of Silver দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে কোন উপকার দশিয়াছিল না। এই রোগীকে নেট্রম মিউর ২০০× প্রতি রাত্রে এক এক মাত্রা করিয়া দেওয়া যায়। ৩ সপ্তাহেই প্রাব একেবারে বন্ধ হইয়াছিল।
- (৩) প্রাবের পীতাভ-শ্বেতবর্ণ ও লিঙ্গমুণ্ডের-পিছনদিকে মৃত্র-নালার অভাস্তরে বেদনা লক্ষণে কালা-মিউর ৩× সেবন এবং ৮ আউন্স জলে ১ গ্রেপ পটাস্ পার মেঙ্গানেটের পিচকারী প্রদান করিয়া (প্রত্যহ ১ বার করিয়া) ডাঃ মেয়ার কতকগুলি প্রমেহের রোগী আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এইরূপ পিচকারী প্রদানের পক্ষপাতীনহি। ঠিক ঔষধ প্রযুক্ত হইলে কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। লিঙ্গমুণ্ডে প্রাব লাগিয়া না থাকে এজন্ত ঈষত্ক্ষ জল দিয়া উহা বারবার ধুইয়া পরিষ্কার রাখিলেই ষথেষ্ট।

Gout – গাউট, সন্ধিবাত।

[ক্ষুদ্র সন্ধির বেদনাবিশিষ্ট এক প্রকার প্রাদাহিক পীড়া]
(চিকিৎসা)

নেটুম-ফস।—ভরুণ ও পুরাতন সন্ধিবাতে প্রভূত অন্নগন্ধি ঘর্ম নি:স্ত হইলে ইহা স্থব্যবস্থেয়।

েনট্রম-সলক।—তরুণ রোগে ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে। পুরাতন সন্ধিবাত। পদের সন্ধির তরুণ বা পুরাতন রোগ। ইছা এই রোগের প্রধান ঔষধ।

(রুমেটিজম দ্রপ্টব্য)।

Hæmoptysis — হিমপ্টিসিস্, ফুসফুদ হইতে রক্তত্তাব। (রক্তত্তাব দ্রপ্তব্য)

Headache – হেডেক, শিরঃপীড়া—মাথাধরা।

শির:পীড়া অপর কোনও রোগের একটা লক্ষণ মাত্র। সাধারণতঃ
নিয়লিথিত করেক প্রকারের শির:পীড়া দেখা যায়। যথা:—(>)
মস্তিক্ষে রক্তসঞ্চয় জনিত (কঞ্জেষ্টিভ হেডেক), (২) আমাশরিক বা সবমন

শিরংপীড়া (গ্যাষ্ট্রীক হেডেক) (৩) গুল্মবায়ু জনিত শিরংপীড়া (হিষ্টিরিক-হেডেক), (৪) স্নায়বিক শিরংপীড়া বা অর্দ্ধ শিরংশূল (হেমিক্রেনিয়া, নার্ভাস্ হেডেক), (৫) আমবাতিক শিরংপীড়া (রুমেটিক হেডেক), (৬) সন্দিজনিত শিরংপীড়া (ক্যাটারেল হেডেক) এবং (৭) মনোবিকার জনিত শিরংপীড়া (ইমোশন্তাল হেডেক)।

চিকিৎসা।

কালী-ফস। — অতিরিক্ত মানসিক শক্তির পরিচালনা জনিত শিরংপীড়া। মলিন, ক্রোধ প্রবণ ব্যক্তিদিগের শিরংপীড়া। শিরপীড়ার আবেশের পর অতিশয় তর্বলতা। চাত্র ও ক্লান্ত ব্যক্তিদিগের শিরংপীড়ায় পরিপাকের বিশৃঙ্খলা না থাকিলে। বাসি সরিষা গোলার স্থায় কপিশাভ পীতবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা। তুর্গন্ধি-খাস-প্রখাস। অতিশয় তর্বলতা ও ক্লান্তি সহকারে মন্তক-পৃষ্ঠে বেদনা এবং গুরুত্ব (ফিরম-ফসের পরে)। স্লায়বীয় শিরংপীড়া সহকারে চিস্তা করিতে অসমর্থতা, বলক্ষয় ও নিলাহীনতা; সামান্ত সঞ্চালনে উপশম। আমাশয়-প্রদেশে ক্লান্তি ও শৃত্যতামুভব সহকারে শিরংপীড়া ও তৎসহকারে পৈত্তিক লক্ষণের বিশ্বমানতা। শিরংশূল সহকারে কর্ণে গুণ্ গুণ্ ও নানাপ্রকার স্লায়বিক লক্ষণের বিশ্বমানতা।

ফিরম-ফস।—মন্তকে রক্তের প্রধাবন বশতঃ শিরংপীড়া।

য়্প্রতিবং, প্রচাপনবং বা চিড়িকমারাবং বেদনাবিশিষ্ট শিরংপীড়া।

সঞ্চালনে বা সম্মুখদিকে অবনত হইলে এই বেদনার বৃদ্ধি। মুখমগুল
ও চক্ষুর আরক্ততা। মন্তকে বক্তের প্রধাবন বশতঃ দপ্ দপ্ কর

শিরংপীড়া, শ্তিলভার উহার উপশম। শিরংপীড়া সহকারে অপরিপাচিত
ভূক্তত্ব্য বমন। মন্তক-ত্বকে স্পর্শ লক্ষ্ হয় না। সন্ধির প্রদাহ বা

বাত সহযোগে শির:পীড়া (পর্যায়ক্রমে নেট্রম্ সলফ) স্র্য্যোত্তাপের বা ঠাণ্ডা লাগিবার কুফলে উৎপন্ন মাথাধরা। শির:পীড়া সহকারে কোনও ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক মলাবৃত জিহ্বা থাকিলে পর্যায়ক্রমে সেই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

কালী-মিউর ।— যক্তবে ক্রিয়ার বিশৃষ্থালা সহকারে মাণাধরা, পাং হুটে শ্বেত লেপাবৃত জিহবা। হথের স্থায় শেতবর্ণের শ্লেমা বমন বা কাসিয়া তুলিয়া ফেলা।

নেট্রম-মিউর।—মন্তকে গুরুত্ব সহকারে প্রভূত অশ্রপ্রাব।
নাসিকা ও চকু হইতে জলবং প্রাব নি:দরণ। প্রচুর লালাম্রাব ও
তৎসহকারে কোষ্ঠকাঠিতা। শিরাপীড়া সহকারে নিদ্রালুতা, অভৃপ্তিকর
নিদ্রা, জলবং স্বচ্ছ পদার্থ ব্যন। ধৌবনোন্মুথ বালিকাদিগের অথবা
এই ঔষধের পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিশেষত্ব জ্ঞাপক লক্ষণ সংযুক্ত অনিয়মিত
শ্বভূকালীন শির:পীড়া। প্রাতঃকালীন শির:পীড়া, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে
সঙ্গে এই বেদনার ক্রমে ক্রমে হ্রান প্রাপ্তি।

কালী-সলফ।—উত্তপ্ত গৃহে বা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, ও শাতন বিমৃক্ত বায়ুতে উপশম প্রাপ্ত হয় এরপ শির:পীড়া।

ম্যান্থে সিরা ফস।—রক্তরণের স্থায়, হলবেধবং, তিরবিদ্ধবং অথবা থোঁচা মারার স্থায় বেদনাবিশিষ্ট শিরংশূল। এই প্রকার বেদনা থাকিয়া থাকিয়া উঠে। উত্তাপে উপশমিত ও শীতলতায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এরপ শিরংপীড়া। আমবাতিক শিরংপীড়া। স্নায়বিক শিরংপীড়া সহকারে চক্ষুর সম্মুথে স্ফুলিঙ্গ দর্শন। আক্ষেপিক বেদনা সহকারে শিরংপীড়া, শীতল বাতাসে উহার বৃদ্ধি।

ক্যাক্স-ফ্রন।—মন্তকে শীতলতামুভব এবং স্পর্শেও উহার শীতলতা সংযুক্ত শিরংপীড়া (পর্যায়ক্রমে ফিরম ফ্রন)। শীতল বা উষ্ণ বাহ্ প্রয়োগে এই প্রকার বেদনার বৃদ্ধি। মন্তকে অবশতা ও শীতল মুড় মুড়ি সংযুক্ত শিরংপীড়া। মন্তকের স্নায়ুশূলে ম্যাগ্রেশিয়া-ফ্রন বিফল ইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। প্রাপ্ত যৌবনাদিগের শিরংপীড়া।

নেটুম সলক। —পিত্ত বমন, মুথের তিক্তাস্বাদ, সবুজাভ কটাবর্ণের লেপাবৃত জিহ্ব। প্রভৃতি পৈত্তিক লক্ষণসংযুক্ত শিরংপীড়া। শিরংপীড়া সহকারে উদর বেদনা ও পৈত্তিক মলস্রাববিশিষ্ট অভিসার, শিরোঘূর্ণন, মস্তকে গুরুত্ব। মস্তকশিখরে বা মস্তিক্ষের ভূমিদেশে প্রবল বেদনা।

নেট্রম-ফস।—গাঢ়, সম ত্র্ম গ্রহণের পরবর্ত্তী শিরংপীড়া। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার পরই মস্তক-শিথরে বেদনা ও তৎসহ জিহ্বার পশ্চাদ্তাগে ও উপর তালুতে সরের ক্যায় পীতবর্ণের লেপ। অম ঢেকুর বা অম, জলবং স্বচ্চ পদার্থ বমন। কপালে বা মস্তকপৃষ্ঠে বেদনা বিশিষ্ট শিরংপীড়া। মস্তকে অভিশয় পূর্ণভামুক্তব। ফিরম-ফসের পর ব্যবহার্য্য।

সিলিশিরা।—মন্তকত্বকে মটরের ন্থায় আকার বিশিষ্ট পীড়কা বা গুটিকা সহযোগে শির:পীড়া।

চিকিৎসিত রোগী

(১) জনৈক ৫৫ বৎসর বয়স্কা রমণীর এরপ তীব্র রক্ত্র করণের স্থায় বেদনা বিশিষ্ট শিরংপীড়া জন্মিয়াছিল যে, তাহাতে সে উন্মন্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিত বে তাহার মন্তিম্ব বিদীর্ণ হইয়াছে এবং যেন চক্ষুর ভিতরদিয়া উহা বাহির হইতেছে। এক প্রকার পীতাভ-কটা (Yellowish brown) পদার্থও তাহার চক্ষ্ক হইতে ক্ষরিত হইতেছিল। কালী-ফস ৩×একমাত্রা দেওয়ার ম্যাজিকের স্থায় ফল দর্শে। উহার ২ ঘণ্টা পর

শার একমাত্রা দেওয়ায় বেদনা সম্পূর্ণরূপে উপশমিত হয়। ইহার প্রায় ২ সপ্তাহ পর রোগিণীর এরপ ব্যথা পূন: প্রকাশিত হয় কিন্তু এবার বেদনার তীব্রতা তত উগ্র ছিলনা। এখন আবার কালী ফস ৬× একমাত্র দেওয়া হয়। ঔষধ সেবন করার কিছুক্ষণ পর রোগিণী বলেন যে "এবার তাঁহাকে পূর্বের ঔষধ নিশ্চয়ই দেওয়া হয় নাই। কেননা এবারকার ঔষধের ফল প্রায় অমুভবযোগাই নহে।" ইহা শুনিয়া অমনি কালী-ফল ৩× একমাত্রা দেওয়া হয়। রোগিণী তৎক্ষণাৎ উপশম বোধ করেন। ইহা হইতে এই শিক্ষা লাভ হইল যে, উচ্চতর বা উচ্চতম-শক্তির ঔষধই যে বেণী কার্য্যকরী তাহা নহে, বিশেষ বিশেষ ধাতুর রোগীর পক্ষে বিভিন্ন ক্রম উপযোগী হইয়া থাকে।

- (২) ১৬ বংসর বয়য়া এক য়বতীর মধ্যে মধ্যে মাথা ধরিত।
 শিরংপীড়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পাকস্থলী-প্রদেশে জ্বালাকর বেদনা,
 মুথে তিক্তাস্থাদ ও হর্বলতা অন্তল্মত হইত। এই সব পূর্ববর্ত্তী লক্ষণ
 সাধারণতঃ রাত্রে বা প্রাতে প্রকাশ পাইত। শিরংপীড়ার ভোপকালে
 রোগিণী কোন প্রকার কাজ কর্মাই করিতে সমর্থ হইত না। রোগের
 ভোগকালে কিছু পিত্ত বমন হইয়া পড়িলে তবে যাতনার শাস্তি
 জ্বিতে থাকিত। নেট্রম-সলফ পুনঃ পুনঃ জ্বলের সহিত মিশাইয়া
 কয়েকদিন সেবন করাইলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।
- (>) এক যুবতীর প্রতি মাসিক ঋতুকালেই ঋতুর দ্বিতীয় দিনে এক প্রকার ভেদনবং বেদনা বিশিষ্ট স্নায়বিক শির:পীড়া উপস্থিত হইত। মাথা-ধরার সময় তাঁহার কোন প্রকার শব্দ (গোলমাল) সহ্য হইতনা। কালী-ফস ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরই প্রভৃত পরিমাণ ঋতুস্রাব হইয়া মস্তকের যাতনার উপশম জন্ম।
 - (e) ডা: Hawkins যথন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তথন প্রায়ই

তাঁহার শিরংপীড়া জিমাত। পৈত্তিক গোলধােগ এবং অভিরিক্ত অধ্যয়নই তাঁহার রােগের কারণ ছিল। বেদনার সায়ুশ্লের স্থায় প্রকৃতি ছিল এবং রােগের ভাগে কালে কর্ণে নানা প্রকার শন্দ শ্রুত হইত, দৃষ্টি দৌর্বল্য জিমিত, চক্ষ্র সমুখে ক্স ক্রুত্র বিন্দু দৃষ্ট হইত, কোন বিষয়ে স্থিররূপে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না, সকলই এলােমেলাে বােধ হইত; এতদ্বাতীত জিহ্বায় পীতাভ পিঙ্গল বর্ণের লেপ ও মুখের বিস্থাদ ছিল। কালী-ফদ ০ ঘণ্টাস্তর সেবনের বাবস্থা করা হয়। ঔষধ সেবনের পর তইতেই বিশেষ উপশম বােধ করিতে থাকেন।

Heart affections — হার্ট য্যাফেক্সনস্ হৃৎপিতের রোগ।

চিকিৎসা।

কালী-ফস।—হৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারজনিত সবিরাম দপ্দপ্। স্থারবীয়তা, ত্র্বলতা ও সহজে উত্তেজনশালতাসংযুক্ত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সবিরামতা। আমবাতিক জ্বের পর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ত্র্বলতা ও দপ্দপ্। সকল প্রকার ক্ষরকর জ্বের পরবর্তী ত্র্বলতায় ও নাড়ীর ক্ষীণতায় ইহা আর্মেনিক বা ডিজিটেলিসের সমকক্ষ। হৃৎপিণ্ডের দপ্দপ্সহকারে জ্বিরতা, বিষয়তা, নিদ্রাহীনতা ও স্বায়ুমণ্ডলের ক্র্বলাদ। যে কোন কারণে সমূৎপর মূর্চার ইইা জ্বিশ্য উপকারী।

ফিরুম-ফস।—হংপিণ্ডের বা রক্তবধানাড়ীর প্রশারণে এই রোগের প্রধান ঔষধ ক্যান্ধ-ক্লোরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। হংপিণ্ডের দপ্দপে কালী ফস সহ পর্যায়ক্রমে। ক্যাল্প-ক্লোর।—ছৎপিণ্ডের রক্তবহানাড়ীর প্রসারণ। ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। হৎপিণ্ডে প্রভূত রক্তের প্রধাবন বশতঃ ত্র্বলতা।

কালী-মিউর।—শিরা বা ধমনীতে রক্ত সংযত হইবার আশকা (ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে)। হুৎপিণ্ডে রক্তের অভিশয় প্রধাবন বশতঃ উহার দপ্দপ্ত হর্বলতা। হুৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন (পর্যায়ক্রমে ক্যান্ধ-ফোর)।

ক্যাক্ষ ফস।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার হর্বলতায় অপর ব্যবস্থের ঔষধের সহিত মধ্যে মধ্যে দেওয়া কর্ত্তব্য।

কালী-সলফ।—জত নাড়ী, তৎসহ কটান্থির শিথর-দেশে ধীর দপ দপকর ও খননবং বেদনা। কথা বলিতে অনিচ্ছা ও পাঙুর মুখমগুল (পর্যায়ক্রমে ফির-ফস)।

ম্যাত্রেশিরা-ফ্স।—হৎপিণ্ডের আক্ষেপিকা দপ্দপ্। হৎপিণ্ডে বা হংপ্রদেশে তীত্র, তীরবিদ্ধবং বা থোঁচা মারার ন্তায় বেদনা।

নেট্রম-মিউর।—রক্তহীন ব্যক্তিদিগের হুৎপিণ্ডের দপ দপ,
জ্ববং পাত্রা রক্ত, শোথ ইত্যাদি।

Hemorrhage — হেমরেজ, রক্তসাব।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—শরীরের যে কোন স্থানের রক্তপ্রাবে রক্তের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ থাকিলে এবং দেই রক্ত নাম্ম নাম্ম জমাট হইলে ইহা প্রধান ঔষধ। যে কোন কারণে নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে ইহা ব্যবস্থের। যেখানে বাহ্য প্রয়োগ সম্ভবপর সেখানে বাহ্যিক প্রয়োগ অতিশয় উপকারী। রক্তপ্রাবী শিরার উপর এই ঔষধের চূর্ণ ছড়াইয়া দিতে হয়। ফুসফুস হইতে রক্তপ্রাব। উজ্জ্বল লোহিত রক্ত বমন। নাসিকা হইতে রক্তপ্রাব-প্রবণতা, বিশেষতঃ নিরক্ত ব্যক্তিদিগের (ক্যাল্ক-ফস এবং কালী-ফস সহ পর্যায়ক্রমে)।

কালী-ফস।— হর্বল প্রকৃতির লোকদিগের দৌর্বলা নিবন্ধন রক্তস্রাব। পাতলা, রুফাভ লোহিত রক্তস্রাব। এই রক্ত সংযত হয় না। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবপ্রবণতা (পর্যায়ক্রমে ফির-ফস ও ক্যান্ধ-ফস)। পচারক্তস্রাব। জ্রায়ুর রক্তস্রাব।

কালী মিউর।—মলিন, ক্বফ বা সংযত রক্তপ্রাব।

নেট্রম-মিউর।—পাতলা, মলিন-লোহিড, জলবং রক্তপ্রাব। এই রক্ত সহজে জমাট হয় না।

ক্যাল্ফ-ফ্রোর।—জ্বায়্র রক্তল্রাবে কালী-ফ্স সহ পর্য্যায়ক্রমে।

Hemorrhoids — হেমরয়েড্স, রক্তসূাবী অর্শ।

এই রোগে গুহুদ্বারের পার্শ্বের বা ভিতরের শিরাগুলি ক্টীত হইয়া বিদিত হয়। এই বিদ্ধিত শিরাগুলিকে অর্শের 'বলি' বলে। বলি মলদ্বারের ভিতরে থাকিলে "অন্তর্কালি" ও বাহিরে থাকিলে "বহির্কালি" বলে। অন্তর্কালি হইতে সচরাচর রক্তপ্রাব হইয়া থাকে। আর এক প্রকার বলি আছে তাহা হইতে রক্তপ্রাব হয় না, তাহাকে "অন্ধবলি" বা রাইও পাইলস্ বলে। এই রোগে গুহুদ্বারে চোঁচ ফুটার ন্তায় বেদনা, জালা, বারংবার মলত্যাগের ইচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ বিভ্যমান থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে রোগী অনেকটা ভাল থাকে। স্থতরাং বাহাতে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে সেইরূপ পথ্যাপথ্য ও ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্ব্য।

(চিকিৎসা)

ক্যাক্স স্ক্রোর।—ইহা এই রোগের সর্বপ্রধান ঔষধ। রক্তের বর্ণ ও জিহ্বার লেপ দৃষ্টে অপর যে ঔষধ ব্যবস্থেয় হয় তাহার সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার্যা। মন্তকে রক্তের প্রধাবন সহকারে অর্শ হইতে রক্ত প্রাব। আভ্যন্তরিক বলি বিশিষ্ট, অথবা কটিবেদনা সংযুক্ত অপ্রাবী অর্শ। জিহ্বার বর্ণও দ্রষ্টবা। পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্ত সংযুক্ত অর্শ। এই ঔষধ ভেসিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগও উপকারী।

ক্যিরম-কস।—উজ্জ্বল লোহিত ও সহজ্বে জ্বমাট হয় এরপ রক্তপ্রাবী অর্শ। এই ঔষধ স্থানিক প্রয়োগ করিলে প্রদাহ ও বেদনায় বিশেষ উপকার হয়। কালী-মিউর।—গাঢ়, মলিন রক্তপ্রাবী অর্শে ক্যান্ধ-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

কালী-সলফ।—জিহ্বায় আঠা আঠা, পীতবর্ণের লেপ থাকিলে প্রায়শ:ই ক্যান্ত-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নেট্রম সলক।—নিমোদরে উত্তাপ ও পৈত্তিক লক্ষণ বিশিষ্ট অর্শ। জিহবার বর্ণ দ্রষ্টব্য। ক্যাল্ক-ফ্রোরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যাল্স-ফস।—রক্তহীন বাক্তিদিগের রোগে অন্তর্বার্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

নেট্রম-মিউর।—অন্ত্র-লক্ষণের সহিত মিলিলে ক্যান্ক-ফ্লোরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। শুন্ধ, কঠিন ও কণ্টে নিঃসারিত মল; মুখে প্রভূত লালা সঞ্চয়।

ম্যান্থেশিস্থা-ফস।—বাহ্যবলিবিশিষ্ট অর্শে কর্ত্তনবৎ, থোঁচামারার ভাষ বা বিহ্যতের ভাষ তীব্র চিড়িকমারা বেদনা।

পথ্যাপথ্য 1—এই রোগে কফি, চা মরিচাদি উত্তেজক দ্রব্য; গুরুপাক দ্রব্য, স্বরা, অধিক মংশু, মাংস, দ্বি, মাসকালাই, লাউ, পূঁইশাক ও অশ্বারোহণ পরিত্যজ্ঞা। পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ওল মাথন, ঘোল, রস্কন, এলাচি, আমরুল, আমলকী প্রভৃতি স্থপথ্য। আহারাস্তে বীরাসনে উপবেশন করিলে এই রোগের বিশেষ উপশম জন্মে।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) এক ব্যক্তির বাহ্যবলি বিশিষ্ট অর্শ ক্যান্ধ-ফ্রোর ৩× প্রতি রাত্রে এক এক মাত্রা সেবনে আরোগ্য হইয়াছিল। এই রোগী পূর্ব্বে বহু প্রকার ঔষধ স্থানিক প্রয়োগ করিয়া কোনই ফল পাইয়াছিলনা।

- (২) যদিও রক্তে ক্যান্ধ-শ্রোরের অভাব বশত:ই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তথাপি যেখানেই রক্তন্সাবী অর্শের স্রাবিত রক্ত রুষ্ণ বর্ণ ও গাঢ় (thick) দৃষ্ট হইয়াছে সেই সব স্থলে ক্যান্ধ-ফ্রোরের সহিত পর্যায়ক্রমে কালী-মিউর প্রয়োগ করিয়া অতি উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে।
- (৩) ২৮ বংশর বয়য় এক ব্যক্তি কয়েক বংশর য়াবং রক্তন্সাবী অর্শে ভূগিতে থাকেন। এই রোগের সহিত তাহার পুরাতন কোষ্ঠকাঠিক্ত রোগও বর্তমান ছিল। বাহ্যি করিবার সময় অতিশয় কুথিতে হইত, মস্তকে ভার বোধ (মস্তকে রক্তের প্রধাবন জ্ঞ্য) এবং সময় সময় উত্তাপান্ত্রুত্ব এবং জিহ্বায় কটাভ-শ্বেত বর্ণের লেপ ছিল। ক্যায়-ফ্লোর ৩× এবং কালী-মিউর ৬× পর্যায়ক্রমে ৪ ঘণ্টাস্তর ব্যবহার করায় এবং পথ্যাদির প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করায় কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, আর রোগের প্রবৃত্তি জ্বন্মে নাই। পূর্ব্বোক্ত শ্বিষ সেবন কালে অর্জ আউন্স ক্যায়্ক-ফ্লোর ২× এর সহিত ২ আউন্স ভেসিলিন মিপ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত্ত করিয়া গুহায়ারে স্থানিক প্রয়োগ কয়াও হইয়াছিল। এই প্রকার মলম ব্যবহারে আভ্যন্তরিক ঔষধের ক্রিয়ার অনেক সাহায্য হইয়া থাকে।

Hiccough — হিকঃফ—হিকা।

ভারাক্রাম বা বক্ষোদর-বাবচ্ছেদক পেশীর স্নায়ুর উপদাহ (ইরিটেশন) বশত: ভারাক্রাম ও গ্লাটস (glottis) যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া হিকা উপস্থিত হইয়া থাকে। হিকা অভিশয় ত্র্দিন্য ও বিপজ্জনক উপসর্গ। এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত রোগীদিগের মধ্যেই অধিকাংশ সময় হিকা দেখা যায়।

(চিকিৎসা)

ম্যান্থেশিয়া ফস।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। গরম জলে গুলিয়া ঘন ঘন খাওয়াইলে শীঘ্র শীঘ্র ইহার ক্রিয়া দর্শে।

নেট্রম মিউর।—কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত হিকায় ইহা সবিশেষ উপকারী।

মন্তব্য।—মাধার জলপটা দিলে এবং বরফের জল, মুড়ি ভিজান জল, ডাবের জল, তাল শাঁসের জল, চুণের জল প্রভৃতি থাইতে দিলেও জনেক সময় হিকা নিবারিত হয়।

চিকিৎসিত রোগী।

- (১) ডাঃ বার্ণে ট কুইনাইন অপসেবনের ফলে উৎপন্ন এক ব্যক্তির বছদিনের পূরাতন হিক্কা নেট্রম-মিউর প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এই রোগী যখনই কুইনাইন খাইত তাহার পরই তাহার হিক্কা উপস্থিত হইত। কুইনাইন প্রয়োগের কুফলে উৎপন্ন রোগে আমরাও ইহা প্ররোগ করিয়া বহু স্থলে উপকার পাইয়াছি।
- (২) এক ব্যক্তির টাইফরেড জরের ভোগকালে প্রবল ও হর্দম্য হিকা জ্মে। কোন ঔষধেই কিছু ফল না দশিলে অবশেষে ম্যাগ-ফদ প্রয়োগ করা হয়। ঔষধ দেবনের পর > ঘণ্টার মধ্যেই অনেক উপশম জ্মে। পরে এই ঔষধ আরও ব্যবহার করায় উহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

Hipjoint Disease — হিপজয়েণ্ট ডিজিজ উরুসন্ধির রোগ।

(চিকিৎসা)

ফিরুম-ফস ।—উরুসন্ধির রোগে জর, দপদপকর বেদনা ও প্রদাহ বিভ্যমান থাকিলে প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। স্থানিকও ব্যবহার্য্য।

কালী মিউর া—দ্বিতীয় অবস্থায়, স্ফীততা অবশিষ্ট থাকিলে পুষ জন্মিবার পূর্ব্বে।

সিলিশিয়া।—পৃষ্প্রাব নিয়মিত বা নিবারণ করিবার নিমিত্ত বা শুকাইবার জন্ম প্রযোজ্য। ইহা প্রয়োগ করিলে অন্থি আক্রাস্ত হইতেই পারে না।

ক্যাজ্জ-সলক ।—পুযস্রাব হইতে থাকিলে ফিরম-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে শাঘ্র শাঘ্র ক্ষত শুকাইয়া ধার।

Hoarseness — হোস নৈস্। স্বরভঙ্গ।

স্বরযন্ত্রের পেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ স্বরভঙ্গ জন্মিয়া থাকে। গুলাবায়ু শারীরিক হর্বলতা, অর্ক্ দাদির চাপ, ঠাণ্ডালাগা এবং স্বর-যন্তের অভিচালনা, যথা সঙ্গীত ও বক্তৃতাদির ফলেও স্বরভঙ্গ জন্মিয়া থাকে।

• (চিকিৎসা)

ফিরম ফস। —বক্তা ও গায়কদিগের গলা-বেদনা সংযুক্ত স্বরভঙ্গ। স্বরনাশ। কালী মিউর 1—ঠাণ্ডা লাগার দরুণ স্বরভঙ্গ বা স্বরনাশ। এই প্রথমে উপকার না দর্শিলে কালী-সলফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

কালী-ফস।—হর্মণতা ও স্নায়বিক অবসাদ থাকিলে ফির্ম-ফসের পর ব্যবহার্য্য।

কালী-সলফ।— কালী-মিউর ব্যবহারে কোন উপকার না দর্শিলে ইহাতে উপকার হইতে পারে।

Hydrocele — হাইড্রোসল-কুরগু।

অগুকোষের পর্দার ভিতরে জল সঞ্চিত হইলে তাহাকে কুরগু বলে।
এই রোগে অগুকোষের সেলুলার টিস্থর বিবৃদ্ধি বশতঃ অগুরে অতাস্ত
স্ফীততা জন্মিয়া থাকে। রসবহা-নালী ও রসবহা-গ্রন্থি (Lymphatic
vessels and lymphatic gland) সমূহের প্রদাহ বশতঃ উহাদের
মুথ বন্ধ হইয়া গেলে ক্রমাগতঃ রসসঞ্চয় বশতঃ ঐ সকল স্ফীত হইয়া
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে তত্রতা পেশীসমূহ ক্রমশঃ শীর্ণ
এবং রক্তবহানালী ও স্নায়ুসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সাধারণতঃ
অমাবস্তা ও পূর্ণিমার প্রাকালে এই স্ফীততা বিবৃদ্ধিত হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

নেটুম-মিউর । — পর্দার ভিতর জলসঞ্চর বিশিষ্ট কুরগু।
নেট্রম-সলক্ষ।—বিসর্পের আকার ধারণ করিলে নেট্রম-মিউর সহ
পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

ক্যান্ধ-ফ্স।— মন্ত ঔষধের সহিত অন্তর্কার্ত্তী ঔষধ স্বরূপ বা নেট্রম-মিউর বিফল হইলে। শিরাসকল প্রসারিত হইয়া পড়িলে ইহা অতিশন্ধ উপযোগী।

ক্যাল্ক ফ্রোর 1—ইহা প্রয়োগ করিলে অণ্ডের শিথিলতা দূর হয় ও সঞ্চিত জল নি:সারিত হয়।

সিলিশিয়া 1—ফ্রফিউল। ধাতুর ব্যক্তিদিগের এবং অসম্যক পরি-পোষিত বালক দিগের রোগে অন্তর্মতী ঔষধরূপে ব্যবহার্য। ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। অমাবস্থা ও পূর্ণিমার প্রাক্তালে বৃদ্ধি। কালী মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

মন্তব্য ।—ব্যবস্থেয় ঔষধ ধৈর্য্য দহকারে কিছু বেশী দিন (৩ ৪ মাস) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ।

(চিকিৎসিত রোগী)

- (১) সিলিশিয়া ২০০× ব্যবহার করায় একটা ৪ দিনের শিশুর বাম অণ্ডের এবং আর এক ৪ বৎদর বয়স্ক শিশুর দক্ষিণ দিকের কুরগু আরোগ্য হইয়াছিল।
- (২) আর এক বাক্তির দক্র জন্মিয়াছিল। উহার জন্ম সিলিশিয়া ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যক্তির ৪ বৎসরের পুরাতন হাইড্রোসিলও ছিল। দক্র জন্ম পূর্ব্বোক্ত সিলিশিয়া সেবনের পর দেখা গেল ভাহার হাইড্রোসিল-টীও কমিয়া অণ্ড স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

Hysteria—হিফিরিয়া – গুলাবায়ু, মূর্চ্চা বায়ু।

এই রোগে গলার ভিতর দিয়া গোলার স্থায় কিছু উঠিতেছে রোগীর এরপ বোধ হয় বলিয়া ইহাকে গুল্মবায় বলে। ইহা প্লায়্মগুলী বা নার্ভাস দিষ্টেমের ক্রিয়া-বিকার জনিত একপ্রকার রোগ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দিগের এই রোগ অধিক জন্মে। এই রোগের আবেশ উপস্থিত হইলে রোগী চিৎকার পূর্বক অচেতনের স্থায় মাটীতে পড়িয়া য়য়। ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা য়য় য় বে রোগীর সম্পূর্ণ অচৈতন্ত জন্ম নাই। অপস্মার অর্থাৎ মৃগী রোগের স্থায় এই রোগে মুথমগুলের বিক্তি জন্মে না, চক্ষু বিকসিত অর্থাৎ বোলা থাকে না এবং চক্ষুর তারা প্রসারিত থাকে না। কিন্তু চক্ষুর পাতার স্পান্দন লক্ষিত হয় এবং চক্ষু উর্দ্ধে উথিত হয়। স্থাসে শব্দ হয়, স্থাসের অসমতা থাকে, কিন্তু শ্বাসরোধের সম্ভাবনা থাকে না। রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্রিপ্ত হয় এবং সে একবার হাসে ও একবার কাঁদে। সাধারণত: রোগের আবেশের পর প্রচুর পরিমাণ মৃত্রনিঃস্ত হইয়া থাকে। মৃগী রোগে রোগের আবেশের পর প্রত্রির বেশ নিদ্রা জন্ম কিন্তু এই রোগে তাহা হয় না।

(চিকিৎসা)

কালী-ফস।-ইহা এই রোগের সর্বপ্রধান ঔষধ। হঠাৎ মনো-বিকার বশতঃ রোগোৎপত্তি। স্নায়বিক প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের রোগ। উচ্চ হাস্থ বা ক্রন্দন। কণ্ঠ বাহিয়া একটা গোলা উঠিতেছে রোগীর এরূপ অমুভব। আক্রেপিক লক্ষণের বিগ্রমানে ম্যাগ-ফস সহ ব্যবহার্য।

নেট্রম-মিউর।—বিষয়তা ও অনিয়মিত ঋতুস্রাব সংযুক্ত রোগ।
কালী-ফদের সহিত পর্যায়ক্রমে।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ১৬ বৎসর বয়স্কা এক যুবতীর ১৩ বৎসর বয়:ক্রম কালে একবার মাত্র ঋতু স্রাব হইয়াছিল, উহার পর ভাহার আর ঋতু স্রাব হয় নাই। রোগিণীর চিকিৎসার্থ আমাকে আহ্বান করার ৩ মাস পূর্ব্ব পর্যান্ত ভাগার স্বাস্থ্যের কোনও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছিল না, তাহার শরীর বেশ ছষ্টপুষ্টই ছিল। উহার পর হইতেই তাহার সাস্থাভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। এখন হইতে তাহার শরীর শার্ণ, মুখমগুলের পাঞ্চরতা, শারীরিক দৌর্বলা ও পাকস্থলীর ক্রিয়ার বৈষম্য জন্মে। যখন আমি তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তাহার থাছদ্রব্য পাকস্থলীতে ধারণের ক্ষমতা পর্যান্ত ছিলনা; যথনই খাইত, তথনি উহা বমি হইয়া উঠিয়া পড়িত। সামার কিছু আহার করিবামাত্রই পাকস্থলীতে ভয়ঙ্কর বেদনা জিন্মত। সময় সময় এই বেদনা এত অধিক হইত যে, তথন তাহার হিষ্টিরিয়ার গ্রায় খাক্ষেপ অর্থাং থিচুনি উপস্থিত হইত। তাহার জিহ্বায় ঈষৎ শ্বেতাভ লেপ, কোষ্ঠকাঠিন্স, উদরের বায়ুসঞ্চয় জনিত ফীততা ও ষৎসামান্ত প্রচাপনেও অতিশয় ব্যথিততা লক্ষণ বিভামান ছিল। জর ছিলনা, কিন্তু পিপাসা অধিক ছিল। ভুক্তদ্রব্যের স্থায় পানায়ও পাকস্থলীতে নামিবামাত্র বমি হইয়া উঠিয়া পড়িত। রোগিণীকে প্রথম দেখিয়া তাহার ক্লোগ (nervous dyspepsia) বা সায়বিক অগ্নিমান্দ্য বলিয়া ধারণা জন্মে কিন্তু শেযে জানা গেল যে ইহা স্কম্পন্ত হিষ্টিরিয়া। যথনই এই রোগিণীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা যাইত বা কোন কথা বলা হইত তথনই তাহার "ফিট উঠিত, কিন্তু তথনই যদি বলা হইত যে আবার যদি ভাহার 'ফিট' উঠে তবে ভাহাকে ঠাণ্ডা জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখা হইবে, তথন আর তাহার ফিটের আবেশ হইত না। এই রোগিণীকে প্রথম ১ সপ্তাহ ফিরম-ফস ১২ × দেওয়া যায়, তাহাতে পাকস্থলীর সকল লক্ষণ বিদুরিত হয় এবং পরে ২ সপ্তাহ কালী-ফস ১২ 🗴 দেওয়ায় সকল উপদ্রবেরই শাস্তি জন্মে। ইহার ২ মাস পর হইতেই রোগিণীর স্বাভাবিকরূপ রজস্রাব হইতে থাকে ও তাহার শারীরিক অবস্থারও উৎকর্ম জন্মে।

(২) ৫০ বৎসর বয়স্কা জনৈক ক্ষীণকায়া শ্রামবর্ণা রমণী বহু বৎসর ষাবৎ স্নায়বিক রোগে ভূগিতেছিলেন। সামান্ত ক্রোধোদ্দীপক কারণেই তাঁহার হিষ্টিরিয়ার ক্যায় ফিটের আবেশ জুঝিত। সময় সময় মৃত্রাশয়ের পেশীর আক্ষেপ (spasm) জন্ম তাঁহার মূত্রস্তম্ভও জন্মিত; এজন্ম ক্যাথিটার ব্যবহার করিতে হইত। একদিন রোগিণী চিকিৎসককে বলেন যে, তিনি (রোগিণী) যথন ক্যাথিটার ব্যবহার করিতেছিলেন তথন উহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া মৃত্রাশয়ের ভিতর রহিয়া গিয়াছে এবং এপর্য্যস্ত উহা ঐ অবস্থায়ই আছে। ইহা শুনিয়া চিকিৎসক মূত্রনালীর অভ্যস্তরে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া উহা বাস্তবিকই আছে দেখিতে পাইলেন : এই সময় মূত্রাশয় মূত্রে পূর্ণ ছিল। তথন বেদনার অতিশয় তীব্রতা দেখিয়া রোগিণীকে স্পর্শজ্ঞান বিলোপক ঔষধ ব্যবহার করিতে চিকিৎসক উপদেশ দিলেন কিন্তু রোগিণী ভাহাতে সম্মত হইলেন না। সেই দিন সন্ধ্যার সময় (ভগ্ন ক্যাথি-টার বাহির করিবার ৬ ঘণ্টা পর) রোগিণীর ব্যথা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল ষে, উহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোগিণী চিকিৎসককে পুনরায় ডাকিয়া পাঠান। চিকিৎসক আসিয়া দেখেন রোগিণীর মূত্রাশয়ে ও উদরে অত্যন্ত ব্যথা জন্মিয়াছে এবং অভিশয় সায়বিক লক্ষণ ও অভিশয় মূত্রপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। তখন বেলেডোনা ৩× এক মাত্র। দিয়া চিকিৎসক চলিয়া যান। পর দিন প্রাতে আবার আসেন; আসিয়া দেখেন রোগিণীর অবস্থা আরও খারাপ, কিন্তু জ্ব নাই; তখন মূত্র নি:সরণ করিবার জন্তু রবারের ক্যাথিটার ব্যবহার করেন, কিন্তু মূত্রনালীর এরূপ প্রবল সঙ্গোচন জন্মিয়াছিল যে, উহা প্রবেশ করাইতে সমর্থ হইলেন না; ইহার ২ ঘণ্ট। পর রৌপ্যনির্শ্বিত ক্যাথিটার প্রবেশ করান হয়; তাহাতে কয়েক ফোটা মাত্র মৃত্র নিঃস্তত হইয়ছিল; তথন চিকিৎসক অনুমান করিলেন যে বোধ হয় জরায়র কোনরপ বিশৃদ্ধলা বর্ত্তমান থাকিতে পারে; উহা পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারণের জন্ত রোগিণীকে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিলেন (যেহেতু রোগিণী অতিশয় স্নায়বিক প্রকৃতির ছিলেন); সামান্ত মাত্র ক্লোরোফরম নিঃশ্বসনের পরই উদরের স্কীততা কমিয়া গেল; তথন সহজ্ঞেই পরীক্ষাদ্বারা জানা গেল, তাহার জরায় বা মৃত্রাশয়ের কোন অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটে নাই এবং রোগিণীর ব্যারাম হিষ্টিরিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে; এইক্ষণ বোগিণীকে ম্যাগ-ফস ১২ × দেওয়া গেল; ইহাতে শীঘ্রই তাহার মৃত্রাশয়ের আপেক্ষ (spasm of the bladder) কমিয়া গেল এবং পরে কালী-ফস ১২ × দশ দিন মাত্র ব্যবহার করায় তাহার হিষ্টিরিয়া ও যাবতীয় লক্ষণ বিদ্হিত হইয়া গেল। রোগ আর প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

Insomnia—ইনসম্নিয়া – নিদ্রাহীনতা।

মন্তিক্ষে রক্তের আধিক্য হইলে অনিদ্রা উৎপন্ন হয়। মানসিক উৎকণ্ঠা অবসন্নতা প্রভৃতি কারণেও অনিদ্রা জন্মিতে পারে। অন্তান্ত রোগের সহিত্ত অনিদ্রা লক্ষণ বিশ্বমান থাকে। কালী-ফস এই রোগের প্রধান ঔষধা

Jaundice — জণ্ডিদ — কামলা, পাণ্ডু।

প্রাক্তিক নিয়মে যক্ত রক্ত হইতে পিত্ত শোষণ করিয়া লয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই এই পিত্ত আবার যক্ত হইতে অন্ত্রে আবিত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। যক্ততের কোন প্রকার রোগ বশতঃ পিত্ত যক্ত কর্ত্বক আশোষিত না হইয়া রক্তে থাকিয়া গেলেই পাপ্তু রোগ জন্মিয়া থাকে ও নিয়লিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। চক্ষুর শ্বেতাংশ, নথমূল ও গাত্রত্বক পীতবর্ণ (হরিদ্রাবর্ণ) ধারণ করে। দৃষ্ট বস্তু সকলই পীতবর্ণ দেখায়, কোষ্ঠবন্ধ থাকে এবং অন্ত্রে পিত্ত আবের অভাব হেতু মল শুল্র বা কদ্দম বর্ণ ধারণ করে। মৃত্রেব সহিত প্রচুর পরিমাণ পিত্ত আবিত্ত হয় বলিয়া মৃত্র পীতবর্ণ ধারণ করে। এই রোগে শরীর কপ্তুয়ন, মৃথে তিক্ত স্বাদ, জিহ্বায় শ্বেত বা পীতবর্ণের লেপ এবং বিবমিষা (গা বমি বমি করা) লক্ষণও বিভাষান থাকে। চক্ষু ও মৃত্রের পীতবর্ণ এই রোগের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

(চিকিৎসা) যক্নজোগ দ্রপ্তবা।

Kidneys Affections of — ব্ৰুক বোগ।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—বৃক্কের যে কোন রোগে এদাহ, জর, উত্তাপ বা বেদনা থাকিলে। নিফ্রাইটিস, ব্রাইট্স ডিজিজ প্রভৃতি রোগের প্রাদাহিক অবস্থায়। মৃত্রে রক্তকণিকা বা শ্লেমার (মিউকাস্) বিভয়ানতা। কালী-মিউর—বৃক্কের প্রাদাহিক রোগের দিভীয়াবস্থায় ফীততাদি বর্ত্তমান থাকিলে। মৃত্রে এবুমেনের বিশ্বমানতা। মলিনপীত অধঃক্ষেপ বিশেষ্ট মূত্র।

নেট্রম মিউর। — বৃক্ক-প্রদেশে উত্তাপ ও টন্টনানি। ইপ্তক
চুর্ণের ন্থায় অধ্যক্ষেপ যুক্ত মূত্র। রক্তমূত্র। ডাঃ Menninger বলেন
এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূত্রের এলুমেন হ্রাস প্রাপ্ত এবং ইউরিয়া প্রবন্ধিত
হইয়া থাকে। ইহা প্রয়োগে সর্ব্যপ্রকার ক্লোরাইডও অধিক পরিমাণে প্রাবিত
হইয়া থাকে বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। এক্স ব্রাইটস্ডিজিজে তিনি
ইহা ব্যবহার করিতে সকলকে অন্তরোধ করেন।

কালী-ফস — স্নায়ুমগুলের ক্রিয়ার বিশৃত্যলায় ব্যবস্থেয় অপর কোনও ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। বহুমূত্র। মূত্রে এলুমেন থাকিলে ক্যাল্কফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে। ফুসফুসে জলসঞ্চয় সহ হৃৎপিত্তের সবিরাম স্পান্দন।

ক্যাক্স ফস। —বৃক্কবরোগে মৃত্রে অওলালের বিজ্ঞমানতায় এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। স্নায়বিক লক্ষণ বিজ্ঞমান থাকিলে কালী-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

ক্যাল্স-সলফ।—ইহা ব্যবহার করিয়া Nephritis scarlatinosa নামক রোগ আরোগ্য করা ইইশ্বাছে।

কালী-সলক।—স্বালেটিফিভারের পরবর্তী বৃক্ক রোগ। এবুমেন যুক্ত মূত্র।

েন্ট্রমাকস।—বুককে মৃত্রশিলার বিভ্যমানতা।

নেট্রম-সলফ।—এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে মৃত্র প্রবর্দ্ধিত করিয়া মৃত্রশিলা (gravel) নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

চিকিৎসিত রোগী।

- (১) ডা: Cailhol ৭০ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধের বৃক্করোগের চিকিৎসা করেন। রোগিটীর মূত্র অতিশয় স্বল্ল ও আগুলালিক ছিল। তাহার অতিশয় দায়বীয়তা ও বিশারণশীলতাও বিভাষান ছিল। প্রথমতঃ রোগীকে দেখিয়া চিকিৎসক ভাহার জীবনের আশায় নিরাশ হন। এই রোগীকে ক্যাল্ল-ফস ৬×ও তুই ঘণ্টাস্তর পর্য্যায়ক্রমে কালী-ফস ৬× ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ৬ সপ্তাহকাল এই ঔষধদম ব্যবহার করাম মূত্র স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও অগ্রাগ্ত উপসর্গও অন্তন্তত হইয়াছিল।
- (২) স্বালেটিনার পরবন্তী ২টা ব্রাইটস ডিজিজের রোগীর মূত্রে Tube casts ও এলুমেন দৃষ্ট হয়। তাহাদের সার্বাঙ্গীন শোথ, রেটিনার প্রদাহ ও হৎপিত্তের তুর্বলতা ছিল। তাহাদের অন্তান্ত টিশুর ধ্বংশের লক্ষণ ও বিভামান ছিল। ক্যাল্ক-সলফ ৬× ব্যবস্থা করায় তুইটা রোগাই সত্র আরোগ্য হয়।

Labor and Pregnancy — লেবার এণ্ড প্রেগন্থান্সি – গর্ভ ও প্রসব বেদ্না।

(চিকিৎসা)

কালী ফস। -- কালী-ফদ গর্ভ ও প্রদব বেদনার অতি অমূল্য ওষধ। প্রদবের মাদ থানি পূর্ব্ব হইতে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে অভি সহজে ও নিরাপদে প্রসব হইয়া থাকে। মৃত্, কণ্টদায়ক ও অসম্যক প্রসব-বেদনা। জরায়ু-মুথের কঠিনতা। রোগিণী বেদনায় অস্থির হইয়া পড়ে ও ক্রন্দদ করিতে থাকে।

ডাঃ রোজাস্ বলেন তিনি প্রস্ববেদন। উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত
মটর পরিমাণ কালী-ফস ৪× প্রতি ১০।১৫ মিনিট অন্তর দিয়া বিলক্ষণ
ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধ শুলাকারে জিহ্বায় রাখিতে হয়। ইহা
প্রয়োগ করিয়। তিনি কখনও বিফলমনোরথ হন নাই এবং হই মাত্রায়
পরিবর্ত্তে কখনও তাঁহাকে তিন মাত্র। দিতে হয় নাই। স্থতিকোন্মাদের
ইহা প্রধান ঔষধ। এই রোগে কালী-সলফও ব্যবহৃত হয়। স্নায়বীয়
প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের গর্ভস্রাবাশক্ষা।

ফিরম ফস।—প্রদবের পর প্রস্বাস্তিক বেদনার উপশমার্থ ও প্রদাহ নিবারণার্থ ব্যবস্থের (আভ্যস্তরিক ও বাহ্য)। হগ্ধ-জর ও স্তন-প্রদাহের প্রথমাবস্থায়। গর্ভাবস্থায় আমাশয়ের গোলযোগ ও অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন। প্রসবের পর প্রতিদিন একমাত্রা করিয়া ফিরম-ফস দিলে প্রদাহ উৎপন্ন হইতে পারে না।

ম্যাত্রেশিস্থা ফদ।—অতিশগ্ধ আক্ষেপিক বেদনা ও ক্রন্ত আক্ষেপ। প্রস্বকালীন প্রলাপে উষ্ণজলের সহিত গুলিয়া পুনঃ পুনঃ দিবে।

কালী মিউর।—হতিকান্ধরের প্রারম্ভাবস্থায় ইহা প্রধান ঔষধ। স্তন-প্রদাহে পূ্য জন্মিবার পূর্বের ব্যবহার করিলে স্ফীততা কমিয়া যায়। গভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিব্যাধা ও খেত শ্লেম্মা ব্যন। স্তন-গ্রন্থির কঠিনতা।

ক্যাল্ফ ফস।—প্রসবের পূর্বে বা পরে দার্ণতা ও ত্র্বলতা। স্তনত্ব্যের নীলাক্ততা বা লবণাক্ততাবিশিষ্ট বিগুণতা, এজ্ঞ শিশু উহা খাইতে চায় না। স্তন্ত-দায়িনা মাতার ঋতুস্রাব। গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন গর্ভিণীকে ইহার তুই একমাত্রা দিলে গর্ভিণীর ও ক্রণের বিশেষ উপকার হয়। ক্যাল্ক সলক।—স্তন-প্রদাহে পূয জন্মিলে সিলিশিয়ার পর ব্যবস্থেয়।

সিলিশিয়া।—শুন-প্রদাহে কালী মিউরের পর। শুনের বোঁটে ক্ষত। শুন-গ্রন্থির কঠিনতা (কালী-মিউর বিফল হইলে)।

ক্যান্ধ স্ক্রোর।—প্রস্বান্তিক বেদনার ও জরায়ুর সঙ্কোচনীশক্তির তুর্বলতা। জরায়ুর স্থান-বিচ্যুতিতে এই ঔষধের ইঞ্জেকশন প্রদানে উহা দূর হয়। স্তন গ্রন্থির প্রস্তারের স্থায় কঠিনতা। গর্ভস্রাবের পর প্রভূত রক্তন্তাব। স্তন-ত্থের অভিশয় স্বল্পতা বা বিলোপে ইহা অভিশয় উপকারী।

নেট্রম মিউর !—গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা এবং জলবং ফেণিল পদার্থ বমন।

নেট ম ফস। — অল জলীয় পদার্থ বমন সংযুক্ত প্রাতঃকালীন বিব্যামিয়া।

নেট্রম-সলফ।—গর্ভাবস্থায় তিক্ত পৈত্তিক পদার্থ বমন।

(চিকিৎসিত রোগী)

(১) ডাঃ হোলক্রক বলেন, প্রসব বেদনার ষতই মৃত্তা ও অনিয়্মতিত।
থাকে কালী ফ্রন ৩ × তত্তই ক্রত ও ক্রতকার্য্যভার সহিত ফল দর্শাইয়াথাকে।
আক্রেপিক বেদনায় ম্যাগ-ফ্রন অমূল্য ঔষধ। প্রসবাস্তে তিনি
সর্ব্বেলাই ফিরম-ফ্রন ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রসবকালে যোনিদ্বারের কোন
স্থান চিড়িয়। গেলে তিনি ফিরম-ফ্রন ৩ × বিচুর্ণ উষ্ণজ্বলের সহিত মিপ্রিত
করিয়া (অবতর্বিকা ক্রন্তব্য) উহাদ্বারা পিচকারী দেওয়ার ব্যবস্থা দিয়া
থাকেন। তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীতে পূর্ব্বাক্ত ঔষধ সমূহের চমৎকার
ক্রিয়া দেখিয়া তিনি মুঝ্ম হইয়াছেন।

- (২) গ্রন্থকার তাঁহার ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছেন বে স্থ-প্রসবের পক্ষে কালী-ফসের স্থায় অবার্থ ৬ ক্রত ক্রিয়ানাল ঔষধ আর নাই। শত শত গর্ভিণীর প্রসব বেদনায় ১০।১৫ মিনিট পর পর কালী-ফস ৩× চারি গ্রেণ মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তুই মাত্রার বেশা কাহাকেও দিতে হয় নাই। সকলের পক্ষেই আশ্চর্যা ফল দশিয়াছে। একটা রোগীতেও বিফল হন নাই। যাহারা ইহা দেখিয়াছেন সকলেই ঔষধের গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।
- (৩) ঢাকার প্রধান উকিল স্বনামধন্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চক্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বিভীয় পুত্রবধূর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া ৩ দিন থাকিয়া ক্রমে উহা প্রায় বিলুপ্ত হয়। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর গ্রন্থকারকে আহ্বান করা হয়। তিনি সিয়া দেখেন বাথা একেবারে পড়িয়া গিয়াছে—নাই বলিলেও চলে; মাঝে মাঝে একটু ২ ব্যথা হয় মাত্র। ইহা দেখিয়া কালী-ফল ৩× ট্যাবলেট (৪ গ্রেল) উষ্ণজ্জলের সহিত গুলিয়া এক মাত্রা দেওয়া হয়। ঔষধ প্রয়োগের হাও মিনিট পরই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। ৫ মিনিট পর forcing pain দেখা দিল অর্থাৎ বেদনার সময় প্রস্থৃতি কোঁথ দিতে আরম্ভ করিলেন। তথনই (প্রথম মাত্রা দেওয়ার ৭ মিনিট পর) আর একমাত্রা এই ঔষধ দেওয়া হইল। ইহার ঠিক ২ মিনিট পর (অর্থাৎ ১ম ঔষধের ৯ মিনিট পর) বধ্টী অতি সহজে ১টী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। এই সময় ঢাকার গবর্গমেণ্ট উকীল রায় বাহাত্বর শশাক্ষ কুমার ঘোষ মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঔষধের এইরূপ আশ্বর্য্য ও ক্রত ক্রিয়াশক্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন It takes no time to act ? অর্থাৎ ইহা ক্রিয়া করিতে কি মোটেই সময় নেয় না ?
- (৪) ডা: Vogel বলেন "প্রসবকালীন বেদনায় ও প্রসবের পরবর্তী উপসর্গ সমূহে টিস্থ ঔষধ (বাইওকেমিক ঔষধ) ব্যবহার করিয়া এবং উহার

ফল দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। কালা-ফদ্ দিলে মৃত্ বেদনা বদ্ধিত হইয়া অভি ক্রভ ও নিরুপদ্রবে প্রসব হইয়া থাকে। খাল ধরার ভায় বেদনা (crampy pain) থাকিলে ম্যাগ-ফদ অভি স্থল্পররূপে ক্রিয়া থাকে এবং প্রদবের পর ফিরম-ফদ প্রয়োগ করিলে প্রদাহ জন্মিতে পারে না বা উহা জন্মিয়া থাকিলে ভাহাও আরোগ্য হয়।"

Leucorrhæa — লিউকোরিয়া-খেত-প্রদর।

জরায় হইতে খেত, পীত (হরিদ্রাবর্ণ) ছগ্ধবং, মাংসধোয়া জলের স্তায়, পূষের স্তায় অথবা কাল আলকাতরার স্তায় যে আব হয়, তাহাকে প্রদর বলে। কিন্তু আব সাধারণতঃ খেতবর্ণেরই হইয়া থাকে। এজস্ত ইহাকে খেত প্রদর বলে। অতিরজঃ, শ্লেয়া প্রধান ধাতু, গগুমালা দোষ, স্কুফিউলা, দৌর্বলা, কর রোগ, অতিমৈথুন, ক্রফ্রিম মৈথুন বা জরায়ু নামিয়া পড়া প্রভৃতি বহু কারণে যোনি বা জরায়র প্রদাহ বা উপদাহ বশতঃ এই রোগ জনিয়া থাকে। কোন্তবদ্ধ, হৎকম্প শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি এই রোগের আমুয়েজিক লক্ষণ।

চিকিৎসা।

ক্যাল্প-ফস।—এন্ধনের স্থায় শ্লেমাশ্রাবী (ডিম্বের খেতাংশের স্থায়) খেত-প্রদর। ঋতুর পরবর্তী খেত-প্রদর। জননেক্রিয়ের হর্মলতা। সকল প্রকার খেতপ্রদরেই ইহা অন্তবর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা উচিত। কালী-মিউর।—হুগ্নের স্থায় খেতবর্ণ, অবিদাহী ও প্রভূত প্রাব-

বিশিষ্ট খেত-প্রদর ; দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগে বিশেষ উপকারী।

কালী-ফস।—স্রাব লাগিয়া কত জন্মিলে নেট্রম-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্রম-মিউর ।—জলবৎ, বিদাহী ও জালাকরস্রাব সংযুক্ত শ্বেত-প্রদর এবং তৎসহ শিরঃপীড়া ও যোনির কণ্ডুয়ন। নাইট্রেট অব সিলভার ব্যবহার করিয়া থাকিলে ভাহার কুফল নিবারণার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়।

কালী-সলফ।—শীত, সবুদ্ধাভ আঠা আঠা অথবা জলবং স্রাবনীল খেত-প্রদর।

নেট্রম-ফস।—মধু অথবা সরের স্থায় বর্ণ ও জলবং আববিশিষ্ট খেত প্রদর।

এই রোগে আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহার কালে সেই ঔষধ গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদানও বিশেষ উপকারী।

চিকিৎসিতরোগী।

- (১) ১৭ বংসর বয়স্কা এক যুবতীর তুর্দিম্য বিদাহী (ক্ষতকর) শ্বেত প্রদর ছিল। উহার জন্ত বহুপ্রকারের ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছু-তেই কোন ফল দর্শে নাই। অবশেষে কালী মিউর ৩× ব্যবস্থা করা হয়। উহাতেই অতি ক্রত ফল দর্শে ও স্থায়ী আরোগ্য জন্মে।
- (২) ১৭ বৎসর বয়য়া আর এক যুবতীর আগুলালিক (albuminous) বিদাহী (ক্ষতকর) ও হশ্ছেগ্ন (tenacious) আববিশিষ্ট খেত প্রদর ছিল। এই স্প্রাব তারের ন্যায় লম্বা হইত। ঋতুর পরই আব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত; ঋতুরও অনিয়্মিততা ছিল। সাধারণতঃ চতুর্বিংশ (২৪) দিবসে উহা প্রকাশ পাইত, কথন কথন বা উহার কিছু পূর্বেব বা পরেও প্রকাশ পাইত। কটিদেশে বেদনা, যেন জরায় নামিয়া যোনি-পথে বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ আবেগ অনুভব, উৎসাহহীনতা, মুখ-

মগুলের পাশ্লুরতা ও সর্বাঙ্গীন রক্তহীনতার লক্ষণও বর্তমান ছিল। ক্যান্থ-ফস ০× চারি ঘণ্টান্তর সেবন এবং ২।০ দিন পরপর ক্যালেশুলার লোশন দ্বারা ভুস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধ ব্যবহারের পর কয়েক দিনের মধ্যেই বিশেষ উপকার দেখা যায় এবং আরও কিছুদিন উক্ত ঔষধ ব্যবহারে আব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। ইহার পর রক্তহীনতার জন্ম ফিরমফস ব্যবহার করা হইয়াছিল।

(৩) গ্রন্থকার বহু শ্বেড-প্রদরের রোগিণীকে পর্যায়ক্রমে কালী-মিউর ৩× ও ক্যাল্ব-ফস ৬× প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। রক্ত হীনতা থাকিলে মধ্যে মধ্যে ফিরম-ফস ও নেট্রম-মিউর দেওয়া কর্ত্তব্য।

Liver, Affections of — যক্তভোগ।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—যক্তের প্রদাহ ও রক্তসঞ্চয়ে প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্যা।
কালী-মিউর।—যক্তের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য সহকারে শ্বেত অথবা
পংশুটে শ্বেত বর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা ও ফেঁকাশে বর্ণের মল; যক্তং
প্রদেশে ও দক্ষিণ স্থ্যাপিউলার নিম্নে বেদনা; পিত্তপ্রাবের স্বল্পতা কেঁকাশে বর্ণের মল ও কোষ্ঠ কাঠিতা; কামলা।

নেট্র মা-সলাক।—বিরক্তি জন্ম উৎপন্ন কামলা ও তৎসহ পৈত্তিক সবুজবর্ণ মলস্রাব; সবুজাভ কটাবর্ণের লেপাবৃত জিহবা; চক্ষু ও ত্বকের পীতবর্ণ; পিত্তস্রাবের স্বল্পতা বশবঃ যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেই এই ঔষধ বিশেষরূপে উপযোগী; অতিশন্ন অধ্যয়ন বা মানসিক শক্তির পরিচালনা বশতঃ যক্ততের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হইলে কালী-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। যক্ততের রক্তসঞ্চয় এবং তীব্র বেদনায় ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

কালী-ফস।—স্বায়ুমণ্ডলের অবসরতা সহ বর্কতের ক্রিয়া বৈশক্ষণ্য। অভিশয় মানসিক পরিশ্রম বা মানসিক কট্ট হইতে উৎপর যক্কতের বিকৃতি (নেটুম-সলফ)।

নেট্রম-কস।—যক্তের কাঠিন্ত (Sclerosis) ও ষক্তের বিক্বতি হইতে উৎপন্ন বছম্ত্র। জিহ্বার বর্ণ দ্রপ্তব্য।

নেট্রম-মিউর।—আমাশয়ের প্রতিশায় (Gastric catarrh) হইতে উৎপন্ন কামলা রোগ, নিদ্রালুতা, জলবৎ আব। জিহ্বার লেপ দ্রপ্রতা।

কালী-সলক।—অপর কোনও ওষধ ব্যবহারকালে এই ঔষধের লক্ষণ বর্তমান থাকিলে তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা।

ক্যাক্স সলক। — যক্তের স্ফোটকে বেদনা, ছর্বলতা ও বিবমিষা থাকিলে পূযস্রাব কমাইবার নিমিত্ত ব্যবহার্য্য।

(চিকিৎসিত রোগী)

- (১) ৪২ বৎসর বয়য় এক ব্যক্তির মন্তিষ্কের অতিরিক্ত ক্রিয়ার ফলে যক্তবের ক্রিয়াবৈষষ্য জন্মিয়া ভাচার ফলস্বরূপ অকের হরিদ্রাবর্ণ ও মুখের বিশ্বাদ জন্মে। ইহাকে প্রথম নেট্রম-সলফ দেওয়া হয় কিন্তু ভাহাতে কোন ফল দর্শে না। কিন্তু পরে মন্তিষ্কের ত্র্বলভা এই রোগের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়া কালী-ফল দেওয়া হয়। ২ সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবনেই বিশেষ ফল দেখা যায়। কিন্তু ইহার পর রোগিটী স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় ভাহার শ্বন্থা আর কিছুই জানা যায় নাই।
- (২) একটা মেয়ের পৈত্তিক জর হয়। এজন্য নেটম-সলফ দেওয়া যায়। কিন্তু এই ঔষধ সেবনকালে ভাহার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠে ও

পাণ্ডু (কামলা, জণ্ডিদ্) দেখা দেয়। তথন ইহার পরিবর্ত্তে কালী-মিউর ব্যবস্থা করা হয়। এই ঔষধ সেবনের পরই উপকার দেখা যায় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী আরোগ্য হয়।

(৩) গ্রন্থকার বহু পাণ্ডু রোগীকে নেটম সলফ ৩× অথবা লক্ষণ ভেদে কালী-মিউর ৩× ব্যবস্থা করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুসহ শোথ থাকিলে নেট্রম-মিউর মধ্যে মধ্যে প্রদান করা কর্ত্তব্য। যক্তের রোগে ঔষধ ব্যবস্থা কালে রোগীর জিহ্বালক্ষণ বিশেষরূপে দ্রন্থব্য।

Lumbago — লাখেগো-কটীবাত।

(বেদনা দ্রপ্তব্য)

(চিকিৎসা)

ক্যাজ্ব-ফস।—প্রাতে শ্যা হইতে উঠিবার পরই কটিদেশে বেদনা (নেট্রম ফদ)।

নেট্রম-মিউর।—কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়ন করিলে বেদনার উপশ্য। অনেকক্ষণ সমুখদিকে অবনার্ধ হইয়া থাকিলে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। পৃষ্ঠে দুর্বলিতা অনুভব, প্রাতে উহার বৃদ্ধি।

Measles – মিজেলস্, হাম, ফেরা লুন্তি।

এই রোগ স্পর্শসংক্রামক। শিশুদিগের এই রোগ বেশা হইয়া থাকে।

মুবকদিগের এই রোগ জন্মিলে উৎকট আকার ধারণ কবে। শাঁত ও বসস্ত

কালে ইহার প্রাত্মন্তাব জন্মে। হামের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার ৮ দিবস

পর প্রথমে সামান্য সদির লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনস্তর পৃষ্ঠ বেদনা, কপাল বেদনা, স্থরভঙ্গ, কাসি এবং জর প্রকাশ পায়। জর প্রকাশ পাইবার পর চতুর্থ দিবসে প্রথমে মুখমগুল ও গলায় এবং তৎপর সর্ব্বাঙ্গের রক্ত বর্ণ ক্ষুদ্র পীড়কা প্রকাশ পায়। চারি পাঁচ দিন পর জর কম পড়েও হাম মিশিয়া যায়। হাম উৎকট আকারের হইলে উহার সহিত ব্রন্ধাইটিস বা নিউমোনিয়া প্রভৃতি গুরুতর উপসর্গ সকল উপস্থিত হইতে পারে। কাহারও কাহারও বা উদরাময়, রক্তাতিসার, চক্ষুপ্রদাহ, কর্ণপ্রদাহ প্রভৃতি জন্মে। হাম বিসয়া যাওয়া বা উহার পীড়কাগুলির ক্ষেবর্ণ ধারণ করা প্রলক্ষণ নহে।

হাম ও বসন্তের প্রভেদ।

(১) হামের প্রথমাবস্থায় সদির ভাব থাকে, বসস্তে উহা থাকে না কিন্তু বসন্তের প্রারম্ভে উহার পরিবর্তে বমন ও কোমর বেদনা থাকে। (২) বসস্তের পীড়কাগুলিতে হাত বুলাইলে ছিটাগুলির স্থায় দানা দানা অন্তুত হয়, কিন্তু হামে তাহা হয় না।

চিকিৎসা

ফিরম ফস।--হামের সকল অবস্থায়ই জর চক্ষুর আরক্ততা, বক্ষের ক্র সঞ্চয় ও প্রদাহের নিমিত্ত। প্রারম্ভাবস্থায় বিশেষ উপকারী।

কালী-মিউর।—হামের দ্বিভায়াবস্থায়। স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাস, গ্রন্থির ক্ষাত্তা ইত্যাদি। জিহ্বায় শ্বেত অথবা পাংশুটে খেতবর্ণের লেপ। হামের কুফল জনিত রোগ, যথা—ব্ধিরতা, কণ্ঠের ক্ষাত্তা, ফেঁকাশে বর্ণের পাতলা মল বিশিষ্ট অতিসার। প্রথম হইতে দৃঢ়ভার সহিত ফিরম-ফল ও কালী-মিউর ব্যবহার করিলে হাম জনিত কোনও কুফলের আশক্ষা থাকে না।

কালী-সলফ ।—হাম অথবা অপর কোনও উদ্ভেদ (গুটিকা) বিশিষ্ট রোগ বসিয়া গিয়া চর্ম্মের শুঙ্কতা ও রুক্ষতা জন্মিলে এই ঔষধ ঘর্মপ্রাৰ জনাইয়া উদ্ভেদগুলি পুন: প্রকাশে সাহায্য করে। উষ্ণ বস্ত্রেগাত্ত ঢাকিয়া রাথা কর্ত্তব্য।

নেট্রম-মিউর।—প্রভূত অশ্রু বা মন্ত কোনও প্রকার জলবৎ স্রাব বিল্পমান থাকিলে এই ওষধ মধ্যে মধ্যে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পথ্যাপথ্য।

জরকালীন শতীর পালে। এরোরট, বালি। জর ছাড়িয়া গেলে এরোরট বা বালির সহিত হগ্ধ মিশাইয়া ব্যবস্থা করা ঘাইতে পারে। পেটের অস্তথ বা রক্তাতিসার বিভামান থাকিলে হগ্ধ দিবে না। এই রোগে ঈষৎ উষণজলে গামছা ভিজাইয়া রোগীর গা মুছাইয়া তথনই শুষ্ক বস্তাদি দ্বারা ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিলে উপকার দর্শে (হামগুলি ভালরপে প্রকাশিত হয়)।

(চিকিৎসিত রোগী)

- (১) ডা: কক্ উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার চিকিৎসাধীন ৩৫টা হামের রোগীর প্রথমে সামান্ত মন্তকের প্রতিশ্রায় (কোরাইজা) ও বায়ুভূজনলীর প্রতিশ্রায় জন্মিয়াছিল। এই সকল রোগীর চক্ষ্র খেতমণ্ডলের প্রদাহ ও আলোক-ছেষ বিশেষরূপে বর্ত্তমান ছিল। কিছুদিন পর, হামের গুটিকা (rash) বাহির হয় এবং ৫।৬ দিন থাকিয়া বিলুপ্ত হয়। প্রায় সকল রোগীরই শুটিকা প্রকাশাবস্থায় বা উহা বিলুপ্ত হইবার পর কর্ণ-মূল-গ্রন্থির (এক বা উভয় দিকের) বিবৃদ্ধি জন্মে। এই অবস্থায় শিশুগুলি বেদনা বশতঃ দিন রাত কাঁদিতে থাকিত। সকল রোগীকেই ফিরম-ফস দেওয়া হইয়াছিল। জ্বরের উগ্রতা বা অমুগ্রতা বৃঝিয়া এক বা ত্রই ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া হইছাত। ইহাতে সকল রোগীই ভাল হইয়াছিল।
- (২) গ্রন্থকার এ পর্যান্ত শত শত হামের রোগী ফিরম-ফস ও কালী-মিউর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। একটা রোগীতেও

অক্তকার্য্য হয়েন নাই। হামের গুটিকা বসিয়া গিয়া কুফল স্বরূপ কোন উপদর্গ উপস্থিত হইলে কালী-মিউরের ন্যায় ঔষধ আর নাই। ইহা প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ স্থলেই প্রচুর গুটিকা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে ও তথন গুরুতর লক্ষণগুলিও অন্তর্গত হইয়া থাকে। হাম বিলুপ্ত হইয়া অতিসার বা আমরক্ত জন্মিলে পর্য্যায়ক্রমে ফিরম-ফস ও কালী-মিউর প্রয়োগ করিলে অতি উৎরুষ্ট ফল দর্শে।

Meningitis — মিনিঞ্জাইটিস-মস্তিক্ষ– বিল্লীর প্রদাহ।

মন্তিক্ষ অর্গাৎ ব্রেইন তিন হুব আবরণ দ্বারা বেষ্টিত। এই আবরণকে মন্তিক্ষের ঝিল্লী (meninges) বলে। এই আবরণ-ঝিল্লীর প্রদাহের নাম মিনিঞ্জাইটিস। জর, মন্তকে বেদনা, প্রবল প্রলাপ, মূখমগুলের আরক্ত বর্ণ ও তৎপর পাণ্ডুরতা, নাড়ীর দ্রুততা, পেশীর আক্ষেপ অবসন্নতা ও সংজ্ঞাশৃগুতা এই রোগের লক্ষণ। নবজাত শিশুদিগের এই রোগ অধিক হয়।

আঘাত, পতন ও উপদংশ দোষাদি এই রোগের প্রধান কারণ।
(চিকিৎসা)

ফির-ফস।—এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জর, দ্রুত নাড়ী, প্রলাপ, ইত্যাদি থাকিলে।

কালী মিউর।—ঝিল্লীর রদক্ষরণে (এফিউসন) ইহা ফিরম-ক্ষমের পর অথবা তৎসহকারে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। স্থাট্রম-সলক।—মন্তিক্ষের ভূমি-দেশে প্রবল বেদনা (কালী-ফস এবং ফিরম ফসও ব্যবহৃত হয়)। ডাঃ কেন্ট বলেন মেটিরিয়া মেডিকার আর সমস্ত ঔষধ বাদ দিয়া কেবল মাত্র একটা ঔষধ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে তিনি এই ঔষধই মনোনীত করিবেন। ইহা প্রয়োগ করিলে আশ্চর্যারূপে রোগের বিকাশ প্রতিরুদ্ধ হয়।

ক্যাল্ক-ফস।—শিশুদিগের মন্তিম্ব-বিকারের ইহা প্রথম ও প্রধান ঔষধ। কোনও পরিবারে অনেকের এই রোগ জন্মিবার সন্তাবন। থাকিলে ইহা প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করে।

Menorrhagia, মেনরেজিয়া — রজসাধিক্য, রক্তপ্রদর।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—মুথমগুলের আরক্ততা সহকারে ক্টরজঃ; ক্রেজনাড়ী, উজ্জল-লোহিত ও সহজে জমাট হয় এরপ রক্তপ্রাব, ঋতুকালে অপরিপাচিত দ্রব্য ব্যন্থ। প্রতি ঋতুকালে এরপ জন্মিলে ঋতুর পূর্বের ব্যবহার কবিলে প্রতিষেধকরূপে কার্যা করে।

কালী-ফস।—ইং। অনিয়মিত ঋতুর বিশেষতঃ চ্বল, ক্রোধী ও সহজে অশ্রশ্রাবনালা রমণীগণের রোগে বিশেষরূপে উপযোগী। অভিশয় বিলম্বে প্রত্যাগত, অত্যন্ন বা অত্যধিক রক্তপ্রাব। গাঢ় লাল বা ক্রুম্বাভ লাল, ও কথন কথন (সকল সময় নহে) অভিশয় হুর্গন্ধবিশিষ্ট রক্ত-

প্রাব। এই রক্ত বছক্ষণ থাকিলেও জমাট হয় না। শীর্ণা ও সায়বিক প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঋতুকালে, অভিশয় উদরবেদনা। মনের অভিশয় অপ্রফুল্লভা ও সায়বিক হর্কালভা সহকারে বিলম্বিভ ঋতু।

কালী-মিউর ।—অভিশয় বিলম্বে প্রভ্যাগত অথবা ঠাণ্ডালাগার
দরণ অবরুদ্ধ ঋতু। জিহ্বায় খেত বা পাংশুটে খেত বর্ণের লেপ। অভি
শীঘ্র ও ঘন ঘন প্রভ্যাগত; আলকাতরার গ্রায় রুফ্ণবর্ণ; জ্মাট; ঋতুস্রাব।
দীর্ঘকালস্থায়ী বা শীঘ্র প্রভ্যাগত ঋতু (কালী-ফ্স)।

নেট্রমমিউর।—পাতলা; জলবৎ ও মলিন ঋতুপ্রাব (পর্যায়ক্রমে কালা-ফস)। অল্ল বয়স্থা ও রক্তহীনা বালিকাদিগের এই রোগকালে অভিশয় নিদ্রাল্ভা, বিষয়ভা ও প্রাভঃকালে মস্তকে অভিশয় গুরুত্ব সংযুক্ত শিরংপীড়া থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

মায়ের শিরা ফস।—ঋতুকালীন উদর বেদনার সর্বাপ্রধান প্রথম। ঋতুকালে বা তৎপূর্বে উদর বেদনা। উদরে আবৃঞ্চক বেদনা। উত্তাপে এই বেদনার উপশম। স্বল্প প্রাতশয় উদর বেদনায় এই প্রথম ঘন ঘন দিলে প্রভূত প্রাণ নিঃসারিত হইয় থাকে।

ক্যাল্য-ফ্স।—ম্যাগ্রেশিয়া-ফ্স বিফল হইলে অল্ল বয়স্বা বালিকা ও রক্তরীনা স্ত্রীলোকদিগের অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ইহা বাবহার করিলে জ্বায়র দোষ সংশোধিত হয়। স্তঞ্জদায়িনী স্ত্রীলোকদিগের ঋতু। অল্ল বয়স্বা বালিকাদিগের নিয়মিত কালের বহু পূর্বে ঋতুস্রাব। জননেন্ত্রিয়ে দপ্ত অতিশয় সঙ্গমেচ্ছা।

ক্যান্ত স্থোর।—প্রভৃত রক্তন্তাব সহকারে উরু পর্যান্ত সম্প্রসারণ-শীল বেদনা। প্রভৃত ঋতুন্তাব হইলে এই ঔষধ জরায়র দোষ সংশোধন করিতে বিলক্ষণ সমর্থ। কালী-ফস)। কালী-সলফ।—উদরে পূর্ণতা ও গুরুত্বসংযুক্ত অতিশয় স্বল্প ও বিশ্বিত ঋতুস্রাব। পীত-লেপাবৃত জিহ্বা।

নেট্রম-ফস।—অমগন্ধি বা বিদাহী (অর্থাৎ কোনও স্থানে লাগিলে সে স্থানে ক্ষতোৎপাদনকর) রজস্রাব; সরের ন্যায় লেপাবৃত জিহ্বা; অমলক্ষণের বিভ্যমানতা।

সিলিশিয়া।—কোষ্ঠকাঠিয় সহকারে উগ্রগন্ধি রক্ষ:স্রাব;ঋতুকালে শরীরের বরফের গ্রায় শীতলভা; শীতল জলে কাজ করার ফলে রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে; অতিশয় কামোনাদ।

চিকিৎসিত রোগী।

- (১) এক রমণীর প্রভূত বজঃস্রাব হইত; অতিরিক্ত স্রাব বশতঃ রোগিণী অতিশয় নারক্ত হইয়া পড়েন। নারক্ততা ব্যতীত, উদর বেদনা প্রভৃতি কোনও উপদর্গ ছিল না; ফিরম-ফদ ৩× ব্যবহার করা হয়; উহাতে রোগিণী আরোগ্য লাভ করেন।
- (২) আর এক রমণী মাত্র একটা সস্তান প্রস্ব করিংছিলেন; তাঁহার প্রভূত রক্ষঃ স্থাব হইত; হইবার তাঁহার এত অধিক রক্ষ প্রায় হয় যে মৃত্যু ঘটিবে ব লয়া ভয় হইয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া জানা গেল যে, জরায়ু ক্ষীত ও ভগ-পথে অনেকটা নামিয়া পড়িয়াছে। জরায়ুর মুথের আরক্ততা ও স্পর্শান্ত ভবতা এবং প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ খোলাছিল। জরায়ুর অভ্যন্তর পূর্ণ ও বহির্ভাগ শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; দিনে ৩।৪ বার করিয়া ম্যাগ ফ্ল ৬× দেওয়া হয়; ৩ মানে জরায়ু স্বাভাবিক আকার ধারণ করে ও তিনি ভাল হন।
- (৩) ৩৪ বংসর বয়স্ক। জনৈকা রমণীর সাধারণত: ২।৩ সপ্তাহ পর পরই প্রভূত উজ্জন লোহিত রক্তস্রাব হইত এবং উহ। ৬ দিন স্থায়ী হইত।

রোগিণীর চেহারা অভিশয় শার্ণ ও রক্তহীন এবং মুখমগুলের পাপুরতা (ফেঁকাশে) ছিল। কিন্তু ঋতুকালে এত্রনিপরীত ঘটত অর্থাৎ ঋতুকালে মুখমগুল আরক্তিম হইত ও তৎসহকারে উত্তাপ ও জ্ঞালা বোধ হইত। রক্ত আবিত হওয়া মাত্র যোনি পথেই সংষত (জ্মাট) হইত। এতৎসহ আহার করা মাত্রই ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া পড়িত ও অভিশয় হর্কলতা ছিল। ঋতুস্রাব যে পর্যান্ত অন্তহ্বত না হইত তাবৎকাল পর্যান্ত ফিরম-ফস ৩× বিচুর্ণ প্রতি ২ ঘণ্টান্তর এবং তৎপর ১ সপ্তাহ কাল প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে এক এক মাত্রা সেবনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এইভাবে ৩ মাস পর্যান্ত ঔষধ ব্যবহারের ফলে রোগিণীর ঋতু ক্রমে স্বাভাবিক আকার ধারণ করে ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

(৪) জনৈক রমণীর অভিশয় অধিক পরিমাণ ঋতু আব হইয়া মৃত্যু ঘটিবার সন্তাবনা জন্মায় ডাঃ ডেভিসকে আহ্বান করা হয়। যথনই তাহার ঋতু আব হইত তথনই এইরপ জীবনের আশা থাকিত না। চিকিৎসক পরীক্ষান্তে রোগিণীর জরায়ু অভিশয় কঠিন ও ফীত হইয়াছে জানিতে পারিলেন। ৬ বৎসর পূর্বেরে রোগিণীর ১টা সন্তান জন্মে। তাহার পর হইতেই তিনি পেটে গুরুত্ব অনুভব করিতে থাকেন। জরায়ু ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে। ডাক্তার যথন তাহাকে পেথেন তথন তাহার জয়ায়ু বন্ধিত হইয়। যোনিপথে নামিয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া চিকিৎসক প্রতি ৪ ঘণ্টান্তর এক এক মাত্রা ক্যান্ত প্রদান করেন। এই ভাবে ঔষধ ব্যবহার করায় ৪—৬ সপ্তাহ মধ্যেই তাঁহার জরায়ু ক্রমশঃ ছোট হইয়া স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

Mental Conditions — মেণ্টাল কণ্ডিস্ন্স, মানসিকভাব বা অবস্থা।

চিকিৎসা

কালী-ফ্সা । ইং মন্তিক্বে ক্রিয়া-বিকারের সর্বপ্রধান ঔষধ।
অতিশয় নিরুংসাহিতা, সহজে ক্রোধের আবেশ ও অবৈর্যা। নির্দাহীনতা
বা স্থৃতিক্ষীণতা। অতিশয় অধায়ন বা মানসিক শ্রম জনিত মন্তিক্বের
ত্র্বলতা। চিন্তা করিতে অক্ষমতা। প্রায়বীয়তা, লজ্ঞা, অন্তিরতা,
ভয়, বৃদ্ধিহীনতা ও গোলমালে বিরক্তি। অতিশর দীর্ঘস্তিতা, অতীত
বিষয়ের চিন্তা, বিষয়তা, ত্র্বলতা। মানসিক বিভ্রম, মিথ্যা ধারণা বা কর্মনা
একাকী থাকিতে ইচ্ছা। ইাইতোলা ও অবসাদ। প্রত্যেক বিষয়েরই মন্দ
দিক দর্শন। নিজিতাবস্থায় ইাইতোলা ও বিলাপ করা। শিশুদিগের
রাত্রিকালীন ভয়। সামাল্র মনোবিকারে মুখমগুলের আরক্ততা। সহজেই
উত্তেক্তিত হয় বা শিহরিয়া উঠে। শিশুদিগের অতিশয় থিটথিটে অভাব।
শিশুদিগের ভয় বা চিৎকার করা। অশ্রম্রাব্র প্রবণতা। উন্মন্ততা;
য়ৃক্তিপূর্ণ চিন্তা সংগ্রহে অসমর্থতা। বিভিন্ন প্রকারের উন্মন্ততা ও উহার
বিভিন্ন অবস্থায় ইছা উপযোগী (ফিরম-ফসও ব্যবহার্য্য)। মন্তপায়ীদিগের
পানাত্যয়।

বিংরম ক্সা—ক্রোধের মন্দফল। মন্তিক্ষের রক্তাধিক্য বশতঃ উন্মত্তাবাতজ্ঞপ অবস্থা।

নেট্রম-রিউর।—হৃৎশ্পন্দন সহকারে বিষয়তা; ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশ্বা। নিরুৎসাহিতাও বিমর্যতা সহকারে কোষ্ঠকাঠিয়। অশ্রন্তার প্রবণতা। মন্তপায়ীদিগের অনিদ্রাও কম্পন সংযুক্ত প্রবাপ।

ম্যান্থে শিক্ষা ক্ষা ।— দর্শনে ক্রিয়াদির বিভ্রম। মানসিক পরিশ্রমে অনিক্ষা। চিন্তা করিতে অক্ষমতা।

নেট্রম-সলফ।—আত্মহত্যার প্রবৃত্তি (পিত্তপ্রাবের বিশৃঙ্খলা হেতু)।
(চিকিৎসিত রোগী)

- (১) ৪৪ বংসর বয়য় একব্যক্তির ধর্মোন্মাদ জন্মে। সে সর্বাদা বিলাপ করিত, চিংকার করিত, হাত মোচড়াইত এবং পরিধেয় কাপড়, কাগজপত্র যাহা সম্মুখে পাইত তাহাই ছিড়িয়া টুক্ড়া টুক্ড়া করিত। তাঁহার চারিদিকের পরিচিত য্যক্তিদিগকেও সে চিনিতে পারিত না এবং ঘুমাইতে পারিত না। সে চারিদিকে কেবল শৃশু-দৃষ্টিপাত করিত। ছই জনের কমে তাহাকে ধরিয়া বসাইতে পারা যাইত না। ঔষধ বা থাত্যবস্তু খাওয়াইতে হইলে জাের করিয়া নাক চাপিয়া ধরিয়া তবে সামাশু কিছু খাওয়াইতে পারা যাইত। কালী-ফস বাবস্থা করা হয়। তাহাতেই সে ভাল হয়।
- (২) ৮০ বংশর বয়য় জনৈক বৃদ্ধের বিষাদ বায়ু (মেলুাঙ্কোলিয়া)
 জন্মে। তাহার জীবনে বিভূজ্ঞা জিনায়াছিল, কিন্তু মৃত্যুভয়ও ছিল; সকলকে
 দেখিলেই সন্দেহ জিনাত; সর্বাদাই বিষয়ভাবে বিদয়া থাকিত। প্রথমে
 বহু প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন
 ফল না দশিলে শেষে কালী-ফস ব্যবহার করা য়য়। ইহাতেই রোগী
 সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।
- (৩) ২৬ বৎসর বয়স্ক এক যুবককে দেখিতে যদিও বলিষ্ঠ ছিল এবং তাহার উত্তম ক্ষুধা হইত, তথাপি তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে 'হা''বা 'না'' ব্যতীত অন্ত কোন কথা বলিত না। এবং এই যে 'হা' বা 'না'' বলিত তাহাও অতিশয় জড় বুদ্ধি বাঞ্জক ছিল। তাহার আচার বাবহারও নেহাৎ ছেলে-মাহুষের মত ছিল। রোগীকে পরীক্ষা করায় তাহার সমুদায়

দস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ও মন্তিক্ষের এক পার্ম (বাম) অপর পার্ম হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়' জানা যায়। সে অভিশয় স্লায়বীয় প্রকৃতির ছিল, কোণাও ৫ মিনিট কাল বসিয়া থাকিতে পারিত না। যথন তাহার স্লায়বীয় উত্তেজনা বাড়িত, তখন সে নিজের পরিধেয় কাপড় চোপড় ছিড়িয়া টুক্ড়া টুক্ড়া করিয়া চতুদ্দিকে উড়াইয়া দিত ও একেবারে উলঙ্গ হইয়া পড়িত। নিকটস্থ কাহাকেও চিনিতে পারিত না। লক্ষ্যশৃত্য দৃষ্টিতে কট্মট করিয়া ভাকাইত।

একমাত্র জননী বাতীত আর কাহাকেও বড় ভয় বা সন্মান করিত না।
তাহার হস্ত-মৈথুনের অভাসও ছিলনা, কোনও বিষয়েই তাহার চিত্ত আরুষ্ট
হইত বলিয়া মনে হইত না। এই যুবক ৭ম গর্ভজাত ছিল। কতিপর
বৎসরব্যাপা এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহার কোন উপকারই দেখা গিয়াছিল
না। ইহার পিতামাতা ও অপ্তান্য ভাতাভগিনী সকলেই বেশ বলশালী ও
স্পুকায় ছিল। প্রশ্নের উত্তরে জানা, গেল এই যুবক যথন গর্ভে ছিল তথন
তাহার মাতা কোন প্রকার ভয় বা মানসিক অশান্তি ভোগ করেন নাই,
পক্ষাস্তরে, তিনি ঐ সময় বেশ প্রফুলাস্তঃকরণেই ছিলেন। তথন
ইহার জন্ম ম্যাগ-ফ্স ৩× ও ক্যান্ত-ফ্স ৩× (৫ গ্রেণ মাত্রায়) দিনে প্রতি
ঘণ্টায় পর্যায়ক্রমে ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া গেল। ইহাতেই ক্রমশঃ
তাহার অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। ৮ মাস ওষধ ব্যবহার
করার ফলে সে কাজকর্ম্ম করিয়া থাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

Metritis — মিক্ৰাইটিস।

জরায়্প্রদাহ

প্রসবের বা গর্ভশ্রাবের পর রক্ত দৃষিত হওয়া, বা প্রসবের অল্পকাল পরে সদি লাগা, আঘাত, পতন, ঋতুকালে অধিকক্ষণ দাঁড়ান বা বেড়ান এবং অতিরিক্ত মৈথুন প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্ম। প্রথমে কম্প এবং তৎপর ক্রতনাডী ও জ্বর, নিমোদরে, কোমরে ও উরুতে বেদনা; জরায়তে গুরুত্ব ও ক্লীততা অমুভব, মূত্রত্যাগে কন্ত এবং বিবমিষা ও বমন ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা।

ক্ষিরম-ফস।—প্রারম্ভ বা প্রাদাহিক অবস্থায় জর, বেদনা ও রক্ত-সঞ্চয় হ্রাস করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। জরায়ু-প্রদেশে উষ্ণ সেকও উপকারী।

কালী-মিউর।—প্রদাহের দিতীয়াবস্থায় জরায়ু শ্বীত হইর। উঠিলে। জরায়ুর পুরাতন রক্তসঞ্চয়।

Mouth, Diseases of — মাউথ, ডিজিজেস অব— মুখের রোগ।

ফিরুম-ক্ষস।—মুখের যে কোন রোগে প্রাদাহিক অবস্থায় ইহা ব্যবস্থেয়। মাড়ির ক্ষত, আরক্ততা ও বেদনা।

কালী-মিউর।—শিশু বা শুন্তদায়িনীদিগের মুখের খেতবর্ণ কত। প্রভূত লালাপ্রাব বিশিষ্ট মুখ কত (নেট্রম-মিউর); মাড়ির কতে পূয জ্বি- বার পূর্বে। মাড়ির অতিশয় ক্ষীততা সহ গাঢ় শ্বেতাভ স্রাব নিঃসর্ণ।

নেট্রম ফস।—মুথের ক্ষতে সরের গ্রায় পীতবর্ণ প্রাব নিঃস্থত হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অম লক্ষণের বিভাষানতা।

ক্যাল্স-ফ্স। -- মাড়ির পাণ্ডুবর্ণ (রক্তহীনতার লক্ষণ) থাকিলে একটু দীর্ঘকাল এই ঔষধ ও তৎপর ফিরম-ফস ব্যবহার করিবে। দস্তোদগম কালে মাড়িতে বেদনা (ফিরম-ফস)।

কালী-ফস।-মুখের পঢ়াকত। স্বার্ভি রোগ। তুর্গন্ধি খাস-প্রশাস। মাড়ি হইতে রক্তপাত। উচ্ছল-আরক্ত প্রান্ত বিশিষ্ট মাড়ি।

বেট্রম-মিউর।—প্রভূত লালাস্রাব। মুখের চারিদিকে ফোন্ধার ন্যায় পীডক।।

কালী-সলফ।--নিয়োষ্ঠের শ্লেখা-আবী ঝিল্লার শুম্বতা ও পতন (উঠিয়া হাওয়া)।

ক্যাল্প-তেফু বি। —হমু বা চোয়ালের কঠিন ক্ষী ভভা ও ভৎসহ স্ফোটক।

Miscarriage — মিদ্ক্যারেজ — গভ্সাব।

(গর্ভ ও প্রসবেদনা দ্রফব্য)।

Morning Sickness — মণি সিকনেস্ গভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা।

(চিকিৎসা)

নেট ম মিউর।—প্রাভঃকালীন বিবমিষা সহকারে জলবৎ ফেণিল শ্লেমা বমন। পুনঃ পুনঃ মুখদিয়া প্রভৃত জল বা লালাআব। অভিশয় কুধা মনে হয় যেন পেটে কিছুই নাই, কিন্তু কোন জিনিষেই রুচি জন্মেনা।

নেট্, ম-ফস।—অমপদার্থ বমন সংযুক্ত প্রাতঃকালীন বিবমিষা।
ফিরম-ফস।—আহারের পর ভুক্তদ্রব্য বমন। ইহাতে উপকার
না হইলে পর্যায়ক্রমে ক্যাল্ক ফস দিবে।

মন্তব্য।—অনেক সময় থালিপেটে থাকার দরুণ গর্ভিণীদিগের বিবমিষা ও বমন জন্মে, এরপাবস্থায় গর্ভিণীকে সকালে কিছু খাইতে দেওয়া কর্ত্ব্য। রোগিণীর বেশী নড়া চড়া কর্ত্ব্য নহে। শঘু ও বলকর পথ্য দেওয়া বিহিত।

Mucous membranes — মিউকঃদ মেম্ব্রেন্স — শৈখিক ঝিলীর রোগ।

স্রাবের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহাত হইয়া থাকে। ভাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা—

এব মেনের ভার শ্লেমা — ক্যাল্ড-ফস

তন্তময় (ফাইব্রিন:স)—কালী-মিউর।
পীতাভ, কুদ্র কুদ্র হুচ্ছেন্ত শ্লেমাথণ্ড—ক্যান্ধ-ফোর
পীতবর্ণ, স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট—নেট্রম-ফস।
সবুজাভ শ্লেমা—কালী-সলফ।
পরিষ্ণার, স্বচ্ছ—নেট্রম-মিউর।
পূযাক্ত শ্লেমা—ক্যান্ধ-সলফ।
অতিশয় হুর্গন্ধ বিশিষ্ট—কালী-ফস।
ক্ষতকর—নেট্রম মিউর, ক্যালী-ফস।

Mumps — মণ্ডম্পস, -কর্ণমূল-গ্রন্থির প্রদাহ।

লালাস্রাবী গ্রন্থি, বিশেষতঃ কর্ণমূলের প্রাদাহিক স্ফীততাকে কর্ণমূল-প্রদাহ বলে। এই রোগে সময় সময় সদি লাগিয়া বা শীতল প্রয়োগ বশতঃ সহসা গ্রাবাদির স্ফীততা বিলীন হইয়া পুরুষের অগুকোষ এবং স্ত্রীলোকের স্থন স্ফীত হইয়া উঠে। এই রোগ অতিশয় সংক্রোমক, কিন্তু বিপজ্জনক নহে। এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জর থাকে।

(গ্রন্থির রোগ দ্রফীব্য)

(চিকিৎসা)

ক্ষিরম-ফস।—রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জর লকণ বিভ্যমান থাকিলে। কালী মিউর ।—ইহা গ্রন্থির ফীততার প্রধান ঔষধ। অধিকাংশ স্থলে ইহা ফিরম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

েন্ট্রম-মিউর।— প্রভূত লালান্রাব অথবা অণ্ডের ফীততা সংযুক্ত রোগে অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে বা অন্তব্বস্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবস্থৃত হয়।

পথ্যাপথ্য।—গিলিতে কট্ট হয় বলিয়া অর্দ্ধ তরল পথ্য ব্যবস্থা করিবে। দিনে ৩।৪ বার উষ্ণ সেক দেওয়াও রুগ্ধ স্থান ফ্লানেল দিয়া জড়াইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

Neuralgia — নিউর্যালজিয়া — সায়ুশূল। (চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—প্রাদাহিক কারণ জনিত স্নায়্-শূল। ঠাণ্ডা লাগার দর্মণ প্রবল দপদপকর অথবা প্রেকবিদ্ধবং বেদনা। কোন এক চক্ষুর উপরে বা কপালে অর্দ্ধ শির:শূল। ইহাতে উপকার না হইলে ক্যাল্ক-ফস দিবে। স্নায়্-শূল সহকারে মুখমণ্ডলের আরক্ততা, জালাকর উত্তাপ, জর ইত্যাদি।

ম্যান্থেশিয়া কস।—সকল প্রকার স্নায়্-শ্লেই উত্তপ্তার
উপশম ও শাতলতার বৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে ইহা স্থাবস্থেয়। তীত্র থোঁচা
বা চিড়িক মারার ভায় বেদনা, বক্ষে আরুঞ্চক বেদনা; আক্ষেপিক বা থাক
ধরার ভায় এবং ভেদন অথবা মোচড়ানবং বেদনা; থাকিয়া থাকিয়া বেদনা

উঠে। স্নায়র গতি অমুসারে বেদনার গতি। মুখমগুলের স্নায়ুশূল; উষ্ণগৃহে উপশম, বিমুক্ত বায়ুতে বৃদ্ধি।

কালী-ফস 1—রক্তহীন সায়বিক প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের রোগে উপকারী; সায়্শূল সহকারে ক্রোধপ্রবণতা ও থিটখিটে সভাব। আস্তে আন্তে নড়িলে চড়িলে উপশম। একাকা থাকিলে, উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থানকালে অথবা অভিরিক্ত পরিশ্রমে বৃদ্ধি। সায়্মূল সহকারে অভিশন্ধ ত্র্বলতা ও বলক্ষয়। আলোক ও গোলমালে বিদ্বেষ। শিরংশূল সহকারে নিদ্রাহানতা ও সায়বীয়তা, বেদনাকালে কর্ণে গুণ গুণ শক।

ক্যাস্ক ফ্সা — কোন ব্যবস্থের ঔষধে স্থফণ প্রাপ্ত না হইলে।
(পুরাতন রোগে অন্তর্মন্তী ঔষধ স্থরূপ) রাত্রিতে নির্দারিত সময়ে বেদনার
উপস্থিতি। মনে হয় যেন হাড়ে বেদনা করে। অবশতা ও ঠাণ্ডা স্থড়স্থড়ির
ভায় অন্থভব সহকারে বেদনা। রাত্রিতে ও ঝড় বৃষ্টির দিনে বৃদ্ধি।
গুহুদারের সায়্শূল, মলতাগের পব অনেকক্ষণ পর্যান্ত বেদনার বিভ্যমান্তা।

েনট্রম-াম উর ।—লালা ও অপ্রশাব সহকারে থাকিয়া থাকিয়া সায়-শূলের উপস্থিতি। খোঁচামারা বা তারবিদ্ধবৎ বেদনা। নেউম-মিউর ও মাথেশিয়া-ফসের বেদনার প্রকৃতি ঠিক একই রকম। উভয়ের পার্থক্য এই যে নেউম-মিউরে প্রচুর অশ্রু বা লালা আব থাকে ম্যাথেশিয়া-ফসে থাকে না। মুখমগুলের সায়ুশূল।

কালী-মিউর।—প্রবর্ণ বেদনা সহকারে খেত বা পাংশুটে খেত বর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা।

কালী-ফস।—সন্ধাকালে বা উষ্ণ বায়তে বৃদ্ধি, শীতল বিমৃক্ত বায়তে উপশ্য।

সিলিশিয়া।—অসম্যক পরিপোষিত ব্যক্তিদিগের ত্র্দম্য রোগ। মাঝে মাঝে দেওয়া কর্ত্তব্য।

Ophthalmia---অপথ্যালিমিয়া – চক্ষুউঠা।

চক্ষুর খেতাংশের লালবর্ণ, চক্ষে বালুকণা বা কণ্টকবেধের স্থায় অমুভব, জল বা পূষ পড়া, চক্ষ্ কুট্কুট্ করা, অনবরত চক্ষ্ মুছিবার প্রবৃত্তি ও আলোকাসহাতা এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

রৌদ্র, হিম বা শীত লাগা এবং চক্ষে ধূলিকণা, ধূম বা বাতাস লাগিলে এই রোগ জন্মে। হাম ও প্রমেহ জনিতও চক্ষু প্রদাহ জনিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ফিরম-ফস —সকল প্রকার প্রাদাহিক লক্ষণ সকল বিভাষান থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়।

নেট্রম-ফস।—শিশুদিগের চক্ষ্ উঠার ইহা উৎরুষ্ট ঔষধ।
সম্মাত শিশুদিগের চক্ষ্ হইতে পূযাক্ত আব নিঃসরণ। সরের স্থায়
পূষ্যাব।

কালী সলফ। – সবৃজাভ পৃষ্প্রাব।

ক্যাক্স-সলফ।—গাঢ়, কখন কখন বা রক্তমিশ্রিত পূষ্বৎ প্রাব নিঃসরণ। গাঢ়, পীতবর্ণ প্রাব।

(চক্ষুরোগ দ্রম্টব্য)

Orchitis — অর্কাইটিস, অগুকোষ-প্রদাহ, একশিরা

আঘাত, উপঘাত, প্রমেষ বা উপদংশব্দ বিষ এবং শীত ও ঠাণ্ডা লাগিয়া এইরোগ জনিতে পারে। এক বা উভয় অণ্ডই আক্রান্ত হইতে পারে। রোগাক্রান্ত অণ্ডের অভিশয় শ্লীততা ও বেদনা থাকে। হাত বা কোন প্রকারে চাপ লাগিলে অভান্ত বেদনা করে। শ্লীততা কথন কথন এত বাড়িয়া থাকে যে, অণ্ড স্বাভাবিক অবস্থা হইতে প্রায় চারি পাঁচগুণ বড় হইয়া পড়ে।

(চিকিৎসা)

কালী মিউর।—অণ্ডের প্রদাহ ও শ্লীততা। প্রমেহের স্রাব বিলোপের ফলে অণ্ডপ্রদাহ জিনালে ইহা প্রধান ঔষধ।

ফিরম-ফস।—প্রাদাহিক লক্ষণ, যথা—জর, উত্তাপ ও বেদনা থাকিলে।

ক্যাল্ফ ফস।—অন্তর্কতী ঔষধ স্বরূপ অথবা রোগ প্রাতন আকার ধারণ করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্যাল্ক ফ্রোর।—অণ্ডের কঠিন ক্ষীততা।

Pain — পেইন-বেদনা। [শিরঃপীড়া ও স্নায়ুশূল দেষ্টব্য]

চিকিৎসা

ফির্ম-ফদ।—শরীরের যে কোন স্থানের প্রাদাহিক বেদনায় ইহা ব্যবহার করা উচিত। সায়্শুল, পৃষ্ঠবেদনা, কটি ও উরু প্রদেশের বেদনা, বুক্কক বেদনা। ফিরম-ফসের সকল স্থানের বেদনাই রোগাক্রাস্ত স্থানে শীতল স্থানিক প্রয়োগে, এবং বেদনা গভীর স্থানে হইলে বাহ্য উষ্ণতায় উপশ্ম হইয়া থাকে।

ম্যান্থে শিহা-ফস।—তীব্র, তীরবিদ্ধবৎ, খোঁচামারার স্থায় অথবা মোচড়ানবৎ বেদনায় ইহা অভিশয় ফলপ্রদ। এই বেদনা উষ্ণতায় উপশম ও শীতলভায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। খননবৎ, সবিরাম, সায়ুশূল।

কালী মিউর।—ক্ষাতত। থাকিলে ফিরম-ফসের পর বা তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

কালী-ফস।—রোগাক্রান্ত স্থানের খঞ্জতা ও শক্তিশৃন্ততা।

যৎসামান্ত সঞ্চলনে বেদনা ও আড়স্টভার উপশম কিন্তু অত্যধিক সঞ্চলনে

উহার বৃদ্ধি। রক্তহান ও ক্রোধপ্রবণ ব্যক্তিদিগের স্নায়ু শূল। সঞ্চলনের
প্রারম্ভে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু আস্তে আস্তে নড়িলে চড়িলে উপশম।
প্রফুল্লকর ঘটনায় বেদনার হ্রাস।

ক্যাক্ষ ফস।—বেদনা সহকারে ব্যথিতস্থানে অবশতা ও স্থড়স্থড়ি অমুভব। রাত্রিকালে ও বৃষ্টি বাদলার দিন লক্ষণের বৃদ্ধি। ক্ষয়কর রোগের পরবর্ত্তী বেদনা। কটিবাতে ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়।

স্থাট্রম-মিউর!— অভারক্ত লাল। বা অঞ্জ্রাব সহকারে বেদনা। ফেণিল লালা দ্বারা লেপাবৃত জিহ্বা। মন্তকে মৃত্ গুরুত্ব সহকারে অশ্র্জ্রাব। মাগ্রেশিয়া ফসের বেদনার স্থায় বেদনা সহকারে অশ্র্জ্রাব থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্যা। সাধারণতঃ প্রাভঃকালে বেদনার বৃদ্ধি।

কালী-সলফ ৷—একস্থান হইতে অন্তম্থানে সঞ্চরণশীল বেদনা। সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে, উষ্ণগৃহে অথবা উষ্ণ বায়তে বেদনার বৃদ্ধি এবং শীতল বিমুক্ত বায়তে উপশম।

স্থাট্রম-কস।—বেদনা, বিশেষতঃ আমবাতিক বেদনা সহকারে সরের স্থায় পীববর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা। আহারের পরবর্তী বেদনায়, বিশেষতঃ অম লক্ষণ-বিভয়ান থাকিলে ইহা সবিশেষ উপযোগী।

ক্যান্ধ স্ফোর। শৃষ্ঠ-বেদনা: কটি-বেদনা। বেদনা সহকারে কোষ্ঠবদ্ধতা। অর্শ অথবা জরায়্র নিমগ্নতা বলতঃ বেদনা।

Paralysis — প্যারালিসিস্, পক্ষাঘাত।

কোন অঙ্গের বা শরীরের অর্জাংশের গতিশক্তির বিলোপকে পক্ষাঘাত বলে। এই রোগে সময়ে সময়ে সঞ্চলন শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত অঙ্গের স্পর্শজ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

কালী-ফস।—হঠাৎ বা ক্রমে ক্রমে এই রোগ উপস্থিত হইলে প্রথমেই এই ঔষধের বিষয় চিন্ত। করা উচিত। স্বর রজ্জ্ব পক্ষাঘাত বশতঃ স্বর-নাশ। গতি শক্তির বিলোপ সহকারে জীবনী শক্তির ক্ষীণতা ও মনের পচা গন্ধ। মুথমণ্ডলের পক্ষাঘাত, অদ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত বা শিশুদিগের পক্ষাঘাতে ইহা প্রধান ঔষধ।

ম্যাত্রেশিক্সা কদ। —হস্ত বা মস্তকের অনৈচ্ছিক কম্পন (ক্যাক্ষ ফদ)। পেশার পক্ষাঘাতে কালা-ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

ক্যাল্ফ ফস।—নিয়াঙ্গে শীতলতা, অবশতা ও স্বডম্বড়ি অমুভব।

সিলিশিরা।—টেবিস ডসেলিস রোগজনিত পকাঘাত। পকাঘাত জন্ত সন্ধির তুর্বলতা।

(চিকিৎসিত রোগী)

- (১) জনৈক যুবতী প্রেমভঙ্গে নিরাশ হইয়া আত্ম হত্যার জন্ত এক-প্রকার বিষ সেবন করেন। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু না ঘটিয়া হাত ও পায়ের পক্ষাঘাত জন্ম। ১২ পুরিয়া মাত্র ক্যাত্ম-ফস সেবনেই তাঁহার পক্ষাঘাত সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হয়।
- (২) ২৪ বংশর বয়স্ক এক যুবকের দক্ষিণ গণ্ডের (গালের) পক্ষাঘাত জন্মে। রোগাক্রান্ত স্থানের অবশতা ও স্পর্শজ্ঞান বিলুপ্ত ছিল। মুখ বামদিকে একটু বক্রও ছিল। এজন্ম কথা একটু অস্পষ্ট হইত এবং

হাঁটিবার কালে পদ-বিক্ষেপেরও একটু ব্যক্তিক্রম জন্মিত (shuffling gait) চলৎ-শক্তির এইরূপ ব্যক্তিক্রম দেখিয়া লোকোমোটর এটাক্রিয়া জন্মিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। জলে কাজকরার ফলে, অথবা হস্তমৈথুনাদি কিইবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনার ফলে রোগোৎপত্তি হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ভাহাতে অস্বীকার করে। যাহা হউক, কালী-ফস ৩× ও ক্যাল্ল ফস ৩× প্রতি ৩ ঘণ্টাস্তর পর্যায়ক্রমে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। ২ সপ্তাহ এইরূপ ঔষধ ব্যবহারের পর কেবল মাত্র কালী-ফসই সেবনের উপদেশ দেওয়া হয়। উহাতে ক্রমে ক্রমে ভাহার য়বতীয় উপসর্গ দ্রীভূত হইয়াছিল। পরে রোগী ভাহার হস্ত-মৈথুনের অভ্যাস ছিল বলিয়া স্বীকার করে।

Pthisis Pulmonalis — যক্ষাকাশ

(কনজম্পশন দ্রস্টবা)

Pleurisy — প্লুরিসি — ফুসফুসবেফ – প্রদাহ।

ফুসফুসের আবরণ ঝিল্লীর প্রদাহকে ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ বলে। ইহার লক্ষণ প্রায়ই ফুসফুস-প্রদাহের স্থায় ।

ফিরম ফস।—এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় জ্বর, পার্গে স্চিবিদ্ধবৎ বা চিড়িক মার! বেদনা, হ্রস্ব কাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে কন্ত থাকিলে ইহা অভিশয় ফলপ্রদ। বুকে উষ্ণ শেক দেওয়া কর্ত্তব্য।

কালী মিউর।—রোগের দিতীয়াবস্থায় যথন ফুসফুস-বেইদ্বয়ের মধ্যে চটচটে আব ক্ষরিত হয় তথন ইহা ব্যবহার্যা। খেত বা পাংশুটে খেত লেপার্ত ছিহবা।

নেট,ম-মিউর—ফুস্ফ্স-বেইছয়ের মধ্যে জলবং প্রাব ক্ষরিত হইলে ইচা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগের পরও যদি এরপ রসক্ষরণ জন্মে, তথনও ইচা ব্যবহার্যা।

ক্যাল্ক-সলফ।—ফুসফুস-বেপ্তদ্বয়ের মধ্যে পূয সঞ্চিত হইলে ইহা ব্যবহার্যা।

ক্যাল্ফ ফস।—পুরাতন রোগী। প্রতি খাসেই বৃকে বেদনা অন্তভব।
(নিউমোনিয়া দ্রষ্টব্য)

Pneumonia — নিউমোনিয়া, ফুসফুস প্রদাহ।

স্পৃস্পের মূল উপাদানের প্রদাহকে নিউমোনিয়া বলে। ইহাতে এক বা উভয় ফুসফুসই আক্রান্ত হইতে পারে। নিউমোনিয়ার তিন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ নাত বোধ পূর্ব্বক জ্বর হইয়া এই রোগের আরম্ভ হয়। জর ১০৩ ডিগ্রী হইতে ১০৬ বা ৭ ডিগ্রী পর্য্যস্ত উঠিয়া থাকে। প্রথমত: জ্বর সহকারে বুকে বেদনা ও কাসি থাকে এবং অল্ল অল্ল আঠা আঠা শ্লেমা অংবিত হয়। অনন্তর এই শ্লেমা মরিচার বা ইটক চুর্ণের বর্ণ ধারণ করে। কাসিবার কালে বুকে আকুঞ্চন অমুভব, দ্রুত শ্বাস, মাথাধরা ও নিঃখাস-প্রখাসে কষ্ট থাকে। পরে দ্বিতীয় অবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় বেদনা হ্রাস পড়ে, কাসে তত কট হয় না, শ্লেম্মা সহজে উঠে এবং উহার হুশ্ছেখতা ও আরক্ততা দূর হয় কিন্তু খাসের দ্রুততা তথনও বর্তমান থাকে। ইহার পর তৃতীয় অবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় রোগ আরোগ্যের দিকে গেলে হ্রর কম পড়ে, খাসের ক্রততা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কাস ও শ্লেমাস্রাবের লাবব জন্মে, কুধা প্রত্যাবৃত্ত হয় ও রোগী ক্রমশঃ স্থাস্থ বোধ করে। কিন্তু পক্ষান্তরে ফুসফুদে পূয উৎপন্ন হইলে নাড়ী ক্রততর ও ক্ষীতভর, শ্বাস জভতর, শ্লেমা পৃযাক্ত ও প্রচুর বর্মা হয় এবং অবশেষে ত্বলভা বশভঃ রোগীর মৃত্যু ঘটে। কথন কথন পূষ তুলিবার অক্ষমতা নিবন্ধন শ্বাস-রোধবশতঃ রে।গীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ফির্ম-ফস।—ফুসফুদ-প্রদাহের প্রারম্ভ অর্থাৎ রক্তসঞ্চিতাবস্থার ইহা প্রধান ঔষধ। উচ্চ গাত্যোত্তাপ, ঘন ও আয়াসিত শ্বাস-প্রশ্বাস, অন্থি- রতা, উদাসীনতা ও সময় সময় তদ্রালুতা। যে পর্যান্ত প্রচুর ঘর্মুপ্রাব হইয়ারোগী একটু স্বস্থ বোধ না করে, সে পর্যান্ত ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য। প্রাদাহিক অবস্থার পর ফুসফুসে শ্লেয়া সঞ্চিত হইলে ইহা ঘারা আর কোনও উপকার দর্শে না। শিশু ও বৃদ্ধদিগের ফুসফুস-প্রদাহে ইহা বিশেষ উপযোগী। পরিষ্ণার রক্ত নিষ্ঠীবন। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে ফুসফুস-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় রক্ত নিষ্ঠীবিত হইলে ইহা অতিশয় নির্ভর্ষোগ্য ঔষধ। ফুস-ফুসের শিখর-দেশ যক্তের স্থায় নিরেট অবস্থা ধারণ করিলেও ইহা ব্যবহার্য্য।

অন্থিরতা ও নড়িলে চড়িলে বিশেষরূপে বেদনা অনুভব না করিলেও (একোনাইট ও জেলসিমিয়মের মাঝামাঝি অবস্থা . ইহা ব্যবহৃত হয়। ষ্টেথস্বোপ দ্বারা পরীক্ষা কালে বুকে চিড়চিড় শব্দ (crepitant rales) শ্রুত হইলে। মরিচার স্থায় বর্ণ বিশিষ্ট শ্রেমা নিষ্ঠীবন। ডাঃ লরেন্স বলেন, "এই রোগের চিকিৎসায় ভিরেউম-ভিরিডি ও এই ঔষধ দ্বারা বেরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি অপর কোনও ঔষধ দ্বারা ভজ্ঞপ স্থফল প্রাপ্ত হই নাই।"

কালী মিউর।—তন্তুময় পদার্থ বিশিষ্ট নিষ্ঠীবন। খেত লেপাবৃত জিহবা খেতবর্ণ, চন্ছেছ্য (আঠা আঠা) শ্লেয়া। ফুসফুস-প্রদাহের সহিত কণ্ঠ নাসিকা ও কর্ণে প্রতিশ্রায়ের (সদি) ভাব লক্ষিত হইলে এবং এই রোগের ভোগকালে হাদ্ লক্ষণ বা শোথের ভাব বিছমান থাকিলেও, ইহা বিশিষ্টরূপে উপযোগী।

ম্যাগ-ফ্স।—শ্লেখা নিষ্ঠীবন ব্যতীত সময় সময় আক্ষেপিক কাসের উপস্থিতি। বুকে সঙ্কোচন অর্থাৎ এটেধরার স্থায় অনুভব। রাত্রিকালে এবং শয়িতাবস্থায় কাসের বৃদ্ধি।

কালী ফস।—সারিপাতিক অবস্থা। স্নায়ুমণ্ডলের অবসরতা, নিদ্রা-হীনতা, অতিশয় হর্কালতা, ঘন শ্বাস, হর্গন্ধি শ্লেমা নিষ্ঠাবন, স্বরভঙ্গ, গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণ, লবণাক্ত নিষ্ঠাবন। আক্ষেপিক কাস সহকারে প্রভূত, ফেণিল ও রক্তাক্ত শ্লেম্মা নিষ্ঠাবন, মনে হয় রোগীর শ্বাস রোধ বশতঃ মৃত্যু ঘটবে।

সিলিশিয়া।—পুরাতন ও উপেক্ষিত রোগের পূষসঞ্চিতাবস্থা।

চিৎ হইয়া ভইলে খাসকষ্ট। ফুসফুসের গভীর-প্রদেশে বেদনা, শিথিল

বড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট শ্লেমা। নৈশজ্জর, প্রভূত নৈশঘর্ম এবং হর্মলতা।

ক্যাক্স-ফস্।—শিশুদিগের রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। কাসিতে কাসিতে হরিদ্রা বর্ণের শ্লেম্মা উঠে। প্রাতে বৃদ্ধি, বুকে চিড়িক মারা বা স্থাচিবিদ্ধবং অথবা ক্ষতবং বেদনা।

কালী-সলক। — ফিরম-ফস ব্যবহার করিয়াও যাদ পর্যাপ্তরপে বর্মপ্রাব না হয়, তবে তৎ সহকারে পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। গলায় সাঁই সাঁই বা ঘড়্ ঘড়্ শল সহকারে পীতবর্গ, তরল অথবা জলবৎ পীতবর্গ শ্রেমা নির্চাবন পরিত্যক্ত হইলে ইহা সবিশেষ উপযোগী। কাসিবার কালে শ্রেমা কতকটা উঠিয়া পুনরায় পশ্চাদ্দিকে সরিয়া পড়ে ও উহা গিলিয়া ফেলিতে হয়। য়াস রোধের ভায়ে অনুভব। ঠাগো বাতাস পাইবার ইচ্ছা। কাসিবার কালে হাতদ্বারা বুক ধরিতে হয়। সন্ধ্যাকালে তাপের বৃদ্ধি। পূব নির্চাবন বিশিষ্ট ফুসফুস প্রদাহ।

নেট্রা-মিউর।—ফুসকুস প্রদাহে পরিষ্ঠার, ফেণিল, ও বড়্বড়্ শব্দ বিশিষ্ট তরল শ্লেমা নিষ্ঠাবন এই ঔষধের পরিচালক লক্ষণ। জিহ্বার উভয় পার্শ্বে লালার বুদুদের বিজ্ঞমানতা। বিরক্তিকর কাস সহকারে গুরুত্ব ও আঘাতিতবং বেদনাবিশিষ্ট শিরঃপীড়া।

মন্তব্য।

এই রোগে রোগীর গৃহ উষ্ণ ও শরীর উষ্ণ বস্তাবৃত রাখা উচিৎ। বক্ষঃস্থলের সকল প্রকার প্রাদাহিক রোগেই উচ্চ বালিশে ঠেকা দিয়া বুক উচু করিয়া রাথা উপকারী। দীর্ঘ ও পুরু মসিনার পোল্টিসন্বারা অবিরত বক্ষংস্থল ও পৃষ্ঠ আবৃত রাখিলে অতিশয় উপকার দর্শে। রোগীর চুপ করিয়া থাকা উচিত। সাগু, এরারুট, বালি প্রভৃতি এই রোগে পথা।

কতিপয় লাবণিক পদার্থের অভাবই এই রোগের কারণ। স্থতরাং লক্ষণদৃষ্টে উহার অভাব পরিপূরণ করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। প্রথম বা প্রাদাহিক অবস্থায় ফিরম ফদের সহিত পর্য্যায়ক্রমে কালী-মিউর দিলে স্থানিক প্রদাহ ও জর প্রভৃতির বিরাম এবং দেহ হইতে আগুলালিক পদার্থের নিশ্রব প্রতিরুদ্ধ হয়। ফেণিল শ্লেমা নেট্রম-মিউর জ্ঞাপক। ঐ লক্ষণে ইহা দিলে অতিশয় উপকার দর্শে। রোগের দ্বিতীয়াব্রুায় ত্বক যখন অতিশয় শুষ্ক থাকে তখন কালী সলক ব্যবহার করা উচিং। উষ্ণ জলের সহিত ইহার কতিপয় মাত্রা দিলে নিশ্চয়ই ঘর্মপ্রাব হইয়া অতিশয় উপকার দর্শে। মধ্যে মধ্যে গরম জল খাইতে দেওয়া এবং গরম জলে পরিষার নেকড়া কিম্বা গামছা ভিজাইয়া উত্যরূপে নিংড়াইয়া উহা দ্বারা দিনে গুইবার করিয়া রোগীর গা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলাও অতিশয় উপকারী। অতিশয় আন্তে আন্তে বৃক ও পিঠ মুছিয়া ফেলাও ভিচং, যেন উহাতে রোগীর বুকে বেদনা বা কষ্ট না হয়।

Rheumatism — রিউমেটিজম্ — বাত, আমবাত।

ইহাকে সাধারণতঃ বাতের ব্যারাম বলে। শরীরে ল্যান্টিক এসিডের আধিক্য হইলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। রোগের প্রারম্ভ জর হয় এবং জরের সঙ্গে সঙ্গের্জ সিদ্ধিন্তা, জয়েন্ট্র্স, শনীত, আরক্ত ও বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে। নড়িলে এটি বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কথন কথন বা সমস্ত সন্ধিই পূর্ব্বোক্তরূপে স্ফাত ও ব্যথিত হইয়া উঠে। এই বোগে ত্বক অতিশয় উত্তপ্ত ও হুর্গন্ধি অয় গন্ধযুক্ত ঘর্মে আর্ত; কোষ্ঠবদ্ধ; কিহবা ময়লার্ত; নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন, এবং মূত্র আরক্ত থাকে। সময়্ব সময় বেদনা এক সন্ধি হইতে অন্ত সন্ধিতে নড়িয়া বড়ায়। এই রোগ ২০ সপ্তাহ পর আরোগ্য হয়, নতুবা পুরাতন আকার ধারণ করে। আমবাতে জর ১০৪া৫ ডিগ্রী পর্যান্ত উঠিয়া থাকে। ১০৪ ডিগ্রী পর্যান্ত জর উঠিলে হংপিণ্ড আক্রান্ত হইবার আশক্ষা থাকে। এই রোগে হংপিণ্ড আক্রান্ত হইলে অতিশয় উৎকট আকার ধারণ করে। হুৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে অতিশয় উৎকট আকার ধারণ করে। হুৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে বামপার্থে বেদনা, বুকে বেদনা, শ্বাস-কন্ত ও স্থংপিণ্ডের

ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা বা বৈষম্য উপস্থিত হয়।

আম শব্দের অর্থ ভরুণ, অর্থাৎ অপক। বাতের ব্যারাম ভরুণ অবস্থায়
থাকিলে আমবাত বলে। আর আরোগ্য না হইয়া পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত
হইলে তাহাকে পুরাতন বাত বলে। পুরাতন বাতে কোমরের পেশা
আক্রান্ত হইলে তাহাকে কটিবাত বলে। এই কটিবাতে উক্ত-পৃষ্ঠের বৃহৎ

স্বায়ুর (সায়েটিক নার্ভ) বেদনা জন্মিলে তাহাকে গৃধসী বা সায়েটিকা বলে।

গৃঙ্ধদী বা সায়েটিকায় বেদনা কোমর হইতে নিমাভিম্থে নামিয়া উক্ন পর্যান্ত প্রসারিত হয় এবং নড়িতে চড়িতে অত্যন্ত বেদনা জন্মে।

ঠাণ্ডালাগা অধিকক্ষণ ভিশা কাপড়ে থাকা, অধিক পরিমাণ মাংস, টক্ দ্রব্য বা ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার হঠাৎ ঘর্মরোধ প্রভৃতি কারণে বাতরোগ জন্মিয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

কিরম-কস।—প্রথম বা আক্রমণাবস্থায়, ও জর থাকিলে ইহা প্রধান ঔষধ। প্রারম্ভাবস্থায় পুনঃ পুনঃ এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ স্চনায়ই আরোগ্য হয়। সন্ধির তরুণ বাতে অতিশয় বেদনা থাকিলে ও নড়িলে চড়িলে এই বেদনার বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা চমংকার ফল দর্শে। সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ সন্ধিস্থলে আড়স্টতা ও ক্ষতবং বেদনা। কটিবাত। ঠাগু। লাগার দরুণ গ্রীবার অনমাতা। সকল প্রকার বাতের বেদনারই সঞ্চলনে বৃদ্ধি। বেদনার প্রাবল্য জন্ম অনিদ্রা। বিশ্রামের পর সামান্ত সঞ্চলনে আড়স্টতামুভব। নড়িলে চড়িলে বা নড়িবার কথা মনে হইলেই বেদনার বৃদ্ধি।

কালী-মিউর।—আমবাতিক জরের দিতীয়াবস্থান সন্ধিস্থলে মস্ত (serum) সঞ্চিত হইলে। রোগাক্রান্ত অঙ্গের ফীততা।

ম্যান্থে শিক্ষা-ফস।—সন্ধিতে তাত্র চিড়িক মারাবৎ বেদনা। আম বাতিক জ্বর ও তৎসহ খননবৎ বেদনা থাকিলে অপর কোন প্রধান ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা। উষ্ণতায় ও দৃঢ়চাপে উপশম, সঞ্চলনে ও মৃহচাপে বৃদ্ধি।

কালী সলক। —স্থানবিচরণনাল আমবাতিক বেদনা। উত্তপ্ত গৃহে বা সন্ধ্যাকালে বেদনার বৃদ্ধি, নাতল বিমৃক্ত বায়ুতে উপশম। সন্ধির তরুণ বা পুরাতন স্থানবিকল্পাল বেদনা; আমবাতিক শিরঃপীড়ার সন্ধ্যা- কালে বা উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি। উপরোক্ত লক্ষণাপন্ন পৃষ্ঠ, গ্রীবা বা হস্ত-পদের আমবাতিক বেদনা।

কালী কস।—রোগাক্রান্ত স্থানের আড়প্টতা সহ তর্রণ বা পুরাতন বাতের বেদনায় ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। সঞ্চলনের প্রারম্ভে বেদনার বৃদ্ধি কিন্তু অল্ল অল্ল হাঁটিতে থাকিলে উহার উপশম। প্রাতে অথবা উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থান কালে বেদনার বৃদ্ধি। আন্তে আন্তে নড়িলে বেদনার উপশম, কিন্তু অভিরিক্ত নড়িলে চড়িলে বা ক্লাস্থিতে উহার বৃদ্ধি।

নেট্র ম-কস।—ডাঃ স্পলার কতিপর ব্যক্তির আমবাতের প্রাদাহিক অবস্থার এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি ক্রত স্থফল প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ, অয়ৢ-লক্ষণের বিঅমানতা এবং ক্রফিউলাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগ ইহার প্রধান প্রয়োগস্থল। সন্ধির বেদনা সহকারে প্রভূত অয়গন্ধি ঘর্ম। কি তরুপ কি পুরাতন, সর্ব্ব প্রকারের রোগেই ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। কোষের (cell) অভ্যস্তরস্থ ইউরিক এসিডের উপর এই পদার্থের ক্রিয়া থাকা বিধায় ইহা প্রয়োগে উহার দোষ দ্রীভূত হয়। সন্ধির অতিশয় ক্ষাত্তা, স্তন্ধতা ও বিদরণ্যালতা।

ক্যাক্স-ফস। নাতিতে বা ঝড় বৃষ্টির দিনে বেদনার বৃদ্ধিতে ফিরম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে। শীতলভায় বা উফভায় এবং প্রত্যেক ঋতুর পরিবর্ত্তনে বেদনার উপচয়। সন্ধির বাতে রোগাক্রান্ত স্থানের শাতলভা ও অবশতা- মুভব। শাতলভা ও আর্ত্রভা হইতে উৎপন্ন গ্রীবার স্তন্ধভায় ফিরম-ক্স সহ পর্যায়ক্রমে দিবে। গ্রাবা-পৃষ্ঠে প্রবল বেদনা; রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি। কটিবাত (ফিরম-ফস)। হাঁটু বা উক্ সন্ধির শোপের স্থায় স্ফীতভা। ষথনই ঠাণ্ডা লাগে তথনই সন্ধিতে বেদনা জন্মে।

নেট্রম-সলক ।—গাউট রোগের (গ্রন্থি বা গেটেবাত) তরুণাবস্থায়
এই ঔষধ ফিরম-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা। পুরাতন গ্রন্থিবাতের ইহা
প্রধান ঔষধ। রোগার সর্বপ্রকার মন্ত পান নিষিদ্ধ। আমবাত সহকারে
পৈত্তিক লক্ষণের বিজ্ঞমানতা। আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি।

নেট্রম-মিউর।—সন্ধির বিদারণ সংযুক্ত পুরাতন আমবাত। জলীয় স্রাবের বিশ্বমানতা। আমবাতিক জরে কালী-মিউরের পর ব্যবহার্য্য।

ক্যাল্ফ-ক্লোর।—বাত জন্ম সন্ধির বিবৃদ্ধি (ক্ষীততা)। নেট্রম-সলফ সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

ক্যাল্ক-সলফ।—সন্ধিতে পূয সঞ্চয় (সিলিসিয়া)।

প্রসাপথ্য।—রোগের প্রারম্ভাবহায় জব থাকিলে সাগু, এরোরুট বা বালি উষ্ণ উষ্ণ দেওয়া ষাইতে পারে। রোগাক্রাম্ভ স্থানে ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে এজন্ম তুলা বা ফ্লানেল দিয়া বাধিয়া রাখা কর্তব্য। বেদনার অতিশয় তীব্রতা ও রোগীর পক্ষে উহা অসহ্য হইয়া থাকিলে শীঘ্র শাঘ্র বেদনা কমে এজন্ম আলার সেক দিবে। (আদ' ছেঁচিয়া একথানি নেকড়ায় আলগা করিয়া বাধিয়া আগুনে গরম করিয়া সেক দিতে হয়)। জর না থাকিলে এবং বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে রুটি বা অর পথ্য দেওয়া কর্তব্য। এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় কথনও রুয় দেওয়া কর্তব্য নহে।

Rachitis---রেকাইটিস, বালাস্থি বিকৃতি, অস্থির কোমলতা।

এই রোগে অন্থির কোমলতা ও নমনীয়তা জন্ম। অন্থিতে ফদ্ফেটঅব-লাইম প্রভৃতি পদার্থের স্বল্পতা নিবন্ধন এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন
হয়। এলুমেন ও ফদ্ফেট-অব লাইম একত্র মিলিত হইয়া অন্থি নির্মিত
হইয়া থাকে। ক্যাল্জ-ফদ বা ফদ্ফেট-অব লাইমের স্বল্পতা এই রোগের
মুখ্য কারণ। অস্থিতে যথন এলুমেনের আধিক্য ও ফদ্ফেট-অব লাইমের
স্বল্পতা ঘটে, তথনই অস্থির কোমলতা জন্ম। গণ্ডমালা বা ক্ষীণধাত্
শিশুদিগেরই প্রায়ই এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ক্যাক্ষ-ফস। ইহা এই রোগের সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। অধিকাংশ স্থানেই এই ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শার্ণ ও ছর্বল বালক, পাঙ্রা, মৃঘর্ণ মুখারুতি, বিমুক্ত ব্রহ্মরক্তা, দস্তোদগমে বিলম্ব ইত্যাদি। মেরুদণ্ডের বক্রতা, মাথার খলি পাতলা ও কোমল। ফসফেট অব লইমের অপ্রচুরতা নিবন্ধন মন্তকোত্তোলনে অসমর্থতা। রেকাইটিস গ্রন্থ বালক-বালিকাগণের অতিসার। যে সকল স্ত্রীলোক রেকাইটিস ধাতুর সন্তান প্রস্ব করে, তাহাদের গর্ভাবস্থায় ক্যান্ধ-ফস খাইতে দিলে এই দোষ বিদ্রিত হয়।

নেট্রম-ফস।—ভূক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাচিত না হওয়ার দরুণ রেকাইটিস দোষ জিনালে ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রথথ। অমলকণের বিভাষানতা।

সিলিশিরা।—মন্তকে প্রচুর ঘর্ম এবং অতিশয় হুর্গন্ধি মল বিশিষ্ট অতিসার থাকিলে এই রোগের প্রধান ঔষধ ক্যান্ধ-ফসের সহিত মাঝে মাঝে ব্যবহার করিলে উত্তম ফল দর্শে। কালী ফস।—শরীরের নার্ণতা বা ক্ষয়, অভিশয় তুর্গন্ধি মল বিশিষ্ট অভিসার। এই ঔষধ অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে মধ্যে মধ্যে দিতে হয়।

Scarlatina---কার্লেটিনা, আরক্ত জুর।

ইহ। সকাঙ্গে গাঢ় বজবর্ণ পাড়কা ও গল-কোবের প্রদাহ বিশিষ্ট এক প্রকার সম্ফোট জর। ইহাকে স্কার্লেট ফিভারও বলে

(চিকিৎসা)

ফির্ম ফস। — প্রথম বা আক্রমণাবস্থায় জ্ব. জত নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে।

কালী মিউর। – সাধারণ রোগে কেবল মাত্র এই ঔষধেই রোগাগোগ্য গুলো। প্রাদাহিক লক্ষণ বর্তুমান থাকিলে ফিরম-ফদের সহিত পর্য্যাযক্রমে।

কালী সলফ।—ইহা ব্যবহার করিলে পাড়কা বা গুটকাগুলি শাঘ্র শাঘ্র প্রকাশ পায় এবং উহা শুকাইয়া গেলে শাঘ্র শাঘ্র উহা শক্ষ বা আঁইস উঠিয়া যায়। হঠাৎ পাড়কাগুলি বশিয়া গেলে ইহা দারা উহার পুনঃ প্রকাশের সহায়তা হয়। উচ্চ-গাত্রোতাপ। শুক্ষ থস্থসে স্ক।

কালী ফস। --- গলার ভিতর পচনের লক্ষণ বুঝিতে পারিলে এবং অতিশয় তুর্বলতা ও অটেড্র প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইঠা ব্যবহার্য্য।

নেট্রা-মিউর —জলবং তরল পদার্থ বমন নিদালুতা বা তন্ত্রা, আক্রের উৎক্ষেপণ প্রভৃতি বিকারের লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা বাবহার্যা। ক্রিহ্বার লক্ষণ দ্রষ্টবা।

এই রোগের কুফলে স্ফোটক ব্রণশোথ প্রভৃতি জন্মিলে ভাহার চিকিৎসা সেই সেই রোগে দ্রপ্তব্য।

Sciatica — সায়েটিক :-- কটিবাত, গৃধ সী

(রিউনেটিজম্ দ্রুটব্র)

(চিকিৎসা)

কালী-ফস। প্রধান ওরধ। উরুর পশ্চাংদিয়া হাটু পর্যান্ত আকর্ষণবং বেদনা, আডস্টুতা, উরুব গতিশক্তিহানতা এবং অভিশয় অন্তিরতা ও সায়বিক দৌর্দ্ধলা থাকিলে এই ওর্ষধে অতিশয় উপকার দর্শে। কিছুক্ষণ আতে খান্তে নডিলে চনিলে বেদনার উপশ্ম।

ম্যাত্রিশিয়া ফস।—আঞ্চেপিক ও খননবং বেলনা থাকিলে উষ্ণ দলের সাহত প্রঃ পুনঃ গুলিয়া খাওয়াইলে বিশেষ ফল দলে। প্রধান ঔষপেব সাহত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা।

নেট্রা সলফ।—গাউট বোগের লক্ষণ বিভাষান থাকিলে এই ঔষধ কালী-ফদেব সহিত পর্যায়ক্রমে বাবহার্যা।

ক্যাল্য ফস :—এই রোগে অন্তর্বতী ঔষধ রূপে বাবছত হয়।
ম্যাগ্রেশিয়া-ফ্স বিফল ইইলে ব্যবহার করা কর্তব্য।

নেটুম-মি উর 1—-দক্ষিণ উরু-সঞ্জিতে আকর্ষণবং (tensive)
বেদনা; মনে হয় সাবেটিক-নার্ভ ছোট হইয়াছে, উহাতে থিঁচে ধরার স্থায়
বেদনা। পদের শর্ণতা ও ব্যথিততা। পুবাতন রোগ ও কুইনাইন
সেবনের পরবতী রোগ।

সিলি শৈয়া।—পুরাতন গুধ্রসী। সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি। উরু-সন্ধিতে বেদনা। হাঁটবার সময় পায়ের ডিমের হ্রস্বভাত্তভব (calves feel too short)

Self-abuse--দেলফ এবিউস, হস্তমৈথুন।

ক্যাল্ফ ফস।—ইহা হন্তমৈথুন জনিত সর্ব্যপ্রকার কুফল নিবারণের প্রধান ওষধ। শুক্রক্ষয়ের প্রধান ওষধ।

কালী ফস।—সায়ুর হর্বলতা জনিত স্নায়বিক লক্ষণে ক্যান্ধ-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নেট্রম ফস।—অভিরিক্ত শুক্রক্ষয় জন্ত পরিপাক যন্ত্রের হর্মণতা।
অজীর্ণ ও অম রোগাদি থাকিলে ইহা অবশু দিবে। শুক্রের অভিশয় ভারল্য,
কাপড়ে লাগিলে উহাতে দাগ লাগে না। অজ্ঞাতসারে রেভঃপ্রাব।

এই রোগে কোনও প্রকার উত্তেজক খান্ত, লঙ্কা, পেঁয়াজ, গরম মসল্লা ও মন্তাদি সেবন একেবারে দূষণীয়। হবিষ্যান্ন আহার ও ব্রহ্মচর্য্য পালন অতিশয় উপকারী। মাছ কাম বদ্ধিত করে, এজন্ত মাছ খাওয়া অতিশয় অপকারী।

Skin, Affections of the. স্থিন য়াফেক্সন্স অব্দি=চর্মরোগ।

(চিকিৎসা)

ফির ফস।—সর্ব প্রকার চর্মরোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর, বেদনা ও রক্ত সঞ্চয়ের জ্ব্য ইহা ব্যবহার্যা।

কালী মিউর।—চর্মরোগের দিতীয়াবস্থায়, ফিরম-ফসের পর। থেত, গাঢ় প্রাবদান অথবা আমাশয়ের (ইমাক) গোলযোগ সহকারে চর্মনরোগের প্রকাশ এবং জিহ্বায় শ্বেতবর্গ লেপ থাকিলে ইহা বাবহার্যা। উল্লিখিত লক্ষণ সংযুক্ত রণ বা কৃষ্কুড়ি। মৃত্র-যন্তের বিশৃদ্ধালা সংযুক্ত মুখমগুলের উদ্ভেদ (ইরপ্ সন)। বুদ্ধাঙ্গুলির সন্ধির বিবদ্ধন ও ক্ষীততা, সাইকোসিস, আঁচিল ইত্যাদি। লুপস্ (নাসিকা ও মুখমগুলের প্রসারণশীল রক্তবর্গ একপ্রকার পাড়কা) রোগেব ইহা প্রধান ঔষধ : চুলকুণি, শিশুদিগের শিরোদক্র। খারাপ গো-বাজে টিকা দেওয়ার দক্ষণ অথবা মৃত্র-যন্তের ক্রিয়ার বিশৃদ্ধালা নিবন্ধন চুলকুণিয় প্রকাশ। প্রবাক্ত সকল রোগেই এই ঔবধের লোশন স্থানিক প্রয়োগ উপকারী।

নেট্রম-মিউর।—কণ্ড হইতে জলবং, পীতবর্ণ ও জ্র্গন্ধি আব নিঃসরণ। উল্লিখিত প্রকারের আব বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ বা ফোন্ধা। অতিরিক্ত লবল খাওয়ার কুফলে হকে শব্ধ বিশিষ্ট ও জলবং আবনাল কণ্ডুর প্রকাশ। শিশুর সর্কাশরীরে ক্ষত ও উচা হইতে জলবং আব ক্ষরণ (আভ্যা-স্তারিক ও বাচ্য)। কাটাদির দংশন বা ছলভেদে ব্যথিত স্থানে যত শাদ্র সম্ভব এই ঔষধের লোশন লাগাইলে তৎক্ষণাৎ বেদনা বিদ্রিত হয়। কোন পীড়ার ভোগকালে দক্রর প্রকাশ ও উহা হইতে জলবং আব ক্ষরণ। নেট্রম-ফর্স।—যে কোন প্রকারের চর্মরোগে সরের ন্তায়, মধুর বর্ণ অথবা স্বর্ণের ন্তায় পীতবর্ণ মামড়ি অথবা আব নিঃস্থত হইলে এই ঔষধ উপকারী। চর্মরোগ সহকারে অম লক্ষণের বিভ্যমানতা। শিশুদিগের শিরোদক্র। কাটাদির দংশনের ন্তায় সর্বাঙ্গে তুর্দিমা কণ্ডুয়ন।

কালী-ফস। - অভিশয় হর্জমা ও হর্গন্ধ বিশিষ্ট একজিমা ব। কপুতে ইচ; সবিশেষ উপযোগা। অভিশয় হর্ষলতা ও স্নায়বীয়তা। ক্ষতের উপর বসার স্থায় মামড়ি পড়িলে এবং উহাতে অভিশয় হর্গন্ধ থাকিলে। আব লাগিলে অকের কপুথন ও ক্ষত। রোগাক্রান্ত হানের উত্তপ্ততা। রক্তাক্ত জলবং আব নিঃসরণ। অকের স্থড় স্থড়ি অমুভব সহ কপুয়ন। শতক্ষোটে কপুথনযুক্ত বেলনা।

ক্যান্ত ফস।—উদ্বেদ, বিশেষতঃ মুখমগুলের উদ্ভেদ হইতে আগুলালিক রক্তরাব। পীতাও বেতবর্ণের মামড়ি। একজিমা বা কণ্ডু সহ
রক্তহানতা। অতিশয় কণ্ডুলন বিশিষ্ট চন্মরোগে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা
কর্তবা। জতুর মেচেতা (treckles) প্রভৃতি এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত
হয়! বৃদ্ধদিগের হকের বিরক্তিকর কণ্ডুলন (কালা-ফ্স স্থা প্র্যায়ক্রমে)।
প্রচুর ও পুনঃ পুনঃ ঘর্ম-আব, বিশেষতঃ মুখমগুল হইতে। যৌবনোমুখ
বা ব্রক্তহান ব্যক্তিদিগের বয়োত্রণ।

ক্যাল্কসেল্ফা ।—চন্মরোগে গাড় পতিবর্ণ আব নিঃস্ত হইবে বা পীতবর্ণের মামড়ি পড়িলে কালা-মিউরের পর ব্যবহার্য। প্রদাহের পর পূযোৎপত্তি হইলে আব হ্রাস করিবার নিমিত্ত। ত্রণে পূষ জন্মিলে ও শিশু-দিগের মস্তক-ক্ষতে পীতবর্ণের মামড়ি পড়িলে।

ক্যাল্কন্টোর।—চম্ম বিদারণ ; হাত ফাঁটিলে সাবান দারা হস্ত উত্তম ব্রুপে পরিষার করিয়া ভেশিলিনের শহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিবে। কঠিন ও অসম প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষতে পূষোৎপত্তি। গুহাদার বিদারণ।

সিলিশিয়া।—ত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্রাবী ক্ষোটক। যে কোন প্রকারের চর্মরোগে পূয অথবা রক্ত মিশ্রিত পূয নিঃস্ত হইলে। প্রচুর, অথবা অতিশয় তুর্গন্ধ যুক্ত পাদ-ঘর্ম। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘর্ম রোধ হইলেও ইহা ব্যবহার্যা; শিশুদিগের শিবোঘর্মা।

নেট্রম-ফস।—পীতাভ জলবং আব বিশিষ্ট উদ্ভেদ (ইর:পশন)। পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে ক্ষতের উপর পীতাভ মামড়ি।

Sleep - लीश--विखा।

(कालो-कम जम्हेवा)

কালী-ফস।—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, উত্তেজন। ক.জকশ্মে বাস্ত সমস্ততা; শারীরিক ক্লান্তি অথবা স্নায়বিক কারণ জনিত নিদ্রাহীনতায় ইহা বিশেষ ফল্প্রদ।

ফিরম-ফস।—মন্তিষ্কের কৈশিকানাড়ীতে (copillary) অস্বাভা বিক রক্ত স্কায় জনিত নিদ্রাহীনতায় কালী-ফস সহ প্যায়ক্রমে।

নেট্রম মিউর।—অতিরিক্ত নিদ্রা, সব্বদাই নিদ্রা যাইবার অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি; নিদ্রিতাবস্থায় মুখ ১ইতে লালা নিঃসবণ, কোষ্ঠকাঠিক্ত। যথোপযুক্তকাল নিদ্রা গেলেও অপরিতৃপ্তি। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে ক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তি। সামান্ত জ্বরকালেও অতিশয় নিদ্রালুতা ও অতৈতন্ত্রকর নিদ্রা। নেট্রম-সলফ।—পৈত্তিক লক্ষণ সহকারে বা কামলা রোগের পূর্ব্বে অতিশয় নিদ্রালুতা। জিহ্বায় পাংশুটে বা কটাবর্ণের লেপ সহকারে নিদ্রালুতা। মুথে তিক্তস্বাদ।

Small Pox — স্থলপক্স-বসন্ত।

বসস্ত অতিশয় সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ। ইহা সাধারণতঃ হুই প্রকার। যথা সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট। গুটগুলি পর সর গায় গায় লাগিয়া থাকিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট ও পৃথক পৃথক থাকিলে তাহাকে বিশ্লিষ্ট বলে। এই রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করিবার ১২ দিন পর জর হয়। বসস্তের জরে শাত, দাহ, মাগাধরা শেতবর্ণের লেপ বিশিষ্ট জিহ্বা, বমন, সর্বশরীরে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও কোমরে অতান্ত বেদনা জন্মে। জর হইবার দিতায় বা তৃতায় দিনে গুটিকা প্রকাশ পায়। প্রকৃত বসন্তের শুটাকা প্রথমে চাত বা পায়ের তলায় প্রকাশ পায়, জলবসম্ভেত গুটিকা প্রথমে মুখমগুলে প্রকাশ পায়। গুটগুলি স্পষ্ট প্রকাশ না পাইলেও হাত বা পায়ের ভলায় মণক দংশনের চিহ্নের স্থায় লাল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। একটু জল দিয়া হাত বা পারের তলা ধুইয়া ফেলিলেই এই চিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখা যায়। গুটি প্রাঞ্চ পাইবার ৫।৬ দিন মধ্যেই উহাতে জল সঞ্চয় হয়। গুটিতে জলসঞ্চয় হইলেই উহার অগ্রভাগ অবনত অর্থাৎ নাভার ভায় কিছু নিম হইয়া পড়ে। শুটি গুলির এই নাভাবৎ আকৃতি বসস্তের গুটিকার একটা বিশেষ পরিধায়ক ৬ষ্ঠ ২ইতে ৮ম দিবসের মধ্যে গুটির ভিতরে পূয জন্মে। এইক্ষণ রোগীর গাত্র হইতে একপ্রকার বিশেষ হুর্গন্ধ বাহির হয়। সাধারণতঃ ১০ম দিবসেই গুটগুলি শুকাইতে আরম্ভ করে ও উহার উপর একপ্রকার মামড়ি

পড়ে। একবিংশন্তি (২১) দিবসের মধ্যেই এই মামড়ি পড়িয়া যায়। রোগ উৎকট আকারের হইলে শুকাইবার কালেই অনেক রোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়। বাইওকেমিক চিকিৎসায় এই রোগে অতি আশ্চর্য্য ফল দর্শে। ১০৷১১ দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া কাজ কর্ম করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, অভিজ্ঞতায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। কালী-মিউর ৩× এই রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক। বসস্তের প্রাত্ত্রাবকালে প্রত্যহ এই ঔষধ সেবন করিলে রোগের আক্রমণের ভয় দ্র হয়। ৪০ বংসরের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, য়াহারা এই ঔষধ প্রতিষেধকরূপে সেবন করিয়াছে তাহারা কেইই এই রোগে আক্রান্ত হন নাই।

(চিকিৎসা)

ফির্ম-ফস।—বসন্তের প্রথমাবস্থায় জ্বর, উচ্চ গাত্রোত্তাপ, দ্রুত নাড়া প্রভৃতি লক্ষণে প্রধান ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

কালী-মিউর।—ইহা এই বোগের প্রধান ঔবধ। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় ফির ফদের সহিত ঘন ঘন পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিলে রোগের তীব্রতা কমিয়া যায় এবং ইহা ব্যবহার করিবার পর আর নৃতন গুটী বাহির হয় না। কথন কথন দেখা গিয়াছে যে, সামান্ত কিছু গুটী বাহির হইবার পর ইহা (ফির-ফস ও কালা-মিউর) ব্যবহার করায় গুটীগুলি অদুগু হইয়া গিয়াছে এবং কোন কু-ফল দর্শে নাই।

কালী-ক্ষস।—রক্তের বিগলিত অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার্য।
গুটিকাগুলি পচিলে, সংজ্ঞাহীনতা ও অতিশয় দৌর্বলা বা অবসাদ পরিলক্ষিত হইলে ইহা ব্যবহারে স্থল্য ফল পাওয়া যায়।

কালী সাল ।—ইহা পুরাতন ত্বক উঠাইয়া পূতন ত্বকোৎপাদনে সাহায্য করে; স্থতরাং গুটিগুলি শুকাইবার সময় ইহা ব্যবহার্যা। নেট্রম-মিউর। — মৃহ প্রকৃতির রোগ। নিদ্রালৃতা, অচৈতন্ত ও প্রচুর লালাস্রাবাদি থাকিলে। ঘন সন্নিবিষ্ট গুটিকা। এই প্রকার রোগ অতিশয় মারাত্মক। ইহাতে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চমৎকার ফল পাওয়া গিয়াছে।

ক্যাল্ক সলফ।—গুটিকা পাকিলে ও উহা হইতে পৃষ্প্রাব হইতে থাকিলে ইহা ব্যবহার্যা। এই সময় কালী-সলফের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা।

পথ নাম পথ

রোগের ভোগকালে বার্লি এরারুট বা সাপ্তর পাতলা মণ্ড, মুগ মটর মহরীর যুব ও ঘোল : দ্রাক্ষা দাড়িমাদি ফল এবং পানার্থে নিতল জল বা ডাবের জল দিবে। অনস্তর ক্রমে ক্রমে ছগ্ন মাংসাদি পৃষ্টিকর পথা বাবস্থা করিবে। উপসর্গবিহীন রোগে আমরা গুটা বাহির হইখার পর হইতেই কাঁচা মুগের ডাইল সহ প্রাত্তন অন পথা দিয়া থাকি। বসস্তেব রোগাঁকে প্রত্যুহ ক'চা হলুদের রস এবং হেলেঞ্চা (হিঞ্চে) ও কবলা সিদ্ধা খাইতে দিবে ভাতের সহিত্য মাখনভ দিবে। বসস্তের গুটা কখনও গালিবেনা। গুটাগুলি শুদ্ধ হইলে খোসা পড়িয়া গিয়া সত্তর আরোগ্য ঘটে। এই সময় গাঢ় তিল তৈল মাখা যাইতে পারে। গুটা শুকাইয়া খোসা পড়িয়া গেলে, গায় নিমহলুদ মাথিয়া স্নান করিবে।

Sore throat সোর-প্রোট — গলক্ষত।

(ডিপথিরিয়া কুপ প্রভৃতি দ্রস্টব্য)

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—গলার যে কোন প্রকারের প্রদাহেই এই ঔষধ ঘন ঘন ব্যবহার্যা। ইহাব কুলিও অভিশয় ফলপ্রদ। গলক্ষত সহকারে উচ্চ গাত্রোত্তাপ ও অভিশয় বেদনা। খর-যন্ত্রের তরুণ প্রদাহ। গায়ক ও বক্তাদিগের গলক্ষত।

কালা-মিউর।—প্রদাহের দিতীয়াবস্থায় গ্রন্থি বা টান্সিলের স্ফীততা জন্মিলে। ডিপথিরিয়া। এই ঔষধ গরম জলে মিশ্রিত করিয়া কুলি ক'রবে।

কালী-ফ্স।--গলক্ষতের নালীক্ষতে পরিণতি।

ক্যাল্য-ফ্স।—সর্বদা কাসিয়া স্বর-যন্ত্র পরিষ্কার কবিতে হয়, কাসিতে কাসিতে আগুলালিক শ্লেমা নিষ্ঠীবিত হয়।

ক্যাল্প-স্কোর।—সরহন্বে তুড়-ত্ডি। শুইয়া থাকিলে গলকপুয়ন সংযুক্ত কাসিব উদ্রেক।

নেট্রন-মিউর।—সফ, ফেণিল শ্লেমা দাবা টন্সিলের আবৃততা সহ কণ্ঠ-প্রদাহ। গল-প্রদাহ সহ জলীয় লক্ষণের বিভয়ানতা।

ম্যাতগ্রশিয়া ফস।—কঠের আক্ষেপ ও তংসগ গিলিবার কালে খাসরোধান্তব।

নেট্রম ফস।—কণ্ঠ-প্রদাহ সহকারে জিহ্বায় সরের বা স্বর্ণের ন্তায় পীতবর্ণের লেপ। প্রাতে গলায় ক্ষতবৎ অমুভব। ক্যাল্প-সলক।—গণ ক্ষতের ও টন্সিলাইটিসের শেষাবস্থায় গাঢ় পীতবর্ণ কথন কথন বা রক্তমিশ্রিত পূয নিঃস্ত হইলে ইহা উপযোগা।

নেট্রম সলফ। —গলক্ষত সহকারে গিলিবার বা ঢোক গিলিবার কালে গলায় গোলার ভায় কোনও পদার্থের বিভ্যমানতানুভব।

Spasms, Convulsions, etc. স্প্যাজম্স, কনভঃলসন্—আক্ষেপ খেঁচুনি ইত্যাদি।

(চিকিৎসা)

ম্যান্থেশিরা ফস।—শরীরের যে কোন স্থানের এবং যে কোন প্রকারের আক্ষেপেই হউক না কেন এই ঔষধ অভিশয় উপকারী। আক্ষেপ, থল্লী, (হাত পা ইত্যাদি স্থানে খাল বা টাস ধরা) প্রভৃতিতে গরম জলের সহিত গুলিয়া ঘন ঘন খাইতে দিলে অতি সত্তর ফল দর্শে।

ক) ব্রিক্স ফস।—আক্ষেপ ও মূর্চ্ছার ম্যাগ্রেশিয়া-ফসের পর ব্যবহার্য।
শিশুদিগের দন্তোদগমকালীন আক্ষেপে ব্যবহার কবিলে আক্ষেপের
পুনরুপস্থিতি স্থগিত হয়। রক্তহান, পাশুবর্ণ ব্যক্তিদিগের আক্ষেপে
বিশেষ ফলপ্রদ।

কালী ফদ।—ভয়জনিত আক্ষেপ, মূর্চ্চায় মুখের পাণ্ডুরতা থাকিলে। কালী মিউর।—ইচা মৃগীরোগের প্রায় অমোঘ ঔষধ। ইহা ব্যবহার করিলে পুনরাক্রমণ প্রতিক্রত্ব হয়। আক্ষেপের সময় ম্যাগ্রেশিয়া ফস দিবে। ফিরম ফস 1—শিশুদিগের দস্তোদগমকালীন আক্ষেপে জ্বর থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

Spermatorrhea — স্পার্যাটোরিয়া শুক্রমেহ, অনৈচ্ছিক রেতপ্রাব।

নিদ্রাকালে বা অন্থান্ত অবস্থান্ন অনিচ্ছান্ন গুক্রপ্রাবকে গুক্রমেই বলে। প্রাকৃতিক নিম্নন লজ্মন পূর্বাক হস্তমৈথুনাদি কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিমপরিভৃপ্তি এই রোগের প্রধান কারণ।

চিকিৎসা

নেট্রম ফস।—অম লক্ষণ সহকারে শুক্রপ্রাব। অভিশয় পাতলা, জলবং ও পঢ়া গন্ধ বিশিষ্ট শুক্রপাত। শুক্রপ্রাবের পর অভিশয় তুর্বলভা ও কম্পন।

কালী ফস। —ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা বা জননেন্দ্রিয়ের অপর কোনও প্রকারের বিশৃঙ্খলা হইতে উৎপন্ন স্নায়বিক লক্ষণে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ।

ক্যাত্ম ফস।—গুক্রপ্রাব ও ওজ্জন্ত সর্বান্ধীন হর্বলতা। ইহা ব্যবহার করিলে জননেন্ত্রিয়ের হর্বলতা দ্রীভূত হইয়া সভেজতা প্রাপ্ত হয়। যুবকদিগের হস্তমৈথুনের প্রবৃত্তি।

এই রোগে বিশুদ্ধ বায়তে প্রাতে ও সায়াহে ভ্রমণ, কঠিন শ্যায় শ্য়ন ও সহু হইলে ত্রিসন্ধ্যা স্থান অতিশয় উপকারী। সর্বপ্রেকার উত্তেজক খাছ্য বর্জনীয়; চিৎ হইয়া শুইবে না।

Sunstroke — সন্ফোক — অর্কাঘাত; সদ্দিগন্মি।

চিকিৎসা

নেট্রম মিউর ।—ইহ। এই রোগের প্রধান ওষণ। মন্তিক্ষের লক্ষণ বর্তুমান থাকিলে কালা-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা।

Syphilis — সিফিলিস, উপদংশ, গশ্মি

উপদংশ সংক্রামক রোগ। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সঙ্গমে ইহা উৎপন্ন হয়। কথন কথন বা উপদংশালান্ত ব্যক্তিদিগের বন্ধ, তকা ও পানপারাদি ব্যবহারেও এই রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ম্পেশ সংক্রমণই এই রোগের উত্তেজক কারণ রূপে দেখা বায়। কিন্তু অতি প্রথম এই রোগ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? এই বোগের প্রথমোৎপত্তি সম্বন্ধে জানিতে হইলে বুঝিতে হইবে অধিক পুক্ষ কোনও একটি রমণীতে উপগত হওয়ার নানাপ্রকার বীর্মান্থারা তাহার জননাঙ্গে অথবা কোন পুরুষ বহু রমণাতে উপগত হওয়ার তাহার পুরুষাঙ্গে একপ্রকার উত্তেজনা (ইরিটেশন) বশত্তই তথার প্রদাহ (Inflamation) ও ক্ষত হইয়া অতি প্রথমে এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রদাহ বশতঃ শারীরিক রক্তে কোনও ইন্-অর্গানিক পদার্থের অভাব বশতঃই এই রোগের প্রথম উৎপত্তি হইয়া থাকে!

বাইওকেমিক পাাথলজি মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সংসর্গই এই রোগের মুখ্য কারণ এবং ভাহার ফলে শাবীরিক রক্তে কালী-মিউরের অভাব এই রোগের গৌণ কারণ। এই কালী-মিউরের অভাব শীঘ্র পরিপূরিত না হইলে, তাহার অভাব বশতঃ শাঘ্রই আবার অক্যান্ত ইন-অর্গানিক পদার্থের অভাব ঘটিয়া বহুপ্রকারের লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন শরীরে যে দ্রব্যের অভাব হয়, লক্ষণ দৃষ্টে তথন সেই অভাব পূরণ করিয়া দিলেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। শারীরিক রক্তে কোন দৃষিত পদার্থের বিভ্যমানতাকে উপদংশ বলে না। রক্তে কোনও বস্তু বিশেষের অভাবই উপদংশনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

বাইওকেমিক মতে ঠিক প্রতিশ্যায়ের (সদি) স্থায় এই রোগের চিকিৎসা হইয় থাকে। স্থায়ার ও শ্বেত্রবর্ণের আম্রাবে কালী-মিউর; বাঘি সহকারে উত্তাপ, দপ্দপ্কর বেদনা, অভিশয় স্পশাসহতা থাকিলে ফিরম-ফস ৬× ক্রম; ফ্যাজিডেনিক গ্রায়ারে কালী-ফস, পৃষ্মাব হইতে থাকিলে কাল্লে সলফ, কঠিন ও অসম-প্রান্ত শ্রায়ারে ক্যাল্ল-ফ্রোর এবং পুবাতন রোগে কালা-সলফ, নেট্রম-সলফ, নেট্রম-মিউর ও সিলিশিয়ার প্রয়োজন।

পূদ্যোক্ত লাবণিক পদার্থ সকলের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ উপ-কারী। সাধারণ রোগে ৩× ক্রমের কালা-মিউরেব লোশন বিশেষ উপকাবী। এই লোশন দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্ষত ধুইয়া পরিষ্কার রাখা একান্ত কত্রা।

(বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চিকিৎসা)

ফির্ম-ফস।—বাঘীতে উত্তাপ, স্পশাসহাতা, দপদপ কর বেদনা ও জর লক্ষণ থাকিলে।

কালী-মিউর।—বাঘীর অতিশয় ক্ষীত্তা; কোমল বাঘি, পুরাতন উপদংশ। ই<u>হা এই বোগেব প্রধান ঔষব।</u> আভান্তরিক ও বাহা-প্রয়োগ উপকারা। নেট্রম সলক ।—উপদংশ হইতে উৎপন্ন গুহাদারের আঁচিল। আভান্তরিক ও বাহ্য ব্যবহার্য্য।

নেটুম-মিউর।—প্রাতন উপদংশ, ক্ষত হইলে জলবং রস করণ।
কালী-ফস।—ফেজিডেনিক শ্রাঙ্কারে অর্থাৎ যে সকল উপদংশে
কত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিত হয় তাহাতে, বিশেষতঃ ক্ষতে অতিশয় হুর্গন্ধ থাকিলে
ইহা অতিশয় উপকারী।

কাল।-সলফ।—ক্ষত হইতে পীতাভ সবুজ বর্ণের প্রাব নি:স্ত হইলে ও বৈকালে জর হইলে।

ক্যাল্ফ-সলফ। — কতে পূব জন্মিলে কত শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইবার জ্ঞা বাঘীতে পূয জন্মিলে (সিলিশিয়ার সহিত পর্যায়ক্রমে)।

সিলিশিয়া।—বাঘীতে পূষ জন্মিলে; পুরাতন উপদংশজ ক্ষতে পুযোৎপত্তি বা উহার কঠিনতা। অতিরিক্ত পারদ ব্যবহারের ফলে ত্বকে ক্ষত জন্মিলে। অস্থিতে নোডস অর্থাৎ অর্ধ্বুদ উৎপন্ন হইলে।

ক্যান্ত-ফ্রোর।—ইহা হার্ডগ্রাঙ্কারের প্রধান প্রথ। ক্ষতের প্রোপ্তের অসমতা ও কঠিনতা। বাঘীর অভিশয় কঠিনতা।

এই রোগের চিকিৎসা কালে মংশু ও মাংস বর্জন করিবে। জ্বর থাকিলে সাগু, বালি প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে।

Testicles, Diseases of— অওকোষের পীড়া।

(কুরগু দ্রফীবা)

ফিরম-ফস।—অণ্ডের যাবতীয় পীড়ায়ই প্রদাহ, বেদনা ইত্যাদি থাকিলে ইহা স্থপ্রযোজ্য।

কালী-মিউর।—<u>অত-প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় ক্ষীততা থাকিলে</u> ইহা বাবস্থেয়: প্রমেহ-আবের বিলোপ জনিত অত্তের পীড়া।

ক্যাক্স-ফস।—শুও প্রদাহ; কুরও (নেট্রম মিউরের পর)। অন্তবৃদ্ধি (ক্যাল্ক-শ্রোর সহ পর্য্যায়ক্রমে)।

ক্যাক্স-স্থোর: অপ্তকোষের শোথ (ক্যাল্ক ফস)। অন্তবৃদ্ধি। কুরও।

নেট্রা-মিউর।—অণ্ডের শোথ বা উহাতে জল সঞ্চয়; অণ্ডকোষ ও রেতঃরজ্জুর আতশয় স্পর্শান্থভণত।; অণ্ডে অবিরাম মৃহ বেদনা; অণ্ড-কোষে হন্দম্য কণ্ডুন। মণিপুরের (নাভীর নিয়বতী রোমার্ভ স্থান) রোম পতন।

Tongue and Taste—জিহ্বা ও আস্বাদন।

(প্রধান প্রধান লক্ষণ)

কালী-মিউর ।—জিহ্বার শুঙ্কতা এবং উহাতে খেত বা পাংশুটে খেত বর্ণের লেপ, জিহ্বায় পুরু খেতবর্ণের লেপ; জিহ্বার প্রদাহ ও স্ফীততা।

ফিরম-ফস। — মলিন লোহিতবর্ণ সহকারে জিহ্বার প্রদাহ ও ফাততা (কালী মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্যা); (জিহ্বার আরক্ততা শবীরের কোনও অংশের পূদাহ জ্ঞাপক)।

কালী-ক্ষস।—ি ভ্রায় বাসি সরিষা বাটার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ময়লার লেপ; জিহ্বার অভিশয় শুক্ষতা, (বিশেষতঃ প্রাতঃকালে) এবং মৃথের অভিশয় বিস্বাদ ও খাসে অভিশয় তুর্গন্ধ। মৃত্ প্রকৃতির ব্যাপক জব কালে জিহ্বার অভিশয় শুক্ষতা ও প্রদাহ।

নেট্র-মিউর।—পরিষার আঠা আঠা বা জলবং শ্লেমা দারা অংবৃত জিহবা। জিহবার প্রান্তভাগে ফেণিল শ্লেমার ক্ষুদ্র কুদু বৃদ্দ। পরিষার আর্দ্র জিহবা; প্রভূত লাণাম্রাব।

কালী-সলফ।—পাতবর্ণ, আঠা আঠা শ্লেমা দারা আবৃত জিহ্বা; কখন কখন জিহ্বার প্রাস্তভাগ শেত বর্ণ ময়লাবৃত; মুথের বিস্বাদ।

নেট্রম-ফস।—ছিল্লার মূল দেশে এবং টন্সিলে সরের স্থায় বা সর্ণের স্থায় পীতবর্ণ, আর্দ্র ময়লার লেপ; কথন কথন মূথের অমু স্থাদ।

নেট্রম-সলক।—জিহ্বায় অপরিষ্কার কটাশে সবুজ বা পাংশুটে-সবুজবর্ণের লেপ; জিহ্বা আঠ। আঠা; মুথে প্রচুর গাঢ়, আঠা আঠা শ্লেমা; পিত্তপ্রাবের বিশৃঙ্গলাস্চক মুথের তিক্ত সাদ। ক্যাল্ফ-ফস।—পুরু, আড়ষ্ট ও অবশ জিহবা (কাণী-মিউর)।
ক্যাল্ফ-স্ফোর।—প্রদাহের পর জিহবার কঠিনতা (দিলিশিয়া)
বেদনা বা বেদনাহীনতা সহকারে জিহবার অবদরণ।

का क्या - अनारश्य भन्ने किञ्चात्र शृय मक्षत्र ।

ম্যাত্রেশিয়া ফস। — শীতবর্ণ, আঠা আঠা শেপারত জিহ্বা, বিশেষতঃ উদর বেদনা অথবা আমাশয়ে (ষ্টমাক) গুরুভার বোধ সহকারে। মন্তব্য।

সাধারণতঃ জিহ্বার ময়লার বর্ণ দৃষ্টেই ঔষধ নির্বাচন করিতে হয়; কিন্তু আমাশয়ের (ইমাক) পুরাতন প্রতিশ্রায় কালে (ক্যাটার) কোনও নৃত্ন রোগ উপস্থিত হইলে, জিহ্বার এই লেপ দৃষ্টে, উক্ত তরুণ রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত নহে।

Tonsilitis — টব্সিলাইটিস — তালুমূল-প্রদাহ।

(ডিফথিরিয়া দ্রস্টবা)

তালুর উভশ্ব পার্শ্বে বাদামের ন্যায় যে গ্রন্থি আছে তাহার বেদনা সংযুক্ত ক্ষীততাকে টন্সিলাইটিস্ বলে। ভাল চিকিৎসা না হইলে প্রদাহিত টন্সিলে পূষ জিনায়া থাকে। থাকিয়া থাকিয়া নাত করিলে এবং দপ্দপ্কর ও কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত বেদনা জিনালে টন্সিলে পূষ জিনায়াছে বলিয়া জানিবে।

(চিকিৎসা)

ক্ষিরম-ফ্স।—প্রদাহে জর ও বেদনা থাকিলে প্রারম্ভাবস্থায় এই ঔষধ ঘন ঘন ব্যবহার করা কর্ত্ব্য। উষ্ণ জলের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া উহার কুলি করাও বিশেষ উপকারী। কালী-মিউর ।—টনিলের ফাততা থাকিলে ফিরম-ফদের পর বাবহার্যা। টনিলের উপর খেত বা পাংশুটে বর্ণের দাগ। তরুণ বা প্রাতন তালুম্ল-প্রদাহ। জিহ্বায় খেত ময়লার লেপ।

ক্যান্ধ সলফ। — টিনিলে পূব জিনালে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ক্যান্ধ-ফস।—টন্সিলের পুরাতন স্ফীততা সহকাবে কথন কথন ঢোকগিলিতে অতিশয় কষ্ট। বাবস্থেয় অপর কোনও ঔষধের সহিত পর্য্যায়-ক্রমে বাবহার্য্য

নেট্রম-ফস।—টন্সিনের প্রভেগ্রার (ক্যাটার) সহকারে জিহ্বার মূলদেশে স্বর্ণের গ্রায় পীতবর্ণের লেপ।

নেট্রম-মিউর।—আলজিহ্বার প্রদাহ সহকারে এই ঔষধের বিশিষ্ট লেপাবৃত জিহবা ও জলীয় স্রাবের বিভ্যমানতা থাকিলে।

Toothacke — টুথেক, দন্তশূল।

(দন্তোদগম দ্রস্ফব্য)

মার ক্রেনিরা ফুস।—দন্তশূল সহকারে খননবং বেদনা, উষ্ণ তরল পদার্থ মুখে করিলে বেদনার উপশম, শীতল পদার্থে বৃদ্ধি। অতিশয় অসহা বেদনা, স্নায়ু-পথে বেদনার গতি। প্রচাপনে অর্থাৎ চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম, শীতল বাতাসে বৃদ্ধি।

ফিরম-ক্ষস।—মাড়ির অথবা স্নায়ুর প্রদাহ জন্ম দন্তশূল। শীতল তরলু পদার্থে অথবা ঠাণ্ডা বিমৃক্ত বায়ুতে বেদনার উপশম, উত্তাপে বৃদ্ধি। মাড়ির প্রদাহ, আরক্ততা ও ক্ষতবৎ বেদনা। কালী-মিউর ।—মাড়ির অথব। গালের স্ফীততা সহকারে দত্তশূল থাকিলে স্ফাততা হ্রাস করাইবার জন্ম (ফির্ম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে)।

কালী-ফস।—স্নায়বার পাণ্ডুর ও মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত রোগীর দন্তশূল। প্রকুল্লকর ঘটনায় বেদনার উপশ্য। দন্তশূল সহকারে সহজেই মাড়ি হইতে রক্ত পাত অথবা মাড়িতে উজ্জ্বল লোহিত রেখা পরিদৃষ্ট হইলে।

ক্যান্দ্র-ফ্স। ক্রপ্রপ্র দতে দত্পূল : এত্র শত্র দতের প্রাপ্তি, দত্তে দেশে ক্রপ্ত রাজিতে দত্বেদনার বিদ্ধা

কালী-সলফ। – সন্ধ্যাকালে বা ভিষ্ণাহে দন্তবেদনার বৃদ্ধি; শাতন, বিমৃক্ত বায়ুতে উপশ্ম।

নেট্রম-মিউর।— দওশুল স্ক্রারে অনৈচ্ছিক অশ্রপাত বা প্রচুর লালাস্রাব।

ক্যাল্ক ফ্রোর।—দন্তের শিথিলত। সহকারে দন্ত বেদনা। <u>আহার্য্য</u> দ্রব্যের সংস্পর্যে দন্তে অতিশয় বেদনা জন্মে।

সিলি শিস্ত্রা—মাড়িতে ক্ষোটক জন্মিবার কালে অভিশয় দন্তশূল। আতশয় গভার স্থানের বেদনা, দাঁত ধরিয়া টানিলে বেদনার কতকটা উপশম। রাত্রিতে বেদনার অভিশয় বৃদ্ধি। উষ্ণতা বা ঠাণ্ডা কিছুতেই বেদনার শাস্তি জন্মেনা।

ক্যাল্স-সল্ফ।—মাড়ি ইইতে পৃষ্ঞাব ও বেদনা নিবারণে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

Tumors and Cancer—টিউমার এণ্ড ক্যান্সার—অর্দ ও দূষিত অর্দ।

(চিকিৎসা)

কালী-সলফ।—উপত্কের (এপিথিলিয়াল) অর্ক্চ। ত্বকের অর্ক্দেকত হইতে এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক পাতলা পীতবর্ণ পৃষ্প্রাব। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহার্য।

ক্যাল্ক ফ্লোর ।—স্তনের শক্ত, গ্রন্থিল অক্ষৃদ। বে কোন স্থানের কঠিন স্ফীততা।

কালী-ফস।—অর্ক্ দ হইতে হুর্গন্ধি ও বিবর্ণ প্রাব নি:সরণ। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বেদনার অভিশয় শাস্তি জন্মে।

ন্যাট্রম-মিউর।—জিহ্বার নিমে কোমল, জলপূর্ণ স্ফীতভা।(রেণুলা)

ফির্ম-ফস।—অর্কুদের বেদনায় অপর কোনও ব্যবস্থেয় ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

ক্যাল্ক-ক্স।—গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের অর্ক্ দ। গলগণ্ড (ব্যাগ)।

সিলিশিয়া।—গ্রন্থির ক্ষীতভাগ পৃষজন্মবার সন্তাবনা হইলে। জরারুর অর্ক্দ।

নেট্রম ফস।—"জিহ্বার অর্কাদে এই ওষধে অতিশয় ফল দর্শে।" (ডা: ওয়াকার)।

[ক্যানসার দ্রপ্টব্য]

Ulcers and Ulcerations—অঃলসাস এণ্ড অঃলসারেসন্স — ক্ষত ও পৃযস্রাবী ক্ষত

(এবসেস ও একজুডেশন দ্রম্ভব্য)

কালী মিউর।—ক্ষত হইতে গাঢ় খেতবর্ণ ও তন্তমন্ন প্রায়র জীবা হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের স্রাব ক্ষরণ। স্রাবের অমুপদাহিতা। খেত বা পাংশুটে খেত লেপাবৃত জিহ্বা।

ফিরম-ফস।—ক্ষত সহকারে হর, প্রদাহ ও বেদনা থাকিলে।

সিলিশিয়া।—হস্ত-পদের গভীর-মূল ক্ষতে অন্থিবেষ্ট আক্রান্ত হইলে। ক্ষত হইতে পাতলা, পীতবর্ণ হুর্গন্ধ পূযস্রাব। নালীক্ষত; গ্রন্থির কঠিন স্ফীততা ও উহাতে পূয সঞ্চয় হইলে অধিক মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগও কর্ত্তন্য।

ক্যাল্ক-সলফ।—কত ওকাইয়া গেলেও উহা হইলে আব করণ। সিলিশিয়ার পর ব্যবহার্যা। গ্রন্থির বা হস্ত পদের ক্ষত হইতে পীতবর্ণ পূযাক্ত আব নি:সরণ। কাঁটা ঘা, পোড়া ঘা প্রভৃতি হইতে পূযস্রাব।

ক্যাল্ক-ফ্রোর ।—অন্থর ক্ষত; গাঢ় পীতবর্ণ ও অন্থর খণ্ড সংযুক্ত স্থাব নি:সরণ।

ক্যাল্ক-ফ্স।—ক্ষতে বিশেষতঃ অস্থির ক্ষতে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিবে।

নেট্রম-ফ্রন।—পাকস্থলী (ষ্টমাক) বা অন্ত্রের ক্ষত সহকারে অন্ত্র জলীয় পদার্থ বা কফিচ্পের জ্ঞায় মলিন পদার্থ বমন। উপদংশজ ক্ষত, জিহ্বায় সরের ক্যায় পীত বর্ণের লেপ।

Urinary disorders — মূত্রযত্রের রোগ।

(বৃক্কক রোগ দ্রফব্য)

(চিকিৎসা)

ফিরম কস — ম্রাশর ব্রডার। ৬ ম্র-মার্গের সক্প্রকার প্রাণাচিত লক্ষণেই এই ঔষধ বাবহার্য। শিশুদিগের রাত্রিকালান বিছানায় মত্র নাগে। পেশার তুর্বল্ভা বশ্ভঃ অবারিত মূর্ভাগে, বিশেষ্ডঃ স্ব'লোক-দিগের কালে মৃত্র নিঃসরণ; প্রদাহ বশ্ভঃ মত্র রোধ। অধিকক্ষণ মৃত্রেগ বারণের কলে সর্বদা মৃত্র প্রতি; প্রচুর মূত্রাব।

কালী মিউর। — মূতাশয় প্রদাহের দিতীয়াবস্তায় স্ফীততা থাকিলে পুরাতন মতাশয় প্রদাহের প্রধান ঔষধ। মূত্রের সহিত গাড় শ্বেতবর্ণ শ্লেয়া নিঃসংগ। মলিনবর্ণ মূত্রতাগি মূত্রের সহিত ইউরিক এসিড নিস্ত হয়।
য়কুতের ক্রিয়ার স্তর্ধতা।

ম্যাত্রেশিয়া-ফস। — পেশার আক্ষেপ বশতঃ মৃত্ররেষ। শলাকা বা ক্যাথিটার প্রয়োগের পর এরপ অন্তভব যেন পেশা আর সঙ্কৃচিত হয় না। মত্রশিলা অর্থাং পাথরা রোগে অভিশয় বেদনা থাকিলে হহা অভিশয়

कल श्रम ।

কালী ফস।—মূত্রাশয়-প্রদাহে অতিশয় দৌর্কাল্য থাকিলে।
স্নায়বিক দৌর্কাল্য বা পক্ষাঘাতবশতঃ প্রচুর মূত্রপ্রাব; পুনঃ পুনঃ মূত্র
প্রবৃত্তি। মূত্রবেগ ধারণে অসমর্থতা, মূত্র যে স্থানে লাগে সে স্থান হাঁজিয়া
যায়। মৃত্রমার্গ হইতে রক্তন্রাব। পেশীর হর্কাল্ডা বশতঃ শ্যায় মূত্রত্যার।

নেট, ম-সলফ । – মূত্রে ইপ্টক চূর্ণের ভার তলানি। যে পারে মূত্রভাগে করা যায় ভাহার পার্শ্বে ও তল-দেশে লিথিক এসিডের তলানি পরিদৃষ্ট হয়। বাত বা শৈত্তিক লক্ষণ সহকারে প্রগাঢ় বর্ণ মূত্রভাগে।

ক্যাল্ক ফস।—মূত্রাশারী বা ফক্ষেটিক অধ্যক্ষেপ (তলানি)
বিশিষ্ট মূত্র। নেউম সলফেব সভিত পর্যাহক্রমে বা তৎপর ব্যবহার করিলে
পাগরাব প্রকংপাত্র নিবারিত হয়। মূত্রে ফ্রবং অধ্যক্ষেপ, মূত্রের সহিত
ভক্রথাব (নেউম সলফভ ব্যবহৃত হয়। বুদ্ধিগের অবাত্রত মূত্র্রাব।

ক্যাল ক সলফ। — মূত্রাশর প্রদাহে পূয নিঃস্ত হইলে।

নেট, ম ফস। — শিশুদিগের অবারিত মূত্রত্যাগ বিশেষতঃ অম বা কুমির লক্ষণ বিভামান থাকিলে। বৃক্কে (কিড্নি) অশারীর উৎপত্তি। আমবাত সহকারে মলিন লোহিত রক্তপ্রাব।

েন্ট্রম-মিউর।—এই ঔষধের অন্তান্ত লক্ষণের বিছমানত। সহ প্রচুর মূত্রভাগে।

Uterus, Diseases of — জরায়ুর রোগ।

[ডিসমেনোরিয়া, লিউকোরিয়া, মিট্রাইটিস এবং গর্ভ ও প্রসব বেদনা দ্রষ্টব্য]

ফির্ম ফস।—জরায়র সর্বপ্রকার প্রাদাহিক রোগের প্রথমা-বস্থায় গাত্রোত্তাপ, বেদনা ও রক্তসঞ্চয়ের জন্ম ব্যবহৃত হয়। রতিক্রিয়ার পর যোনিতে বেদনা। যোনির অতিশয় শুক্ষতা ও স্পর্শাসহৃতা। উষ্ণ জলের সহিত কিঞ্চিৎ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদানও উপকারী। কালী-মিউর।—প্রদাহের দিতীয়াবস্থায় রস শঞ্চিত হইলে। জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত ও উহা হইতে গাঢ়, খেত ও অমুপদাহকর প্রাব নি:সরণ। জরায়ুর প্রাতন রক্ত সঞ্চয়। জরায়ুর বিবৃদ্ধি, কিন্তু উহার প্রস্তারের ন্তায় কঠিনতা না থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কালী-ফস।—জরায়ু হইতে পাতলা, গাঢ় লোহিত বা রুষণাভ-লোহিত রক্তপ্রাব। জরায়ুর স্থান-চ্যুতি ও তৎসহ স্নায়বীয় লক্ষণের বিপ্তমানতা।

ক্যাল্ক-স্থোর ।—জরায়্র স্থান চ্যুতির ইহা সর্বপ্রধান ঔষধ। উরুতে, জরায় প্রদেশে এবং কটিতে আকর্ষণবং বেদনা। জনন-যন্ত্রের র্ম্বশতা সহ অতিশয় সঙ্গমেচ্ছা। জরায়্র বিবৃদ্ধি ও প্রস্তরের স্থায় কাঠিস্থা (কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে)। জরায়্ গ্রীবায় ছিন্নতা ও নিমগ্নতা।

ক্যাল্ক-ফস।—জরায়ুর স্থানভ্রষ্টতা সহ হর্কালতা ও নিমগ্নতা অমুভব। আমবাতিক বেদনা সহ জরায়ুর স্থান-বিচ্যুতি। জরায়ু-প্রদেশে হর্কালতা ও অম্বছন্দতা। জরায়ুর সকল প্রকার রোগেই এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা কর্ত্ব্য।

Vaccination — ভ্যাক্সিনেশন, টিকা দেওয়া।

খারাপ বীজে টিকা দেওরার জন্ত বদি কোন প্রকার শীড়া, বিশেষতঃ একজিমা অর্থাৎ কণ্ডু জন্মে তবে কালী-মিউর ৩× প্রধান ও স্থনিশিক্ত শ্বরধ। ইহার পর প্রয়োজন বোধ করিলে সিলিশিয়া দিবে।

Vertigo — ভা টিগো---শিরোঘূণন।

সায়বিক দৌর্বাল্য, অগ্নিমান্য (ডিস্পেপশিয়া) এবং মস্তিষ, হুৎপিগু ও বৃক্ককের পীড়া হইতে শিরোঘূর্ণন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(চিকিৎসা)

ফিরম-ফস।—মন্তকে রক্তের প্রধাবনবশতঃ দপ দপ কর বেদনা ও মুখমগুলের আরক্ততা সহ শিরোঘূর্ণন জন্মিলে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

কালী-ফস।— হর্বলতা বা স্নায়বিক কারণে উৎপন্ন শিরোঘূর্ণন। উত্থানে এবং উপরেব দিকে তাকাইলে শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি।

নেট্রম-সলফ।—পিত্তস্রাবের বিশৃঙ্খলা হেতু শিরোঘূর্ণন। পীত মলাবৃতজ্ঞিহবা এবং মুখের তিক্তস্বাদ। অত্যধিক পিত্ত নি:সরণ।

লেট্রম-ফস।—পরিপাকের বিশৃত্বলা সহকারে শিরোঘূর্ণন।
অম লকণের বিভাষানতা।

Vomitting — ভিমিটিং — বমন।

অজার্ণ, পচা বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন, গভ, মস্তিষ্ক বা স্নায়ুমণ্ডলের প্রাড়া, পাকস্থলাতে ক্ষত, গর্ভ ও জরাদি বমনের প্রধান কারণ। অনেক সময় বমন দ্বারা বিশেষ উপশমই জন্মে। কিন্তু বমন দ্বারা উপশম না জন্মিলে রোগ উংকট বা উপদর্গ সংগুক্ত মনে করিবে।

(চিকিৎসা)

ফিরম ফস।— স্পরিপাচিত ভুক্ত দ্রব্য, কথন কখন বা উহার সহিত অম জলীয় পদার্থ বমন (নেট্রমফস, নেট্রম মিউর); উজ্জ্বল লোহিত রক্ত বমন, এই রক্ষ সহজেই ও নাঘ্রই জমাট হয়।

কালী মিউর।—গাঢ় খেত শ্লেমা, অথবা মলিন বা প্রায় কুম্ববর্ণ ডুম্ছেছ ও সংযত রক্ত বমন।

নেট্রা-মিউর।—অমু জলীয় পদার্থ বমন; স্বচ্চ, জলবং শ্লেমা বমন; মুখ হইতে জল উঠা ও উহার সহিত প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিগ্র।

কালী ফস। — কফিচুর্ণের ভায় ক্বঞ্চবর্ণ পদার্থ ব্যন।

কেট্রম-ফস।—অমু জলবং পদার্থ, অথবা ছানা বা দধির ভাষ পদার্থ বমন। জিহ্বার মূল-দেশেব বর্ণ দ্রষ্টব্য।

নেট্রা সলক।—পিত্র বা পিত্ত সংযুক্ত পদার্থ বমন এবং তৎসহ মুথের তিক্তস্বাদ।

ক্যাক্স-ফ্রন।—পরিপাচিত পদার্থের আচুষণের অভাব বশতঃ রাত্রির কোনও নিদিষ্ট ঘটকায় বমন; শিশুদিগের প্রতিানয়ত বমন, বিশেষতঃ শীতল পানীয় দ্রব্য গ্রহণের পর। ক্যান্ধ-স্কোর ।—অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন (ফিরম ফলে কোন উপকার না হইলে)।

Writers' cramp — রাইটাস ক্র্যাম্প

অতি লেখকদিগের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর পেশীর আক্ষেপ।

(চিকিৎসা)

নেট্রম-ফস।—লিখিবার সময় হাত কাঁপে। হাতে খালধরার স্থায় বেদনা (crampy pain). হস্তাঙ্গুলীর সন্ধিতে আমবাতিক বেদনা : মণিবন্ধে কাল করিয়া নেয় (aching pain).

কালী-মিউর।—লিথিবার সময় হন্তের শুরুতা (hands get stiff).

ম্যাগ-ফস।—ইহা ব্যবহার করিলে এই রোগে বিশেষ স্থফল দর্শে। কালা-ফস ও ম্যাগ-ফস একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করায় অনেক রোগীতে স্থফল পাওয়া গিয়াছে।

ক্যাত্ম ফস। - মণিবন্ধে ও হন্তাঙ্গুলীতে খালধরার ভায় বেদনা।

Whooping cough—হুপিৎ কণ্ডফ হুপশব্দক কাসি।

ইহা একপ্রকার আক্ষেপিক কাস। বায়ুনলীভূজ (ব্রহ্মিয়েল টিউব) এবং এপিয়োটিসের সংযোজক ভদ্ভর অভ্যন্তরে সৌত্রিক (ফাইব্রিণ) এবং অন্তান্ত অর্গানিক পদার্থ সঞ্চিত হইলে উক্ত স্থানের স্ফীততা জন্মিয়া থাকে। এই স্ফীততা বশতঃ উক্ত স্থানের স্মায়ুর উপর চাপ লাগিয়া স্মায়ুর পরিপোষণের ব্যাঘাত জন্মাইয়া উহার ম্যায়েশিয়া-ফ্য এবং ক্যাল্কেরিয়া ফ্য নামক উপাদান দ্বেরে স্ক্রতা ঘটাইয়া থাকে। এই ছই পদার্থের স্ক্রতা নিবন্ধন তথাকার পেনা-স্ত্র সকলের সঙ্কোচন জন্মিয়া আক্ষেপিক কাস উপস্থিত হইয়া থাকে।

শিশুদিগেরই এই রোগ সচরাচর জনিয়া থাকে। ইহা স্পর্শ-সংক্রামক ও বহুব্যাপক। কখন কখন সামান্তরূপে এবং কখন কখন বা গুরুতর ও মারাত্মকরপে এই রোগ প্রাহন্ত হইয়া থাকে। স্কন্ত ও সবল বালকদিগের পক্ষে সময়ে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। ইহাতে স্বরুজ্প ও আক্ষেপিক কাস থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রকার কাসের তারতা এত বৃদ্ধি পায় য়ে, কাসের আবেশ কালে বালকের মুখমগুল রক্ত বা বেগুণী বর্ণ হইয়া উঠে। এবং মনে হয় যেন কাসিতে কাসিতে শ্বাসরোধ বশতঃ বালকের মৃত্যু ঘটবে। এইরূপ কাসিতে কাসিতে কুসকুসের অভ্যন্তরন্থ সমস্ত বায়ু বাছির হইয়া গেলে রোগী দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ও তাহাতে "তুপ" এইরূপ শক্ষ হয়। এজনা এই কাসকে তুপ শক্ষক বা তুপিং কাসি বলে।

(চিকিৎসা)

কালী মিউর।—খেত লোবৃত জিহ্বাসহ গাঢ়, খেতবর্ণ শ্লেমা নিষ্ঠাবিত হইলে ইহা প্রধান ঔষধ। হুপিং কঃফের স্থায় আক্ষেপিক কাসি। ম্যান্থেশিয়া ফ্লা ।—ছপিং কাদের আবেশের পর ব্যবহার্য। তরুণ রোগে উষ্ণ জলের সহিত দৃঢ়তার সহিত এই ঔষধ কিছু দিন ব্যবহার করিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। পুরাতন ছপিংকঃফ (কালী-মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে)।

কালী ফস।—অভিশয় হৰ্জণতা বা স্নায়বীয় লক্ষণ বিভ্যমান থাকিলে এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার্য্য।

ফিরম-ফস।—জর থাকিলে বা কাসিতে কাসিতে রক্ত বমন হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

কালী-সলফ।—এই ঔষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক শ্লেমা নিষ্ঠীবন সংযুক্ত হুপিংকফ।

নেট্রম-মিউর ।—এই ওষধের বিশেষত্ব জ্ঞাপক প্রেশ্ন। বিভ্যমান

ক্যাল্ক ফ্স।—ম্যাগ্রেশিয়া-ফসের পর, অথবা ছ্রারোগ্য রোগে ব্যবহার্য্য।

Worms — ওয়ারম্স, কৃমি।

চিকিৎসা

নেট্রম-ফস। সর্বপ্রকার ক্রমিরই ইহা প্রধান ঔষধ। শিশুদিগের অন্ন লক্ষণসহ উদর বেদনা, নাক গুঁটা, গুহুদ্বার কণ্ডুয়ন, অস্থির নিদ্রা বা নিদ্রাকালে দস্তে দস্তে সংঘর্ষণ প্রভৃতি ক্রমি-লক্ষণের বিজ্ঞমানতা। এই ঔষধের ৩× ক্রমের বিচুর্ণন দৃঢ়ভার সহিত ব্যবহার করিলে নিশ্চিতরূপে স্ফল পাওয়া যায়। স্ত্র ক্রমিতে অন্ধ্র পাইন্ট গরম জলের সহিত কিছু অধিক পরিমাণ এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পিকচারী দিবে।

ক্যাল্ক ক্রোর।—অশ্বশতঃ গুছ্চার কণ্ডুয়ন। অনেক সময় এই প্রকার কণ্ডুয়ন ক্রিমি জন্ম বলিয়া ভ্রম হয়। ছোট বড় সব রক্ম রুমিতেই ইহা ফলপ্রদ। রাত্রে মলন্বার কণ্ডুয়ন। দাঁত কড়মড়ি।

কালীমিউর ৷—ক্ষুদ্র, খেতবর্ণ স্ত্রারুমি সহকারে গুছ্বার কপুরন। খেত লেপাবৃত জিহবা। স্থাট-ফসের সহিত প্যায়ক্রমে।

ক্যিরম-ফস।—মলের সহিত অপারপাচিত ভুক্ত দ্রব্য ও ক্লামর বিশ্বমানতা। কুমির লক্ষণের সহিত জর থাকিলে। স্ত্র-কুমি।

সমাপ্ত